УРАВНЕНИЯ N-ОЙ СТЕПЕНИ

Федотова Т.В., учитель математики,
МОУ Увельская СОШ № 1
п.Увельский Челябинская область

Большинство жизненных задач решаются как алгебраические уравнения: приведением их к самому простому виду.

Толстой Л.Н.

Задачи:

- рассмотреть основные виды уравнений
- познакомиться с различными методами решения уравнений



Метод решения хорош, если с самого начала мы можем предвидеть – и впоследствии подтвердить это, - что следуя этому методу, мы достигнем цели.

Лейбниц

Методы решения уравнений

- разложение многочлена на множители
- метод введения новой неизвестной
- комбинирование различных методов
- метод неопределенных коэффициентов

Разложение многочлена на множители

Любой многочлен может быть представлен в виде произведения. Самые известные методы разложения многочленов это: вынесение общего множителя, применение формул сокращенного умножения, выделение полного квадрата, группировка, разложение квадратного трехчлена на множители по формуле

$$2x^5 - 10x^4 + 14x^3 - 10x^2 + 12x = 0$$

$$2x\,(x^4 - 5x^3 + 7x^2 + 6) = 0$$

$x = 0$ или $x^4 - 5x^3 + 7x^2 + 6 = 0$

$$(x-2)(x^3 - 3x^2 + x - 3) = 0$$

$$(x-2)(x^2 \cdot (x-3) + (x-3)) = 0$$

$$(x-2)(x-3)(x^2 + 1) = 0$$

$x - 2 = 0$ или $x - 3 = 0$ или $x^2 + 1 = 0$

$x = 2$ $\quad$ $x = 3$ $\quad$ корней нет

Ответ: 0, 2, 3

Метод введения новой неизвестной

В некоторых случаях путем замены выражения $f(x)$, входящего в многочлен $P_n(x)$, через y можно получить многочлен относительно y, который уже легко разложить на множители. Затем после замены y на $f(x)$ получаем разложение на множители многочлена $P_n(x)$

$$\frac{x^2+2x+1}{x^2+2x+2}+\frac{x^2+2x+2}{x^2+2x+3}=\frac{7}{6}$$

пусть $x^2+2x+2=t$

$$\frac{t-1}{t}+\frac{t}{t+1}=\frac{7}{6}$$

умножим обе части уравнения на $6t(t+1)$, где $t\neq 0$, $t\neq -1$

$$6t^2-6+6t^2+7t=0$$

$$5t^2-7t-6=0$$

$t_1=2$, $t_2=-0,6$

$$\frac{x^2+2x+1}{x^2+2x+2}+\frac{x^2+2x+2}{x^2+2x+3}=\frac{7}{6}$$

1) $x^2 + 2x + 2 = 2$

$x^2 + 2x = 0$

$x(x+2)=0$

$x = 0$ или $x = -2$

2) $x^2 + 2x + 2 = -0,6$

$5x^2 + 10x + 13 = 0$

$D = -169 < 0$

корней нет

Ответ: -2; 0

Метод неопределенных коэффициентов

Суть метода неопределённых коэффициентов состоит в том, что вид сомножителей, на которые разлагается данный многочлен, угадывается, а коэффициенты этих сомножителей (также многочленов) определятся путём перемножения сомножителей и приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях переменной.

$x^4+4x^3-20x^2+21x-16=0$

$$x^4+4x^3-20x^2+21x-16=(x^2+px+g)(x^2+bx+c)$$

$$(x^2+px+g)(x^2+bx+c)=$$

$$x^4+x^3(p+b)+x^2(c+g+pb)+x(pc+gb)+gc$$

$$\begin{cases} p+b=4 \\ c+g+pb=-20 \\ pc+gb=21 \\ gc=-16 \end{cases}$$

$$(x^2-x+1)(x^2+5x-16)=0$$

1) $x^2-x+1=0$ или 2) $x^2+5x-16=0$

$D=-3<0$

Корней нет

$p=-1, b=5, c=-16, g=1.$

$D=89$

$$x_1=\frac{-5-\sqrt{89}}{2}$$

$$x_2=\frac{-5+\sqrt{89}}{2}$$

Ответ: $\dfrac{-5\pm\sqrt{89}}{2}$

Виды уравнений

- квадратные уравнения
- биквадратные уравнения
- возвратные уравнения
- уравнения вида $(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)=A$
- уравнения вида:

  $$(ax^2 + bx + c)(ax^2 + b_1x + c_1)=Ax^2$$
- уравнения, однородные относительно многочленов

Возвратные уравнения

общий вид :

Алгебраическое уравнение $f(x)=0$ называется возвратным, если у многочлена в левой его части, представленного в каноническом виде, равны коэффициенты членов, равноудаленных от его концов: первого и последнего, второго и предпоследнего и т.д.

$$ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} + \ldots + ex^2 + bx + a = 0$$

Рассмотрим алгоритм решения возвратных уравнений четной степени

$$ax^n+bx^{n-1}+\ldots+bx+a=0$$

$$ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$$

$$a\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+b\left(x+\frac{1}{x}\right)+c=0$$

$$t=x+\frac{1}{x}$$

$$t^2-2=x^2+\frac{1}{x^2}$$

$$at^2+bt+c-2a=0$$

$$2x^5+5x^4-13x^3-13x^2+5x+2=0$$

	2	5	-13	-13	5	2
-1	2	3	-16	3	2	0

$$x-1=0 \quad \text{или} \quad 2x^4+3x^3-16x^2+3x+2=0$$

$$(x-1)(2x^4+3x^3-16x^2+3x+2)=0$$

$$2(x^2+\frac{1}{x^2})+3(x+\frac{1}{x})-16=0$$

$$x+\frac{1}{x}=t, x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2$$

$$2t^2+3t-20=0$$

$$t_1=\frac{5}{2}, t_2=-4$$

$$2x^5+5x^4-13x^3-13x^2+5x+2=0$$

$x+1=0$ или $2x^4+3x^3-16x^2+3x+2=0$

$x=-1$

1) $2x^2+5x+2=0$

$x_1=2,\ x_2=0{,}5$

2) $x^2+4x+1=0$

$$x_3=-2+\sqrt{3}$$

$$x_4=-2-\sqrt{3}$$

Ответ: 0,5; 2; $-2\pm\sqrt{3}$

$$(x^2-x+1)^4-6x^2(x^2-x+1)^2=-5x^2$$

Пусть $(x^2-x+1)^2=a;\quad x^2=b$

$$a^2-6ab+5b^2=0$$

$$a(a-b)-5b(a-b)=0$$

$$(a-b)(a-5b)=0$$

$a=b$ или $a=5b$

$x^2-x+1=x$

1) $(x^2-x+1)^2=x^2$

2) $(x^2-x+1)^2=5x^2$

$$a)\ x^2-x+1=-\sqrt{5x^2}$$

$$б)\ x^2-x+1=\sqrt{5x^2}$$

Ответ: $1;\ \dfrac{1+\sqrt{5}\pm\sqrt{2+2\sqrt{5}}}{2}$

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!