

ВЕКТОРЫ







Опр.: Векторная величина - это величина, которая характеризуется указанием направления и числового значения.

Замечание: геометрически вектор изображается в виде направленного отрезка, т.е. указывается какая точка является началом, какая - концом

Обозначение: \overline{MB} , \vec{MB} , \vec{a} , \bar{a}



\vec{a} \vec{b}
одинаково
сонаправленные
векторы



\vec{m} \vec{n}
противоположно
направленные
векторы




\vec{a}

Опр.: абсолютная величина (или модуль) вектора – это длина отрезка, изображающего вектор

Обозначение: $|\vec{a}|$

В прямоугольнике ABCD $AB=3\text{см}$, $BC=4\text{см}$,
точка M – середина стороны AB.

Найдите длины векторов.



$$|\vec{AB}| = 3$$

$$|\vec{BC}| = 4$$


$$|\vec{DC}| = 3$$

$$|\vec{MA}| = 1,5$$

$$|\vec{CB}| = 4$$

$$|\vec{AC}| = 5$$

$$|\vec{MC}| =$$




Опр.: **Равные векторы-**
векторы, которые сонаправлены
и равны по абсолютной величине

Свойство равных векторов:

у равных векторов
соответствующие координаты
равны.

В параллелограмме ABCD диагонали пересекаются в точке O. Равны ли векторы. Обоснуйте ответ.



$$\vec{BC} \neq \vec{DA};$$



$$\vec{AC} \neq \vec{BD}.$$

$$\vec{AB} = \vec{DC};$$

$$\vec{AO} = \vec{OC};$$

Сложение векторов

Правило треугольника




$$O\bar{A} + A\bar{B} = O\bar{B}$$


$$O\bar{M} + M\bar{N} = O\bar{N}$$

$$O\bar{N} + N\bar{P} = O\bar{P}$$


$$N\bar{P} + P\bar{K} = N\bar{K}$$




Правило параллелограмма



$$M\bar{P} + M\bar{K} = M\bar{T} \qquad P\bar{M} + P\bar{T} = P\bar{K}$$






Постройте векторы:

$$R\overline{N} + N\overline{O} = R\overline{O}$$

$$R\overline{N} + N\overline{K} = R\overline{K}$$

$$A\overline{B} + T\overline{U} = A\overline{B} + B\overline{C} = A\overline{C}$$




Постройте векторы:

$$D\bar{A} + D\bar{U} = D\bar{R}$$

$$R\bar{N} + R\bar{T} = R\bar{P}$$

$$F\bar{M} + F\bar{H} = F\bar{N}$$

Вычитание векторов




$$\vec{OA} - \vec{OB} = \vec{BA}$$



Как проверить?

$$\vec{OB} + \vec{BA} = \vec{OA}$$



Постройте векторы:

$$\vec{BF} - \vec{BC} = \vec{CF}$$


$$\vec{NM} - \vec{NU} = \vec{UM}$$

$$\vec{LC} - \vec{LO} = \vec{OC}$$

Умножение вектора на число

\vec{a}

$3\vec{a}; -2\vec{a}$?



$$|\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}|$$


\vec{a} и $\lambda \vec{a}$ сонаправленные, если $\lambda > 0$

противоположно


направленные, если

$\lambda < 0$

От точки N отложите векторы




$2\bar{a}$
 $-\bar{a}$
 $3\bar{b}$
 $-\bar{b}$



**Опр.: Нулевой вектор - вектор,
у которого начало
совпадает с его концом.**

**Замечание:
любая точка
плоскости
является
нулевым вектором.**



Опр.: Ненулевые векторы называются **коллинеарными**, если они лежат либо на одной прямой, либо на параллельных прямых.

Замечания: *а)* коллинеарные векторы могут быть сонаправленными или противоположно направленными.

б) Нулевой вектор считается коллинеарным любому вектору.

Свойство коллинеарных векторов:

у коллинеарных векторов
соответствующие координаты
пропорциональны.

Обратное утверждение
является признаком
коллинеарности векторов




Теорема.

Любой вектор можно разложить
по двум неколлинеарным векторам
и при этом коэффициенты
разложения определяются
единственным способом:


$$p = x\bar{a} + y\bar{b}$$


Теорема.

Любой вектор
можно разложить по векторам
осей системы координат (ортам):



Замечание: по разложению
любого вектора по ортам
можно определить
его координаты.






Опр.: Вектор \vec{b} называется
противоположным вектору \vec{a} ,
если \vec{a} и \vec{b} имеют
равные длины
и противоположно направлены.

Замечание:

сумма

противоположных векторов
равна нулевому вектору.



- 1) Назовите коллинеарные векторы
- 2) Назовите равные векторы
- 3) Назовите противоположные векторы


Если в четырехугольнике две стороны равны и параллельны, то этот четырехугольник – параллелограмм.

$\Rightarrow AB = DC$ и $\parallel AB \parallel DC$, $ABCD$ параллелограмм

Среди векторов $\vec{BM}, \vec{MC}, \vec{AN}, \vec{DN}, \vec{AM}, \vec{NC}$

найдите

Проверка



a) $\vec{BM}, \vec{MC}, \vec{AN}, \vec{DN}$;

b) $\vec{BM} \uparrow \vec{MC} \uparrow \vec{AN}$; $\vec{AM} \uparrow \vec{NC}$;

$\vec{DN} \uparrow \vec{MC}$; $\vec{DN} \uparrow \vec{AN}$; $\vec{DN} \uparrow \vec{BM}$;

$\vec{MC} = \vec{AN}$; $\vec{AM} = \vec{NC}$;

d) $|\vec{BM}| = |\vec{DN}|$; $|\vec{MC}| = |\vec{AN}|$; $|\vec{AM}| = |\vec{NC}|$.

Опр.: **СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ**
число равное произведению длин этих
векторов на косинус угла между ними.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}| \cdot \cos(\widehat{AB; AC})$$


Теорема:

Скалярное произведение векторов

$$\vec{AB}(x_1; y_1) \text{ и } \vec{AC}(x_2; y_2)$$

А есть число равное сумме произведений
соответствующих координат

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$



Следствие 1.

$$\vec{a}\{x_1; y_1\} \perp \vec{b}\{x_2; y_2\} \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 = 0.$$

Следствие 2.

$$\cos \alpha = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

$$\vec{a} \neq \vec{0} \quad \vec{b} \neq \vec{0}$$


СВОЙСТВА

СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ВЕКТОРОВ

1. Скалярное произведение сонаправленных векторов равно положительному произведению их длин.

2. Скалярное произведение противоположно направленных векторов равно отрицательному произведению их длин.




3. Если скалярное произведение векторов равно нулю, то данные векторы перпендикулярны.

Замечание: данное утверждение является признаком ортогональности векторов.

4. Скалярный квадрат вектора равен квадрату его абсолютной величины.







И ты до сих пор
этого не выучил?!
Поцарапаю...