



*Статистическое определение  
вероятности.*

**Решение задач.**



# Диктант.

1. Запишите формулу вычисления вероятности случайного события в классической модели. Поясните, что означает каждая буква в этой формуле.
2. Запишите формулу вычисления вероятности случайного события в статистической модели. Поясните, что означает каждая буква в этой формуле.
3. Какому условию должны удовлетворять исходы опыта, чтобы можно было воспользоваться классическим определением вероятности?
4. Чему равна частота достоверного события?
5. Чему равна частота невозможного события?



## *Решение задач.*

**Задача 1.** В партии из 100 деталей отдел технического контроля обнаружил 5 нестандартных деталей. Чему равна относительная частота появления нестандартных деталей?

**Решение.**

$$w = 5/100 = 0,05$$

**Ответ:**  $w = 0,05$ .



## Решение задач.

**Задача 2.** При стрельбе из винтовки относительная частота попадания в цель оказалась равной 0,85. Найти число попаданий, если всего было произведено 120 выстрелов.

**Решение.**  $N = 120, W(A) = 0,85$

$$W(A) = \frac{N_A}{N}$$

$$0,85 = \frac{N_A}{120}$$

$$N_A = 0,85 \cdot 120 = 102$$

**Ответ:** 102 попадания.



*Вероятностная шкала.*

**Что вероятнее?**


## *Попробуем расположить на специальной вероятностной шкале события:*

- $A = \{\text{в следующем году первый снег в Москве выпадет в воскресенье}\};$
- $B = \{\text{свалившийся со стола бутерброд упадет на пол маслом вниз}\};$
- $C = \{\text{при бросании кубика выпадет шестерка}\};$
- $D = \{\text{при бросании кубика выпадет четное число очков}\};$
- $E = \{\text{в следующем году снег в Москве вообще не выпадет}\};$
- $F = \{\text{при бросании кубика выпадет семерка}\};$
- $G = \{\text{в следующем году в Москве выпадет снег}\};$
- $H = \{\text{при бросании кубика выпадет число очков, меньшее 7}\}.$

# Вероятностная шкала

- Чем больше у случайного события шансов произойти, тем оно более вероятно и тем правее его следует расположить на вероятностной шкале; чем меньше шансов - тем левее. Если два события, на наш взгляд, имеют равные шансы, будем располагать их в одном и том же месте шкалы друг над другом.





*Пример 1. Вова хочет вытянуть наугад одну карту из колоды с 36-ю картами. Маша, Саша, Гриша и Наташа предсказали следующее:*


- Маша: Это будет король.
- Саша: Это будет пиковая дама.
- Гриша: Эта карта будет красной масти.
- Наташа: Эта карта будет пиковой масти.



# Решение :

- Как сравнить между собой шансы предсказателей?
- Обозначим все события, предсказанные ребятами, буквами:
- $A = \{\text{Вова достанет короля}\}$ ;
- $B = \{\text{Вова достанет пиковую даму}\}$ ;
- $C = \{\text{Вова достанет карту красной масти}\}$ ;
- $D = \{\text{Вова достанет карту пиковой масти}\}$ .
- Всего в колоде:
- королей - 4;  $P(A) = 4/36$
- пиковая дама - 1;  $P(B) = 1/36$
- карт красных мастей - 18;  $P(C) = 18/36$
- пик - 9;  $P(D) = 9/36$






*Пример 2. Что вероятнее:  $A = \{\text{получить шестерку при подбрасывании кубика}\}$  или  $B = \{\text{вытянуть шестерку из перетасованной колоды карт}\}$ ?*

- Как и в предыдущем примере, подсчитаем шансы за осуществление каждого из этих событий.
- На кубике одна шестерка; в колоде четыре шестерки.
- Стало быть, событие. В более вероятно?
- Нет, конечно! Просто мы неверно считали шансы. Ведь когда речь идет о шансах, то говорят не просто «два шанса» или «один шанс», а «два шанса из трех» или «один шанс из тысячи».
- В примере 1 это не могло привести к ошибке, поскольку там все шансы были «из 36».
- А вот в этом примере ситуация сложнее:
- шестерок на кубике - 1, а всего граней у кубика - 6;  
шестерок в колоде - 4, а всего карт в колоде - 36.



## Решение :

- Ясно, что «1 шанс из 6» лучше, чем «4шанса из 36», ведь  $1/6$  больше  $4/36$ .
- Таким образом, шансы имеет смысл сравнивать как дроби: в числителе - сколько шансов за осуществление данного события, а в знаменателе - сколько всего возможно исходов. Понятно, что если знаменатели одинаковые, то можно сравнивать только числители (что и было сделано в примере 1).



*Пример 3. Попробуем на основе нашего опыта общения по телефону сравнить между собой степень вероятности следующих событий:*

- $A = \{\text{вам никто не позвонит с 5 до 6 утра}\};$
- $B = \{\text{вам кто-нибудь позвонит с 5 до 6 утра}\};$
- $C = \{\text{вам кто-нибудь позвонит с 18 до 21}\};$
- $D = \{\text{вам никто не позвонит с 18 до 21}\}.$



## Решение :

- Ранним утром звонки бывают очень редко, поэтому событие А - очень вероятное, почти достоверное, а В - маловероятное, почти невозможное.
- Вечерние часы, наоборот, время самого активного телефонного общения, поэтому событие С для большинства людей вероятнее, чем D. Хотя, если вам вообще звонят редко, D может оказаться вероятнее С.

# Решение задач.

*Задача 3. При проведении контроля качества среди 1000 случайно отобранных деталей оказалось 5 бракованных. Сколько бракованных деталей следует ожидать среди 25 000 деталей?*

- По результатам контроля можно оценить вероятность события  $A = \{\text{произведенная деталь бракованная}\}$ . Приблизительно она будет равна его частоте:  
 $P(A) = 5/1000 = 0,005$ .
- Следует ожидать такую частоту и в будущем, поэтому среди 25 000 деталей окажется около  $25\ 000 \cdot 0,005 = 125$  бракованных.

# Решение задач.

*Задача 4. Население города Калуги составляет около 400 000 жителей. Сколько калужан родились 29 февраля?*

- Заметим прежде всего, что вопрос задачи не совсем корректен: мы можем ответить на него лишь приблизительно, ибо реальная частота даже в такой большой выборке из 400 000 жителей не обязана совпадать с вероятностью.
- 29 февраля бывает только в високосном году — один раз в четыре года, следовательно, для случайно выбранного человека его день рождения попадает на 29 февраля с вероятностью

$$\frac{1}{3 \cdot 365 + 366} = \frac{1}{1461} \approx 0,00068$$

- Это значит, что среди 400 000 жителей Калуги следует ожидать около  $400000 \cdot \frac{1}{1461} = 274$  человека, которым приходится праздновать свой день рождения раз в четыре года.

# Решение задач.

*Задача 5. Из озера выловили 86 рыб, которых поместили и отпустили обратно в озеро. Через неделю произвели повторный отлов, на этот раз поймали 78 рыб, среди которых оказалось 6 помеченных. Сколько приблизительно рыб живет в озере?*

- Оказывается, найти ответ на этот неожиданный вопрос совсем несложно.
- В самом деле: обозначим неизвестную нам численность рыб в озере через  $N$ .
- Тогда вероятность поймать помеченную рыбу в озере будет  $86/N$ .
- С другой стороны, эта вероятность должна приблизительно равняться полученной во втором улове частоте:  $86/N=6/78$ .
- Отсюда  $N = 86 \cdot 78 / 6 = 1118$ .





## Домашнее задание:

В письменном тексте одной из «букв» считается пробел между словами. Найдите частоту просвета в любом газетном тексте.