



Bacillus cereus

Семейство: Bacillaceae; род: Bacillus.

- Пищевые токсикоинфекции, продуцирует энтеротоксины.





Эндоспоры
B. cereus
расположены
центрально, не
превышают
размер клетки.

Клетки *Bacillus*
cereus,
окрашенные по
методу Грама

Источник:

http://geniebio.ac-aix-marseille.fr/biospip/spip.php?article252&id_document=824

Морфологические свойства:

- Грам (+)
- длина 8-9 мкм
- ширина 0,9-1,5 мкм

- эндоспоры расположены центрально, не превышают размер клетки
- подвижная, жгутики расположены перитрихиально

- отдельные штаммы могут образовывать капсулу

Feature	<i>B. cereus</i>	<i>B. thuringiensis</i>	<i>B. mycooides</i>	<i>B. weihenstephanensis</i>	<i>B. anthracis</i>	<i>B. megaterium</i>
Gram reaction	+(^a)	+	+	+	+	+
Catalase	+	+	+	+	+	+
Motility	+/-(^b)	+/-	-(^c)	+	-	+/-
Reduction of nitrate	+	+	+	+	+	-(^d)
Tyrosine decomposed	+	+	+/-	+	-(^d)	+/-
Lysozyme-resistant	+	+	+	+	+	-
Egg yolk reaction	+	+	+	+	+	-
Anaerobic utilization of glucose	+	+	+	+	+	-
VP reaction	+	+	+	+	+	-
Acid produced from mannitol	-	-	-	-	-	+
Hemolysis (Sheep RBC)	+	+	+	ND	-(^d)	-
Known pathogenicity(^e) /characteristic	produces enterotoxins	endotoxin crystals pathogenic to insects	rhizoidal growth	growth at 6°C; no growth at 43°C	pathogenic to animals and humans	



Жгутики
расположены
перетрихиально.

Клетки *B. cereus*,
окраска жгутиков
по Лейфсону

Культуральные свойства:

- аэроб, О/Ф=(+/+)
- рН 9,0-9,5; при рН 4,5-5,0 рост прекращается
- опт. температура 30-32°C (диапазон 10-48°C)
- Рост на МПА: крупные, распластанные, серовато-белые колонии с изрезанными краями; нек. штаммы образуют розовато-коричневый пигмент;
- на кровяном агаре: широкая зона гемолиза (некоторые штаммы негемолитические);
- на МПБ: нежная пленка, пристеночное кольцо, равномерное помутнение, хлопьевидный осадок.

ЭКЗОТОКСИНЫ:

- ЭКЗОТОКСИНЫ:
 1. диареегенно-летальный токсин – состоит из трех белковых компонентов, обладает диареегенной, летальной активностью и повышает проницаемость сосудов;
 2. цереолизин – вызывает цитолитический и летальный эффект и также нарушает проницаемость кровеносных сосудов.

Ферментативные свойства:

- расщепляют до кислоты глюкозу и мальтозу (часть штаммов также и сахарозу, глицерин, лактозу, галактозу, инсулин, дульцит и декстрин)
- маннит не расщепляет ни один штамм
- 80% штаммов разжижают желатин в течение 1-4 суток
- свертывает и пептонизирует молоко
- способен образовывать ацетилметилкарбинол (положительная проба Фогеса-Проскауэра)
- утилизирует цитрат
- обладает нитратредуцирующей активностью

Ферментативные свойства:

- ферменты, лизирующие бактериальные клетки
- гемолизин
- протеолитические ферменты
- фосфолипаза С
- лецитиназа



Колонии *B. cereus* на
кровяном агаре.



Колонии *B. cereus* на
Dextrose casein-peptone
agar.

Устойчивость

- спорообразующая бактерия
- часто обнаруживают в консервах, в пастеризованном молоке (65-93°С)
- развивается при концентрации NaCl до 10-15%, сахара – до 30-60%
- при pH 4,5-5,0 прекращает рост, наиболее чувствителен к уксусной к-те

Формы заболевания:

Возникновение конкретной формы пищевого отравления зависит от условий размножения *Bacillus cereus*.

1. Диарейный тип: клиническая картина через 24 ч после употребления инфицированного продукта. Температура, как правило, не повышается. Развивается при поступлении в организм больших количеств *Bacillus cereus* (свыше 10^6 микробных клеток), продуцирующих энтеротоксины диарейного типа.

Формы заболевания:

2. Токсикозоподобная (рвотная) форма: короткий инкубационный период 0,5-6 ч. Характеризуется тошнотой и рвотой, длящейся до 24 ч. В инфицированном продукте и рвотных массах регистрируется специфический термостабильный рвотный энтеротоксин. Возникновение конкретной формы пищевого отравления зависит от условий размножения *Bacillus cereus*. Рвотная форма заболевания связана, как правило, с контаминацией крупяных, картофельных и макаронных блюд, салатов, пудингов, соусов.

Диагностика

1. микроскопия мазков: Гр(+), толщина 0,9 мкм → «споровый аэроб группы Ia» (в группу Ia входят *B. anthracis* и *B. cereus*);
2. высев на кровяной агар, инкуб. при 37°C 24 ч → наличие зоны гемолиза;
3. посев на цитратную среду Козера и углеводную среду с маннитом, **проба на лецитиназу** → дифференциация от др. представителей рода *Bacillus*



Колонии *B. cereus* на
МҮР агаре.




МУР

Васара

Колонии *B. cereus*
на МУР агаре.

На МУР:
розовые,
лецитиназа(+), но
другие бактерии не
подавляются.



На Васара:
розово-оранжевые,
лецитиназа(+), но
др. организмы
подавлены.



Duopath Cereus Entero (экспресс-тест)

АМТ:

- наибольшая лекарственная чувствительность — к ванкомицину (назначается при инвазивных формах);
- устойчивость к полимиксину, пенициллину (синтезирует пенициллиназу).