

Антибактериальные,
противовирусные, противогрибковые
и противовоспалительные
препараты применяемые при
воспалительных заболеваниях
органов малого таза у женщин
применяемые согласно клинических
протоколов МЗРК.

Сальпингит и сальпингоофорит

- Схема №1




Схема №2



Бартолинит

- 1 линия препаратов



2 линия препаратов



Бактериальный вагиноз

- 1 линия





2 линия



Трихомонадный вагинит/ вульвит



Кандидозный вагинит / вульвит



Содержит 100 г мази. Состав: Нистатин — 0,200 г. Нистатин (Фармацевтический ДЗ) г.
Нистатин — 200 000 ЕД. Содержит в форме концентрированной мази.
Мазь при температуре не выше 25 °С. Содержит консерванты.
Для хранения мази в холодильнике или в прохладном месте. Срок годности
мази 36 месяцев. Изготовлено в Республике Беларусь. Произведено
ЛСР-008634/08 от 30.10.2008 г.



Противогрибковое средство

НИСТАТИН

мазь для наружного применения
100 000 ЕД/г

30 г

 биосинтез



Эндометрит





phs Фармстандарт

Метронидазол

20 таблеток по 0,25 г




4 601669 002198



- Гормоны:

Перитонит

- Предоперационная подготовка







Терапия послеоперационного периода





Противогрибковая терапия



Сепсис

- Инфузионно – трансфузионная терапия:



