

Қ.А.ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ
Шымкент медицина институты
«Терапия» кафедрасы


Астмалық статус



Орындаған: Джунусов С.У.

Тобы: ТҚ-701

Астмалық статус (*status asthmaticus*) – ұстамалы экспираторлы тұншығумен жүретін, демікпеге қарсы дәрілік заттарменде басылмайтын өмірге қауіп тудыратын бронхиальды демікпенің асқынуы болып табылады. Бронхиолалардың ісінуімен және қою қақырық жиналып, тұншығу және гипоксия тудырады.



Классификация

<p>I стадия Компенсация</p>	<p>II стадия декомпенсация немесе «мылқау өкпе».</p>	<p>III стадия гипоксиялық гиперкапниялық кома.</p>
<p>- <u>Есі бұзылмайды,</u> - <u>ерні көгеру, Үрей, козу,</u> - <u>ентігу, қиын бөлінетін</u> <u>кақырық</u> - <u>тыныс жиілігі – 26-40</u> <u>мин</u> <u>-ортопноэ, Қорапты</u> <u>дауыс,</u> - <u>Әлсіз құрғақты</u> <u>ысқырықты сырылдар,</u> - <u>АКҚ 200/110</u> - <u>ОФВ1 – 30% ↓</u> - <u>гипоксемия (рО₂ – 60-70</u> <u>мм рт ст) нормо – немесе</u> <u>гипокапния,</u> - <u>респираторлы алкалоз</u> <u>(рН>7.43)</u></p>	<p>- <u>Есі бұлыңғыр анық емес,</u> - <u>Диффузды цианоз, мойын</u> <u>венасы ісінуі</u> - <u>Алыстан сырылдар естілуі</u> - <u>тыныс жиілігі – 40 ↑</u> - <u>ортопноэ, «мылқау</u> <u>өкпе». Өкпенің төменгі</u> <u>бөлігінде</u> - <u>Тахикардия, АКҚ</u> <u>төмендеуі</u> - <u>ОФВ1 – 20% ↓</u> - <u>гипоксемия (рО₂ – 50-60</u> <u>мм рт ст) немесе</u> <u>гиперкапния (рСО₂ 50-70</u> <u>мм. рт ст) , аралас ацидоз</u> <u>рН<7.35)</u></p>	<p>- <u>Ессіз, кейде тырыспалар</u> - <u>Разлитой цианоз</u> - <u>ТАЖ- 60 рет</u> - <u>«мылқау өкпе» өкпе</u> <u>барлық бөлігінде</u> - <u>ЖЖЖ:</u> - <u>АКҚ төмендеуі</u> - <u>Көз қарашығы кенейген</u> - <u>жіп тәрізді пульс, аритмия,</u> <u>кейде ритм галоп</u> - <u>ауыр гипоксемия (рО₂ –</u> <u>40-55 мм рт ст) немесе кенет</u> <u>айқын гиперкапния (рСО₂</u> <u>80-90 мм. рт ст) ,</u> <u>метаболикалық ацидоз</u></p>

Емдеуі

Симпатомиметики (адреналин, эфедрин) алып тастау!

1. Оттегі терапиясы
2. Sol.Prednizoloni 2-3 мг/кг/сут;
3. Қысқа әсерлі селективті $\beta 2$ -агонисты : (sol.Salbutamoli 20 ml небулайзер)
4. 2,4% еуфилин 7-10 мг/кг тамыршілік тамшылы (max 24-20-18 мг/кг/сут);
5. Heparin 200-300 Од/кг/сутки в 4 приема;
6. Sol. Hydrocorbonatis Natrii 4% р-н гидрокарбоната натрия 5-7 мл/кг;
7. Кеңірдек интубациясы+ санация бронхоскопия
8. ИВЛ;

