

# БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

- **ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ** – иммунновоспалительное заболевание с преимущественным поражением клубочков.

## КЛАССИФИКАЦИЯ

- по течению
  - острый
  - хронический
  - быстропрогрессирующий
    - по ведущему синдрому
  - нефротический
  - гипертонический
  - гематурический
    - по морфологическим изменениям
  - пролиферативные
  - непролиферативные

# ОСТРОНЕФРИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

- олигурия (*анурия, азотемия, ОПН*)

- гематурия

- протеинурия

(*нефротический синдром -  
гипопротеинемия, гипоальбуминемия*)

- цилиндроурия

- отеки (*гиперволемия, анасарка*)

- АГ( *персистирующая с эклампсией, НК*)

# Лечение диффузного гломерулонефрита

- Этиологическое – при очаговой инфекции
- Патогенетическое:
  - иммунодепрессанты
  - противовоспалительные
  - антикоагулянты
  - антиагреганты
- Синдромное:
  - лечение АГ
  - лечение отечного синдрома
  - лечение ОПН, ХПН

# ЛЕЧЕНИЕ ОГН

I. Объем жидкости-сут. диурез + 200-400 мл

NaCl – 1-2 г/сут.

белков – 0,5 г/сут.

II. Аминопенициллины

III. Петлевые диуретики (фуросемид)

БКК (нифедипин-SR, амлодипин)

# ЛЕЧЕНИЕ ОГН

IV. судоржный синдром:

- *диазепам, фуросемид*

кард.астма, отек легких:

- *фуросемид до 20 мл*
- *морфин*
- *вазодилататоры*

при бронхиальной обструкции:

- *преднизолон, эуфиллин*

ОПН, ОСН – ультрафильтрация

гиперкалиемия – *фуросемид, глюкоза в/в, инсулин, бикарбонат Na, глюконат Ca, гемодиализ*

# КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ХГН

- Латентная (*хронический гломерулонефрит с изолированным мочевым синдромом*)
- Гематурическая
- Гипертоническая
- Нефротическая
- Смешанная (*нефротический синдром в сочетании с АГ*)
- Терминальная

## ФАЗЫ

- Обострение
- Ремиссия

# **Морфологическая классификация ХГН**

- **Диффузный пролифертивный**
- **С «полулуниями»**
- **Мезангиопролиферативный**
- **Мембрано-пролиферативный  
(мезангиокапиллярный)**
- **Мембранный**
- **С минимальными изменениями**
- **Фокально-сегментарный гломерулосклероз**
- **Фибриллярно-иммунотактоидный**
- **Фибропластический**

# **МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОВ**

<b>Пролиферативные формы</b>	<b>Непролиферативные формы</b>
<b>Острый постстрептококковый (интракапиллярный) гломерулонефрит</b>	<b>Фокально-сегментарный гломерулосклероз</b>
<b>Быстропрогрессирующий гломерулонефрит: с иммунными депозитами; малоиммунный</b>	<b>Мембранозный гломерулонефрит</b>
<b>Мезангиопролиферативный гломерулонефрит</b>	<b>Гломерулонефрит с минимальными изменениями</b>
<b>IgA - нефропатия</b>	
<b>Мезангиокапиллярный гломерулонефрит</b>	

# ЛЕЧЕНИЕ ХГН

- Элиминация этиологического фактора
- Малобелковая диета у больных с ХПН с одновременным приемом препаратов незаменимых аминокислот и их кетоаналогов («кетостерил»)
- Гипохолестериновая диета при нефротическом синдроме (морская рыба, растительное масло)

# **ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ**

## **НЕФРОТИЧЕСКАЯ**

- Преднизолон - 1 мг/кг/сут
- Пульс-терапия – метилпреднизолон в/в 1 г/с 3 дня подряд
- Цитостатики (циклофосфамид, хлорамбуцил, циклоспорин)
- Антиагреганты, антикоагулянты

**(дипиридамол 400-600 мг/сут; клопидогрел 0,2-0,3 г/сут)**

- Диуретики (фurosемид)
- Антигиперлипидемические (статины)

## **ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ**

- Коррекция АГ (ИАПФ, БРА, БКК)
- При обострении ГКС (преднизолон 0,5 мг/кг/с), трехкомпонентная терапия (включая цитостатики)

## **СМЕШАННАЯ**

- Трехкомпонентная схема – ГКС (цитостатики), антиагреганты, гепарин
- Четырехкомпонентная схема – ГКС, цитостатики, антиагреганты, гепарин (НАК)
- Гипотензивные лекарственные препараты
- Диуретики

## **ЛАТЕНТНАЯ**

- При протеинурии > 1г/сут - ИАПФ длительно (и при нормальном АД)


## **ГЕМАТУРИЧЕСКАЯ**

- ИАПФ
- Дипиридамол
- Преднизолон и цитостатики – непостоянный эффект

- Инфекции почек и мочевыводящих путей

# Инфекции мочевыводящих путей

- 1. Воздуходиля – микрофлора, колонизирующая периуретральную область
- 2. Основной путь инфицирования – восходящий



• Примечание: осложненные - на фоне структурно-функциональных нарушений уродинамики, хирургических вмешательств, заболеваний.

# **Этиологическая структура возбудителей инфекций мочевыводящих путей**

<b>Возбудитель</b>	<b>Цистит, %</b>	<b>Пиелонефрит, %</b>	<b>Осложненные ИМВП, %</b>
<b>E.coli</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>32</b>
<b>S.saprophyticus</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Proteus spp.</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Klebsiella spp.</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Enterococcus spp.</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>Pseudomonas spp.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

# **Антибактериальные препараты для лечения острого цистита**

- Фторхинолоны
- Ампициллин
- Амоксициллин
- Амоксициллин/клавуланат
- Ко-тримоксазол
- Нитрофурантоин
- Фосфомицин

# АБ терапия неосложненных инфекций мочевыводящих путей (формуляр РФ)

- Препараты выбора:

- **фторхинолоны (норфлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин)**
- амоксициллин / клавуланат
- **цефалоспорины (II, III пок.)**

- Альтернативные:

- ко-тримоксазол
- нитрофурановые (нитрофурантоин,
- фосфомицин + триметамол)

- Длительности лечения:

- **острый цистит - 3-5 дней**
- **острый пиелонефрит 10-14 дней**
- **тяжелое течение пиелонефрита - парентеральное введение**

# **АБ терапия осложненных инфекций мочевыводящих путей (формуляр РФ)**

- Препараты выбора:

- Цефалоспорины (II, III, IV пок.) + аминогликозиды
- Фторхинолоны (норфлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин)
- Карбапенемы (имипенем, тиенам, макропен)
- Ампициллин + аминогликозиды

- Альтернативные:

- Амоксициллин/клавуланат Ампициллин/сульбактам

- Длительность лечения:

- острый цистит 7-14 дней
- острый пиелонефрит > 14 дней:
  - I ступень - парентеральное введение;
  - II ступень - внутрь
- Примечание: нефторированные хинолоны (налидиксовая кислота), оксихинолины (5-НОК) для терапии ОИМВП не применять, т.к. в паренхиме почек не создают терапевтическую концентрацию

# Лечение пиелонефрита

- 1. Антибактериальные средства
  - Антибиотики
  - Сульфаниламиды
  - Нитрофураны
- 2. Противовоспалительные
- 3. Спазмолитические

# Препараты для антибактериальной терапии пиелонефрита

- Перорально

- Фторхинолоны (норфлоксацин и др.)
- Аминопенициллины (амоксициллин, ампициллин)
- Пенициллины + ингибиторы бета-лактамаз (амоксициллин/claveуланат, ампициллин/сульбактам)
- Цефалоспорины 1-Й поколения (цефалексин, цефаклор, цефуроксим аксетил)

- Тяжелое течение, парентерально

- Пенициллины + ингибиторы бета-лактамаз (амоксициллин/claveуланат, ампициллин/сульбактам)
- Цефалоспорины II-III поколений (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон)
- Карбапенемы (имипенем, меропенем)
- Аминогликозиды (гентамицин, нетилмицин, амикацин)

# ФТ хронического пиелонефрита

- Фаза обострения

- 1. Тяжелое течение:
  - I ступень - внутривенное, внутримышечное введение антибиотиков;
  - II ступень - внутрь.
- 2. Средней тяжести, легкой тяжести - антибиотики внутрь

# **ФТ хронического пиелонефрита**

- **Фаза неполной ремиссии, противорецидивное лечение**

- Нефторированные хинолоны нитроксолин (5-НОК) оксолиновая кислота (грамурин) циноксацин (цинобак)
- **Производные нафтиридина:**
- налидиксовая кислота (неграм, невиграмон)  
пипемидовая кислота (палин, пипем, пимидель)
- **Производные нитрофурана:**
- нитрофурантоин, фуразидин (фурагин), фуразолидон
- триметоприм + сульфаметоксазол (ко-тримоксазол, септим, бисептол)
- **Растительные антисептики (сборы):** клюква, береза, толокнянка, полевой хвощ, зверобой, земляника, крапива, **шиповник** и др.

# **АБ терапия инфекций нижних мочевыводящих путей (цистит + уретрит + цервицит)**

- Возбудители - хламидии, уреаплазмы, микоплазмы
- Антибиотики выбора :**макролиды, тетрациклины, рифампицины**