

223 пацієнток
6,5 лет наблюдения


СНМП у женщин: Анализ результатов скрининга

Stefan Heidler a, Clifford Deveza a, Christian Temml b, Anton Ponholzer a, Martin Marszalek a, Ingrid Berger a, Alexandra Bluhma, Stephan Madersbacher

Department of Preventive Health, City of Vienna, Vienna, Austria Department of Urology and Andrology, Donauspital, Vienna, Austria

Подготовлено на кафедре урологии МГМСУ В.Малхасяном

Возникновение и ремиссия СНМП



□ Риск возникновения СНМП de novo не коррелировал с возрастом:

20–39 лет, 5.6%;

40–59 лет, 5.9%;

>60 лет, 3.7%

□ Полная ремиссия у 24 (30%) из 80 женщин с СНМП!!!


□ Вероятность ремиссии не зависела от возраста:

20–39 лет, 4.6%;

40–59 лет, 4.7%;

>60 лет, 4.3%.

Из 105 женщин отмечавших СНМП спустя 6.5 лет



Возникновения расстройства накопления de novo

- ... Выросло с 79 (из 80 женщин с СНМП) до 90
 - Показатель возникновения симптомов накопления de novo имел слабую обратную связь с возрастом:
 - 20–39 лет, 4.7%;
 - 40–59 лет, 4.6%;
 - >60 лет, 2.5%.
-

Ремиссия симптомов накопления

- Полная ремиссия симптомов накопления наблюдалась у 24 женщин.
- Показатель ремиссии имел слабую прямую связь с возрастом:

20–39 лет, 4.6%;

40–59 лет, 5.1%;

>60 лет, 6%.

Возникновение симптомов опорожнения de novo

- ...с 1 до 42
 - $42 = 15 \text{ CO} + 27 \text{ CO/CH}$
 - Показатель возникновения симптомов опорожнения не коррелировал с возрастом:
 - 20–39 лет, 2.7%;
 - 40–59 лет, 2.5%;
 - >60 лет, 2.9%.
-

Аналогичные исследования

□ Мужчины

465 человек

IPSS не изменился 19%

IPSS ухудшился 50%

IPSS улучшился 31%

□ Женщины

Симптомы не изменились 22,9%

Симптомы ухудшились 52.4%

Симптомы улучшились 24,7%

Lee et al

- 1177 мужчин 5 лет
- 20% отмечали улучшение
-
- 20% урежение мочеиспускания
- 16% уменьшение ургентность



Выводы

- В отличие от мужчин СНМП у женщин имеют не прогрессирующий а динамический характер
 - Патогенез СНМП является мультифакторным процессом
 - Возрастные изменения тканей МП играют центральную роль в развитии СНМП
-

Выводы

- Симптомы накопления регрессируют чаще чем симптомы опорожнения...
 - У мужчин фактором риска развития СНМП является возраст!!!!
 - факторы риска развития СНМП у женщин выявить не удалось!!!
-

Спасибо за внимание

