

# Депрессивная фаза биполярного аффективного расстройства

**Выполнил:** Студент 419 группы  
лечебного факультета  
Попович М.В.

**Преподаватель:** асс. Кузнецов О.И.

# Биполярное аффективное расстройство

Эндогенное психическое заболевание, характеризующееся периодичностью возникновения аффективных нарушений в виде депрессивных и маниакальных состояний с полной их обратимостью и восстановлением психических функций в интермиссию. Имеет наследственную предрасположенность.



# Современный взгляд

- БАР – широко распространённое инвалидизирующее хроническое заболевание;
- Начинается в молодом возрасте;
- Имеет серьёзные последствия (длительная нетрудоспособность, риск суицида);
- Затруднение социальной адаптации человека;
- Трудно для диагностики;
- Клиническое ведение пациентов должно быть индивидуальным и пожизненным

# Депрессивная фаза

Характеристика депрессивной фазы:

- Гипотимия (сниженное настроение);
- Брадифрения (снижение умственной деятельности)
- Гипокинезия (снижение двигательной активности)
- Гипобулия (снижение воли)

# Стадии течения депрессивной фазы

Стадия	Признаки
Начальная	Незначительное ослабление жизненного тонуса; Нерезкое ухудшение настроение; Снижение работоспособности; Трудности с засыпанием, поверхностный сон.
Нарастающая депрессия	Явное угнетение настроение; Присоединение иррациональной тревоги; Значительное ухудшение работоспособности; Моторная и умственная заторможенность; Замедление темпа речи; Стойкая бессонница; Заметное ухудшение аппетита.
Выраженная депрессия	Максимальное развитие депрессивных симптомов; Мучительная патологическая тревога; Интенсивная стойкая тоска; Тихая, замедленная речь; Возникновение депрессивного ступора; Появление бредовых идей самоуничтожения, самообвинения, ипохондрические настроения; Возникновение суицидальных мыслей и действий; Нередко возникают слуховые галлюцинации.
Реактивная	Постепенное ослабление депрессивных признаков с сохранением астении; В редких случаях отмечается незначительное психомоторное возбуждение.

# Типичные варианты депрессий

## Витальная депрессия

- Тоска и психомоторная заторможенность
- Максимальная выраженность в утренние часы

## Апатическая депрессия

- Дефицит побуждений с падением жизненного тонуса;
- Обеднение мимики, монотонность речи, замедленность движений;
- Склонность к самоповреждениям

## Анестетическая депрессия

- Отчужденность;
- Наличие болезненной психической нечувствительности






# Циркулярные депрессии

**Циклотимические депрессии** –  
признаки депрессии  
малозаметны

- Астеногипотимические
- Астенодисфорические
- Адинамические
- Неврастено-ипохондрические
- Простые гипотимические

**Простые циркулярные депрессии** – подавленное угнетённое настроение, снижение побуждений и воли. Не достигают уровня психоза

**Бредовые циркулярные депрессии** – сочетание выраженного депрессивного эффекта и депрессивных бредовых идей



# Атипичные варианты депрессий

**Сенесто-ипохондрические депрессии** – аффективные нарушения, вегетативные симптомы, ипохондрические расстройства в форме навязчивой ипохондрии (мысль о соматическом заболевании). Склонность к затяжному течению с относительным постоянством клинической картины.

**Депрессии с явлениями навязчивости** – навязчивые явления с тягостным аффектом (прим.: страх заболеть неизлечимым заболеванием), может присутствовать депрессивная триада.

**БОЛЬ В ГОРЛЕ?**



**ВЕРОЯТНО РАК!**





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**