


Десмургия



преподаватель: Кассир Любовь Ивановна
исполнитель: Купач Олеся Сергеевна


ПОВЯЗКА «УЗДЕЧКА»

- Повязка «узdechka». Применяется при повреждениях лица и подбородочной области, а иногда и при повреждениях волосистой части головы. Эта повязка в основном состоит из четырех чередующихся ходов.
- Первый и второй ходы циркулярные (закрепляющие), идут через затылочный и лобные бугры, третий ход проводят через затылок к подбородку, далее делают вертикальные ходы (4-й, 5-й и 6-й) через подбородок, горизонтальные (круговые ходы (7-й и 8-й), а затем закрепляют повязку. Таким образом можно закрыть всю голову или обе щеки, или подбородок, или шею.



Повязка "чепец"


Повязка "чепец" накладывается для удержания стерильной салфетки на ране или при нагноительных процессах в области свода черепа - теменная область.



Алгоритм выполнения

- *встать лицом к пациенту;*
- *закрыть рану стерильной салфеткой, пользуясь пинцетом;*
- *уложить подготовленный отрезок узкого бинта длиной 70 см на темени в виде ленты, так, чтобы его концы спускались вниз впереди ушных раковин;*
- *попросить пациента или помощника удерживать их натянутыми и слегка разведенными в стороны;*
- *сделать 2 закрепляющих циркулярных тура вокруг головы через лоб и затылок;*
- *следующий тур идет вокруг отрезка бинта, удерживаемого пациентом и направляется по затылочной области на противоположную сторону к другому концу бинта;*
- *обернув тур вокруг противоположного конца бинта-завязки вернуться по лобно-теменной области к первоначальному отрезку бинта-завязки и повторить все действия, постепенно приближая каждый тур к центру головы, пока повязка не закроет всю теменную часть;*
- *оставшийся конец бинта обернуть и завязать вокруг любого конца бинта-завязки и связать под подбородком с противоположной завязкой. Остатки бинта срезать ножницами.*

Повязка на правый глаз




Последовательность действий:

- после циркулярного тура вести бинт по затылку косо вниз и вывести его из-под правого уха на правый глаз;
- повторить циркулярный тур;
- чередовать туры бинтования 2-3 раза до надежного закрепления салфетки. Закрепить повязку вокруг головы и отрезать излишки бинта ножницами.

Праща - полоска ткани или бинта, рассеченная в продольном

направлении с двух концов. Она удобна для фиксации перевязочного материала на голове при ранах в выступающих

частях: в области носа, подбородка, верхней губы, затылка, лба.





Последовательность действий:


- ✓ приготовить "пращу", для чего надо разрезать бинт вдоль с двух сторон, оставив в центре неразрезанную часть 15-20 см;
- ✓ встать лицом к пациенту;
- ✓ закрыть стерильной салфеткой поврежденный участок, пользуясь стерильным пинцетом;
- ✓ пращу наложить на салфетку в поперечном

Поддерживающая повязка на молочную железу накладывается при ранениях, ожогах, воспалительных процессах, после операции.

Последовательность действий.

- встать лицом к пациентке;
- молочную железу максимально отвести вверх и удерживать
- в таком положении до завершения манипуляции;
- первый циркулярный тур фиксировать вокруг грудной клетки под молочной железой;
- второй тур провести под молочной железой косо вверх через надплечье здоровой стороны, далее по спине косо вниз в подмышечную впадину больной стороны и перейти в циркулярный тур;
- следующий тур вновь косой, но направляется несколько выше предыдущего, что приведет к подниманию молочной железы;
- заканчивать повязку циркулярным туром, закрепляемым булавкой на передней поверхности грудной клетки.





- ∞ пятым туром циркулярно охватить плечо - переднюю, наружную, заднюю, внутреннюю поверхности и по передней поверхности плеча вновь вывести на спину, совершая перекрест с предыдущим четвертым туром;
- ∞ чередовать последовательно все туры, постепенно закрыть сустав. Закрепить конец бинта на груди булавкой.


Повязка Дезо накладывается после вправления вывиха плеча, при переломе плеча и ключицы. Перед наложением повязки необходимо осмотреть подмышечную впадину, припудрить ее тальком и вложить ватно-марлевый валик для абсорбции пота и предупреждения мацерации кожи.



Последовательность действий:

- ❖ встать лицом к пациенту;
- ❖ положить ватно-марлевый валик в подмышечную впадину и согнуть руку в локтевом суставе под углом 90° ;
- ❖ сделать первый фиксирующий циркулярный тур через грудную клетку с захватом больного плеча, повторив его дважды;
- ❖ второй тур вести со спины из подмышечной впадины здоровой стороны на больное надплечье;
- ❖ третий тур (продолжение второго) опустить с надплечья по задней поверхности плеча, охватить снизу предплечье больной руки и, направляясь через здоровую подмышку, вести по спине на больное надплечье;
- ❖ четвертый тур опустить вниз по передней поверхности плеча и, охватывая локоть больной руки, вести по спине, возвращаясь на переднюю поверхность груди из-под здоровой подмышки;
- ❖ все туры повторить, начиная со второго, 3 раза. Повязку заканчивают циркулярным туром вокруг грудной клетки и фиксируют булавкой. Излишки бинта срезать.


Спиралевидная повязка



- Затем сделать два фиксирующих тура у основания грудной клетки, далее бинтуем по спирали вверх.
- Связываем лямки на другом плече.

При переломе ребер применять нельзя, так как она вызывает застой в лёгких и пневмонию.

Повязка "рыцарская перчатка" накладывается при ожогах, ранениях и воспалительных заболеваниях пальцев кисти.



Последовательность действий:

- ✓ встать лицом к пациенту и повернуть его кисть ладонью вниз;
- ✓ наложить стерильные салфетки на раны пальцев;
- ✓ сделать первый циркулярный (фиксирующий) тур вокруг запястья;
- ✓ начинать повязку на левой руке с пятого пальца, а на правой - с большого пальца;
- ✓ провести второй тур косо по тыльной поверхности кисти к ногтевой фаланге соответствующего пальца;
- ✓ сделать несколько туров вокруг пальца от его конца до основания;
- ✓ возвращаться от основания пальца по тылу кисти на запястье;
- ✓ сделать циркулярный тур вокруг запястья и вести бинт к ногтевой фаланге следующего пальца. Чередовать ходы бинта, пока не забинтуются все пальцы. Фиксировать повязку циркулярным туром на запястье. Излишки бинта срезать ножницами.

черепашня повязка


черепашня повязка применяется при повреждениях, ранениях и воспалительных заболеваниях в области коленного и локтевого суставов.

Последовательность действий:


встать лицом к пациенту;

придать среднефизиологическое положение локтевому или коленному суставу;

пинцетом наложить стерильную салфетку на область раны.



излишки бинта ножницами.



Спасибо за внимание