

Қазақстан Республикасының Денсаулық Сақтау Министрлігі
Семей Мемлекеттік Медицина Университеті
Неврология, психиатрия және наркология кафедрасы

Диабетикалық нейропатия.
Полинейропатия.

Орындаған: Исакова М.Ж.

504-топ

Тексерген: Енсебаева Ш.Д.

Қант диабеті

Өзектілігі

- ◎ БДҰ анықтамасы бойынша, ҚД – «барлық жастың және барлық халықтардың ауруы», немесе «халық ауруы».
- ◎ 2014 ж. деректерге сәйкес, әлемде 371 миллион адам ҚД ауырады,
- ◎ Анықталмаған ҚД оқиғалары – 187 млн,
- ◎ ҚД-нен қаза болу – жылына 5 млн,
- ◎ Жалпы шығындар– жылына 471, 6 миллиард

Өзектілігі

Тоқтарова Нейля Нұрланқызы ҚР ДСМ бас штаттан тыс эндокринологы :

2014 жылы–ҚР-да ҚД ауыратындар саны 240 000 аса

225 618 - ҚД 2 тип

14 445 – ҚД 1 тип

21 049 – алғаш рет анықталған ҚД

Диабеттік нейропатия

Диабеттік нейропатия - жүйке жүйесінің клиникалық немесе субклиникалық патологиясы, ҚД дамуына басқа себептер болмаған жағдайда, байқалады.

Диабеттік нейропатияның клиникалық көріністері ҚД ауыратындардың 50% да байқалады.

ҚД ауыр өтетін болса, аурудың ұзақ декомпенсациясынан хабар беретін клиникалық белгілер кешені түрінде асқынулар пайда болуы мүмкін.

Бұған Мориак және Нобекур синдромдары жатады.


Мориак синдромына кіреді:

дене және жыныстық даму кешеуілдейді,

Денеде, бетте артық теріасты жасұнық жиналады.

гепатомегалия.

Нобекурс синдромы семіздіктен басқа, аталған белгілердің барлығынан тұрады



ҚД тигізетін зардабы

Қант диабеті–21 ғасырдың инфекциялық емес пандемиясы

- Инфаркттер мен инсульттардың жиілігі 2-4 есе жоғары
- СБА- 2 есе жиі
- соқырлық- 10 есе жиі
- гангрена - 20 есе жиі
- Ұрық дамуының бұзылуы- 6 есе жиі
- Өмір сүру ұзақтығының азаюы 10-20 %ға
- Қаза болуы- 2 есе жоғары
- Жыл сайын ҚД ауыратындармен 500 000 гемодиализ жүргізіледі

Анықтама

Қант диабеті (ҚД) –абсолютті немесе салыстырмалы инсулин тапшылығына негізделген созылмалы гипергликемиямен сипатталатын мирас немесе жүре пайда болған аурулар мен патологиялық күйлердің гетерогенді тобы.

Классификация

* БДҰ ҚД бойынша сарапшылар комитетінің ұсыныстарына сәйкес, бүкіл әлемде осы аурудың бірыңғай классификациясы қолданылады

ҚД	Аурулардың сипаттамасы
1 типті қант диабеті - аутоиммунды - идиопатиялық	Әдетте абсолютті инсулин жетіспеушілігіне алып келетін ұйқы безінің В-жасушалары құрылысының бұзылуы
2 типті қант диабеті	Басым инсулинорезисторлықпен және салыстырмалы түрде инсулин жетіспеушілігімен немесе инсулинорезисторлықпен немесе инсулинорезисторлықсыз инсулин секрециясының басым ақауымен сипатталады
Гестационды қант диабеті	Жүктілік кезінде пайда болады

Диабетическая полинейропатия

Вегетативная

- **Кардиальная:** ригидный пульс, безболевой или малосимптомный инфаркт миокарда, аритмии
- **Нарушение терморегуляции и потоотделения**
- **Бессимптомные гипогликемические состояния**
- **Желудочно-кишечная:** нарушения перистальтики, дистония желудка и пищевода (гастропарез, рвота), усиленная моторика кишечника (диарея, запоры)
- **Урогенитальная:** Дистония мочевого пузыря, эректильная дисфункция
- **Трофические нарушения:** отеки ног, безболевые язвы в местах давления



Периферическая

Гипо- или арефлексия

Парестезии/онемение

Нарушение чувствительности:

- безболезненные язвы
- ожоги
- пролежни
- раны

Мышечная атрофия

Парез мышц

Боли в ногах (в покое и по ночам)



Қант диабетінің басқа түрлері

- В-жасушаларының функциясындағы генетикалық ақаулар – инсулиннің әсер етуіндегі генетикалық ақаулар
- Ұйқы безінің экзокринді бөлігіндегі аурулар
- эндокринопатиялар
- дәрілермен немесе химикалиялармен индукцияланған диабет
- Инфекциялармен индукцияланған диабет
- Иммунаралық диабеттің ерекше формалары
- Қант диабетімен бірігетін басқа генетикалық синдромдар


ҚД 2 СКРИНИНГІ

Американдық Диабеттік Ассоциацияның (ADA) ұсыныстарына сәйкес, 2014 ауру белгілері болмаған жағдайда диабетке скринингті:


- * Артық салмағы және/немесе 2 қосымша қатер факторы
 - * семіздік
 - * Қант диабетімен ауыратын бірінші немесе екінші ұрпақ туысқандары, инсулинорезисторлық белгілері
 - * Ана анамнезінде гестационды диабет болған жағдайда,
 - * 10 жастан асқан балаларға (жыныстық жағынан ерте жетілсе, одан да жас) және жасөспірімдерге жасауға болады.
 - * Егер тсст нәтижелері жақсы болса, оны әр 3 жыл сайын өткізіп тұру керек.
-
- * Балалық шақта пайда болған 1 тип қант диабеті басталған кезде ауру қатты күшейіп, кетоацидозға дейін жылдам асқынып кетуі мүмкін, және уақытылы диагностика болмаған жағдайда кетоацидоздық комаға дейін әкеп соқтыруы мүмкін.

Diabetic Peripheral Neuropathy

Healthy Nerves and Blood Vessels



Nerves and Blood Vessels Damaged by DPN



Қант диабетінің негізгі белгілері

- ⦿ полиурия (кіші дәретке жиі отыру);
- ⦿ полидипсия (шөлдеу);
- ⦿ ауызда құрғақтық;
- ⦿ полифагия (кенеттен тәбеттің ашылуы);
- ⦿ дене массасының азаюы;
- ⦿ ауыздан ацетон дәмінің шығуы.

Диагностика

- ⦿ Көптеген балаларға ҚД диагнозы аурудың классикалық белгілері негізінде және
- ⦿ гипергликемия,
- ⦿ глюкозурия,
- ⦿ кейбіреулерінде— кетоз немесе кетоацидоз болған жағдайда қойылады.

- Аш қарында плазма глюкозасының деңгейі келесідей көрсеткіштерге ие болса, диагноз қоюға түрткі болады:
- 6,1 ммоль/л дейін— қалыпты мөлшер
- 6,1-7,0 ммоль/л — аш қарында гликемияның бұзылуы;
- 7,0 ммоль/л аса —Қд алдын ала диагнозы, қандағы глюкозаны қайта тексеру арқылы расталу қажет

Қант диабеті диагнозы және гипергликемияның басқа категориялары (БДҰ)

	Нозология	Бүтін капиллярлық қандағы глюкозаның концентрациясы (ммоль/л)	Көктамыр қанының плазмасындағы глюкозаның концентрациясы (ммоль/л)
Қант диабеті			
Аш қарында		>6,1	>7,0
Глюкоза салған соң 2 сағаттан кейін		>11,1	>11,1
Глюкозаға төзімділіктің бұзылуы			
Аш қарында		5,6-6,1	6,1-7,0
Глюкоза салған соң 2 сағаттан кейін		7,8-11,1	7,8-11,1

Глюкозурияны анықтау

- Глюкозурия қандағы глюкоза деңгейі 9 ммоль/л асса пайда болады, бірақ бұл көрсеткіш бүйректің бастапқы мәнінің шамасына байланысты әр адамда әр түрлі болуы мүмкін.
- Алайда, аглюкозурияның болмауы ҚД жоқтығын білдірмейді, керісінше, глюкозурияның ҚД-не байланысы жоқ себептері болуы мүмкін.

Кетонурия

ҚД ауыратындарда кетон денелерінің болуы декомпенсацияның бар екендігін білдіреді.

Гликирленген гемоглобин

- ҚД зертханалық критерийлері тек қана гликемияның диабеттік деңгейлері емес, сондай-ақ норма < 5,7% болғанда, HbA1c > 6,5% деңгейі.
- 5,7- 6,4 % шамасындағы HbA1c көрсеткіштері диабеталды жағдайды білдіреді.
- Көрсеткіш көбінесе диагностика үшін емес, ҚД компенсациясын бақылау үшін қолданылады.

ҚД ауырлық дәрежесін анықтау

Жеңіл өтетін ҚД	Микро- макротамыр асқынулар жоқ
Ауырлық дәрежесі орташа ҚД	Диабеттік ретинопатия, непролиферативті кезең. Микроальбуминурия кезеңіндегі диабеттік нефропатия. Диабеттік полинейропатия
Ауыр өтетін ҚД	Препролиферативті пролиферативті кезеңдегі диабеттік ретинопатия Диабеттік нефропатия, протеинурия кезеңі немесе СБЖ. Автономды полинейропатия

1 типті ҚД кезінде көмірсу алмасуын компенсациялау критерийлері

Көрсеткіш	Компенса-ция	Субкомпен-сация	Декомпенсация
НbA1c, %	6,0-7,0	7,1-7,5	>7,5
Аш қарындағы гликемия, ммоль/л	5,0-6,0	6,1-6,5	>6,5
Постпрандиалды гликемия (астан соң 2 сағ кейін), ммоль/л	7,5-8,0	8,1-9,0	>9,0
Ұйықтар алдындағы гликемия, ммоль/л	6,0-7,0	7,1-7,5	>7,5

тәуліктік инсулин қажеттілігі

Диабеттің бастапқы кезеңі	«Бал айы»	Ұзаққа созылғанди абет	Декомпенсация (кетоаци-доз)	Препубертат	Пубертат
0,5-0,6	<0,5	0,7-0,8	1,0-1,5	0,6-1,0	1,0-2,0

Әрекет ету принципі

Нарықтағы барлық инсулин помпаларының әрекет ету принципі бірдей:

- Теріасты майлы жасушаға инсулинді тұрақты түрде енгізуге арналған жинақы электромеханикалық құрылғы

Инсулиннің шприцтік инъекцияларымен салыстырғанда
помпалық терапияның артықшылығы

Инфузионды құрылғыны

15-20 инъекцияның орнына 3 күн ішінде

1 –ақ рет ауырпай енгізу!

Инсулин помпасымен жүруші күнделікті өмірде сау адамдардан

еш

айырмашылығы болмайды!

Инсулиннің шприцтік инъекцияларымен салыстырғанда помпалық терапияның артықшылығы– медициналық аспектілер

- Инсулинді енгізу тәртібі ұйқы безінің физиологиялық секрециясына барынша жақындайды, соның нәтижесінде:
 - Инсулиннің шприцтік инъекцияларымен салыстырғанда помпалық терапияның артықшылығы– медициналық аспектілер
- Помпалық инсулинотерапия басталғаннан соң 2-3 айдан кейін қандағы гликозилирленген гемоглобин деңгейі төмендейді.
- Гипогликемиялық күй оқиғаларының жиілігі төмендейді, «таң сәрісі» белгісі жойылады.
- Айтарлықтай алшақтық, тіпті қант диабетінің дамуынсыз, асқынуынсыз (ДКА, «диабеттік табан», ретинопатия, нейропатиялар, бүйрек функциясының бұзылуы және т.б.)

12.09.2012 жылы Алматы қ. №7 қалалық ауруханасында **ұйқы безі+ бүйрек** кешені туған ағасынаан ауыстырылды.

ҚД ЖІТІ АСҚЫНУЛАРЫ

- Кетоацидозды кома
- Гипогликемиялық кома

ҚД СОЗЫЛМАЛЫ АСҚЫНУЛАР

- диабеттік ретинопатия,
- диабеттік нефропатия,
- диабеттік нейропатия,
- хайропатия немесе буындардың шектелген қозғалысы және т.б.
- Асқынулардың пайда болуы денсаулықты болжауды қиындатады және аурулардың өмірінің сапасын төмендетеді

Диабеттік ретинопатия

- Диабеттік ретинопатия - көз торының және оның тамырларының ерекше зақымдануы, ол экссудативті ошақтардың түзілімен, ретиналды және преретиналды қан құйылумен, жаңадан түзілген тамырлардың өсуімен, тордың тракциялық қабаттануымен, рубеозды глаукоманың дамуымен сипатталады.
- ДР жас адамдарда болса, көру және есту қабілеттерінің төмендеуіне алып келеді, бұл ҚД ауыратындарда жалпы популяциямен салыстырғанда 25 есе жиі .

Диабеттік нейропатия

- Диабеттік нейропатия - жүйке жүйесінің клиникалық немесе субклиникалық патологиясы, ҚД дамуына басқа себептер болмаған жағдайда, байқалады.
- Диабеттік нейропатияның клиникалық көріністері ҚД ауыратындардың 50% да байқалады.
- ҚД ауыр өтетін болса, аурудың ұзақ декомпенсациясынан хабар беретін клиникалық белгілер кешені түрінде асқынулар пайда болуы мүмкін.
- Бұған **Мориак және Нобекур синдромдары** жатады.
Мориак синдромына кіреді:
 - дене және жыныстық даму кешеуілдейді,
 - Денеде, бетте артық теріасты жасұнық жиналады.
 - гепатомегалия.
 - **Нобекурс синдромы** семіздіктен басқа, аталған белгілердің барлығынан тұрады

Негізгі Қант диабеті жаяу жарақат тетіктері - диабеттік нейропатия (залал болып табылады барлық түрлерінің азаюына әкелетін аяқ нерв ұштары, сезімталдығы) және диабеттік ангиопатия (тамырлы өткізгіштігінің бұзылуы). Невропатии жиі ангиопатияны қарағанда 2-3 есе орын алады, осылайша кеңінен барлық проблемаларды Қант диабеті патологиясы туындаған деген наным кең тараған қате кемелер.






Себебі нейропатия сезімталдығы бұзылған, және пациент аяғын (күйік, жарақат алады аяқ киім жарақат және т.б.. б.) және оны сезінуге емес. Қант диабеті кез келген жарақат өсті қандағы қант деңгейіне байланысты ұзақ уақыт бойы емдеуге мүмкін емес. Пайда SDS (85-90%) және трофикалық ойық сайып келгенде әкелуі мүмкін мүгедектік: барлық ампутацияға (жоқ жарақат байланысты) жартысынан астам Қант диабетімен ауыратын науқастарға үлесі есепке!

- * Қандай Мұны болдырмау үшін не істеу?
- * Бірінші - Дейін (қолайлы ауқымында қандағы қант деңгейін сақтай отырып, диабет емдеу үшін 5.5-6.0 ммоль/л глюкоза мен ішкеннен кейін 8-9 ммоль/л).
- * Without қырып аяқ қан қант емдеу қалыпқа тиімді ешқашан!

* Екінші - Аяқ күтіміне арнайы ережелерін сақтауға. Аулақ болу керек залал әлі (оны аяқ жағдайын тексеруге, еденге аяқ жүруге жоқ) қатты немесе руб емес болуы тиіс. Ол аяқ мақсатында күнделікті тексерілуі тиіс қабілеті нашар адамдарға арналған байланысты зиянның ерте анықтау, Сезімталдық нежность көрсетпеуі де мүмкін.



* Үшінші - Диабеттік нейропатия және ангиопатияны уақтылы дәрілік терапия. Дәрі-дәрмектер сарапшылар шкафтарын тағайындалды тиіс Диабеттік табан , сондай-ақ эндокринолог, невропатолог және т.б.