

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік  
университеті

Тақырып: **Дисфункционалдық жатырдан  
қан кету**


Қабылдаған:

Орындаған: Мадиева.М

Тобы: СТК-330



# жоспар

- Кіріспе
  - Негізгі бөлім
  - Етеккір циклы
  - ДЖҚ кету. Оның этиологиясы, жіктелуі
  - ДЖҚ түрлері және емі
  - ЮЖҚ. Диагностикасы, емі
  - Қорытынды
- 


## «Етеккір» термині

- Екі фазалы етеккір циклының соңында болатын, эндометрийдің сылыну нәтижесінде жыныс жолдарынан кезеңді қанды бөліністердің пайда болуы. Жетілген ұрық жасушаларымен ұрықтанбаған кезде жүреді.
- **Менархе** – етеккірдің алғаш пайда болуы.

# Дисфункциональды жатырдан қан кету (ДЖК)

- Фолликуллардың пісіп жетілуінің бұзылысына әкелетін, гипоталамус – гипофиз – аналық безі жүйесіндегі функционалдық өзгерістерге байланысты жыныстық гормондардың ретті секрециясының өзгеруімен сипатталатын қан кетулер.
- Мына қан ағулар *байланысты емес* :
- Жүктіліктің үзілуімен;
- Әйел жыныс ағзаларының органикалық ауруларымен;
- Ағзадағы жүйелі аурулармен;
- Қан ауруларымен;

## Этиологиясы:

- Алиментарлық факторлар;
  - Психикалық стресстер;
  - Сыртқы ортаның қолайсыз әсері;
  - Инфекциялық және созылмалы аурулар;
  - Эндокринді бездердің әр түрлі қызметтерінің бұзылысы;
  - Зиянды әдеттер.
- 

## Дисфункциональды жатырдан қан кету Жіктелуі (әйел жасына байланысты)

- Ювенильді кезеңдегі ДЖҚ (12-17 жас) – 25%
- Репродуктивті кезеңдегі ДЖҚ (18-45 жас) – 50%
- Климактерлік кезеңдегі ДЖҚ (46-55 жас) – 25%

# Патогенезіне байланысты

## ❖ Ановуляторлық

- 
- Фолликулдың персистенциялық түріне байланысты;
  - Фолликулдың атрезиялық түріне байланысты;

## ❖ Овуляторлық

- 
- Фолликулдық фазаның қысқаруы;
  - Лютеинді фазаның қысқаруы;
  - Лютеинді фазаның ұзаруы;

# Ановуляторлық ДЖҚ


ДЖҚ патогенезі бойынша жіктелуі	Ановуляторлық ДЖҚ		
	Фолликулалардың қысқа уақытты ритмді персистенциясы	фолликула лардың ұзақ персистенциясы	Фолликулалар атрезиясы
Клиникасы	Бедеулік, гиперполименорея	Етеккірдің 4-8 аптаға іркілуі, көп мөлшерде қан ағу, анемия	Етеккірдің 3-4 аптаға іркілуі, аз мөлшерлі ұзақ уақыт қан ағу
Диагностикасы	Клиникасы, объективті қарап тексеру, қосымша зерттеу әдістері		
Қосымша зерттеу әдістері –функциональды диагностика тесті (ФДТ)			
Ректальды температура	монофазалы	монофазалы	монофазалы
«қарашық» және папоротник симптомы	ЕЦ 7- күнінен қан ағу пайда болғанша оң болуы	ЕЦ барлық ағымында қан ағу пайда болғанша айқын болуы	Әлсіз оң, үнемі
КПИ	70-85% 14 күніне жуық қан ағу пайда болғанша	70-85%	25-30%



# Ановуляторлық ДЖК

## Фолликулалардың персистенциясы

Фолликулалар, жетілудің бір деңгейіне жетеді және бұл кезде овулиция жүрмейді, бірақ эстрогендердің бөлінуі жалғасады




Прогестерон жетіспеушілік жағдай дамиды

# Қалыпты аналық безі циклы



3-4 аптаға іркілуі

**Эстрогендер деңгейінің ұзақ уақыт әсер етуі, эндометрийдің қан тамырлары мен пролиферациялық бездердің құрылымының шектен тыс өсуіне әкеледі**




**Овуляцияның және сары дененің прогестерон секрециясының болмауына байланысты эндометрийдің қалыпты сылынуы жүрмейді**

# Қалыпты аналық безі циклы




0 7-8 14-16 28 ЕЦ күні

## Фолликулалар атрезиясы



0 7-8 14-15 4-8 аптаға кідірілуі

# Қалыпты аналық безі циклы



# Ановуляторлық ДЖК емі

Фолликулалардың қысқа уақытты персистенциясы

Организмнің эстрогендерге қанықтылығының сәл төмендеуінде – 3-4 ай аралығында эстрогендермен және гестагендермен циклды терапия жүргізеді (I фазада – эстрогендер, II фазада – гестагендер).

Фолликулалардың ұзақ уақытты персистенциясы

Эстрогендерге қанықтылығы жоғарылағанда ХГ 1000-1500 ЕД - дан, 12 күнінен 16 күніне дейін жүргізеді. Сонан соң прегнин 0,01 x 2 рет/күніне – 7 күн (3-4 ай көлемінде). Эстрогендерге қанықтылығы қалыпты болғанда – овуляцияны стимуляциялайды.

# Овуляторлық ДЖҚ

ДЖҚ патогенезі бойынша жіктелуі	Овуляторлық ДЖҚ		
	Фолликулинді фазаның қысқаруы	Лютеинді фазаның қысқаруы (гиполютеинизм)	Лютеинді фазаның ұзаруы (гиперлютеинизм)
Клиникасы	ЕЦ 14-21 күнге дейін қысқаруы, гиперполименорея, бедеулік, жүктілікті көтере алмаушылық		ЕЦ ұзаруы, қан ағу
Диагностикасы	Клиникасы, объективті қарап тексеру, қосымша зерттеу әдістері		
Қосымша зерттеу әдістері –функциональды диагностика тесттері (ФДТ)			
Ректалды температура	I-і фазаның қысқаруы екі фазалы	II-і фазаның қысқаруы екі фазалы	II-і фазаның ұзаруы екі фазалы
«қарашық» және папоротник симптомы	Тез пайда болуы, максимум 8-10 күні	ЕЦ қалыпты кезеңіндегі тәрізді	
КПИ	ЕЦ қалыпты кезеңіндегі тәрізді		

# Овуляторлы ДЖҚ емі

Фолликулинді фазаның қысқаруы	қажет етпейді (көп мөлшерлі етеккірде – синтетикалық прогестиндермен гормональды емдеу)
Лютеинді фазаның қысқаруы	гестагендерді циклдың ІІ фазасында – оргаметрил, норколют 10 мг – нан 6 ай ішінде етеккір циклының 15 күнінен 24 күндер арасында тағайындалады.
Лютеинді фазаның ұзаруы	Жатыр қуысын диагностикалық қыру, көп мөлшерлі қан кеткенде эстрогендерді циклдың 1 күнінен 25 күніне дейін, ал прогестиндерді циклдың 5 күнінен 25 күніне дейін тағайындайды.




# Ректальды температура



- Базальды температураны тік ішекте күнделікті таңертең төсектен тұрмай өлшеп, күнтізбеге тіркейді.

# «Қарашық» және папоротник симптомдары



- Перивуляторлы кезеңде жатыр мойнындағы шырыш ашық түсті, мөлдір, созылмалы, көп мөлшерде болады (эстрогендердің шегіне байланысты). Ол қынаптан шырышты бөлінділердің болуымен және вульваның ылғалды болуымен сипатталады.


# Ректальды температура



# ДЖҚ жүргізу тактикасы

1. Қан кетуді тоқтату;
2. Қан кетудің рецидивінің алдын  
- алу;

# ДЖҚ жүргізу тактикасы



Ювенильді  
кезеңде


Репродуктивті  
кезеңде

Климактериялық  
кезеңде

↓  
Симптоматикалық  
гомеостаз



↓  
Гормональды  
гомеостаз





Хирургиялық гомеостаз  
(жатыр қуысын қыру)

↓  
Қырындыны гистологиялық  
зерттеу

# Хирургиялық гемостаз (жатыр қуысын қыру)

Жатыр денесі мен  
цервикальды каналдың  
шырышты қабатын емдік  
және диагностикалық  
мақсатта қыру, одан ары  
алынған қырындыны  
гистологиялық зерттеу



# Ювенильді жатырдан қан кету

- Пубертатты кезеңде ДЖҚ (ювенильді) ювенильді жатырлық қан ағу деп атайды (ЮЖҚ)
- Менархеден кейін алғашқы 2 жылда байқалады.
- Жиілігі, балалық кезеңдегі гинекологиялық аурулардың 20% кұрайды

# Ювенильді жатырдан қан кету

- ЮЖҚ люлибериннің цирхоральды ритмінің тұрақталмауына және гипоталамо-гипофизарлық жүйенің жетілмеуіне байланысты болады.

## Себептері:

- Психикалық және физикалық стресстер;
- Шаршау;
- Тұрмыс жағдайының қолайсыз факторлары;
- Гиповитаминоз;
- Қалқанша безінің және бүйрек үсті безінің дисфункциясы;
- Жедел және созылмалы инфекциялық аурулар;



# Ювенильді жатырдан қан кету


## Патогенезі:

- Көбіне фолликуланың атрезиясы фонында дамиды.

## Клиникасы:

- Алғашқы етеккір уақытында келеді, ал кейіннен 1,5-2-3,5 айға дейін кідірулер болады.

# ЮЖҚ диагностикасы

- Анамнез
  - ЖҚА, коагулограмма
  - ФДТ
  - Қан сарысуындағы гормондарды анықтау
  - Ректоабдоминальды зерттеу
  - Кіші жамбас ағзаларын УДЗ
  - Невропатологтың, эндокринологтың, офтальмологтың кеңесі
  - Бас сүйегінің рентгенографиясы
  - Электрэнцефалография
- 

# Дифференциальды диагностикасы

- Басталған және толық емес түсік
- Верльгоф ауруы (идиопатиялық аутоиммунды тромбоцитопениялық пурпура)
- Эндометрий туберкулезі
- Жатыр денесі мен мойнының рағы

# ЮЖҚ емі

- I саты – қан кетуді тоқтату (гемостаз)
- II саты – қан кетудің алдын алуға және етеккір циклын реттеуге бағытталған терапия.

# I саты – қан кетуді тоқтату

- Гемостаз әдісін таңдар алдында науқастың жалпы жағдайын және қан кету көлемін ескеру қажет.
- Анемия белгілері айқын емес болса (Hb 100 г/л ден ↑ , Ht 30% дан ↑), ал УДЗ мәліметтері бойынша эндометрийдің гиперплазиясы байқалса, онда симптоматикалық гемостаз жүргізіледі.

## ▣ Симптоматикалық гемостаз

Жиырылтатын заттар –  
утеротониктер: окситоцин;  
Гемостатикалық  
препараттар: викасол,  
дицинон, кальций  
глюканаты;  
Антианемиялық терапия:  
темір препараттарын  
пероральды немесе  
парентеральды тағайындау;

## ▣ Гормональды гемостаз

Симптоматикалық  
гемостаздан нәтиже  
болмаған жағдайда  
жүргізіледі.  
эстрогендерді,  
гестагендерді, синтетикалық  
прогестиндерді  
тағайындайды

# Хирургиялық гемостаз

## емізiктi гистологиялық зерттеумен

- Симптоматикалық және гормональды гемостаздан нәтиже болмаған жағдайда тағайындалады (Hb деңгейі 70 г/л төмен, Ht 20% дан төмен)
- Қыздық перденің жыртылуын болдырмас үшін 0,25% новокаин ерітіндісін 64 Бірлік лидоламен енгізеді.
- *Қарсы көрсетулер*: қанның ұю жүйесінің бұзылысы бар науқастар.

## Қосымша:

- Психотерапия,
- Физиоєм: мойын аймағын электрофорездеу (Щербак бойынша жаға сынамасы), инелік рефлексотерапия
- Анемияны емдеу
- Құнарлы тамақтану
- Сумен емдеу
- Инфекция ошақтарын санациялау



**Назар аударып  
тыңдағандарыңызға рахмет!**