

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТИ



КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

Психиатрия және наркология кафедрасы

СӨЖ

Тақырыбы : Егде және қарт жастағы (геронтологиялық аспект)
адамдарының психосоматикалық бұзылыстары

Орындаған : Әмірхан К.Ж.

Тобы : ЖМ13-041-2

Тексерген : Муратбаева А.Б.

Жоспары :

I. Кіріспе

Тақырыпқа байланысты жалпы түсінік;


II. Негізгі бөлім

- ? Инволюциялық депрессия
- ? Инволюциялық параноид
- ? БМ біріншілік дегенеративті аурулары
- ? БМ қан тамырлық аурулары

III. Қорытынды

IV. Қолданылған әдебиеттер

Ағзаның қартауы оның барлық-
биологиялық және психикалық
функцияларының өзгерістерімен
бірге жүреді. Бірақ бұл
өзгерістердің сипаты және пайда
булу уақыты әрбір жеке адамда
ерекше болып келеді. Жасқа
байланысты психикалық
функцияның өзгерістері таңдамалы
түрде және әртүрлі жас
кезеңдерінде пайда болуы мүмкін.
Яғни адамның қиялдау қасиеті
салыстырмалы түрде ерте әлсірейді:
Ашықтығы, бейнелілігі
Зейіннің жылдам ауысу қасиеті
Кешірек жаңа білім, дағды игеру
нашарлайды
Естің элективті бұзылышы дамиды
(қажет мәліметті еске түсірудің
қындауы)



Эмоциональды көріністер

- Эмоциональды тұрақсыздық, үрей дамиды
- Жағымсыз күйзелістерге ұзак фиксацияланута бейімділік
- Депрессивті көңіл күй дамиды

Жеке адам өмірінің жасқа байланысты өзгерістер пайда болатын белгілі бір кезеңдері:

- Жасқа байланысты
- Ағзаның гормональды-физиологиялық өзгерісінің(климакс) басталуына сәйкес келеді.



Эмоциональды көріністер

- Эмоциональды тұрақсыздық, үрей дамиды
- Жағымсыз күйзелістерге ұзак фиксацияланута бейімділік
- Депрессивті көңіл күй дамиды

Жеке адам өмірінің жасқа байланысты өзгерістер пайда болатын белгілі бір кезеңдері:

- Жасқа байланысты
- Ағзаның гормональды-физиологиялық өзгерісінің(климакс) басталуына сәйкес келеді.



- Невроз тәрізді бұзылыстар үйкесінде деңгелік күймен, жағымсыз сезімдермен, эмоциональды тұрақсыз көңіл күймен, тітіркенгіштікпен, ешқандай негізсіз жанұясы мен өз деңсаулығы үшін урейлену және тб көрінеді. Физикалық әлсіздік, соматикалық жайсыздық кандай да бір көтерлі, дауасы жок «өлімге алып келетін» аурудың бар екендігі женинде ой тудырады.
- Психикалық бұзылыстардың айқын формалары психоз түрінде көрінеді: кәрілік алды немесе инволюционды, кәрілік жас психоздары деп белінеді.
- Кәрілік алды психоздарына инволюциялық меланхолия және инволюциялық параноид жатады



• Сенильді психоз

- Ақыл кемістігі күшейген кездегі көрінетін психозы білінеді.Атрофиялық процесстер мида басым болады.Бұл кезде самайда тәбеде ми мелшері кішірейіп,нерв клеткалары еле бастайды.
- Сенильді ақыл кемістігі –бұл жасқа байланысты қалыпты өзгерістер өмірінің табиғи сакталуы емес , патологияның болуы.70-75 жаста,жіне әйелдерде дамиды.
- Ауру адам саран,ұрыскак,ұсак-түйекшіл болады.
- Естің төмендеуінің әсерінен амнезиялық шатасу болады.Ауру адам кайда екенін білмей,айналасындағылар мен жақындарын танымайды.
- Психикалық қызметтің ыңырауы,күшейген кезде амнезиялық афазия болыш,айналадағы заттарды танымайды,есік орнына шкафқа кіреді.
- Ақыл кеміс/н делириозды түрі-сананың бұзылтуы тәрізді болады.
- Ақыл кеміс/н конфабуляторлы түрі-атеросклероз ауруы косылып,асқынғанда дамиды.
- Кетерінкі күй
- Жайбаракаттық
- Тез қимыл
- Тынымсыз әбіргершілік

Жас кезіндері (ДДСҰ)

Инволюциялық кезең –
45 жастан бастап

60-75 жас – *егже жас*

75-89 жас – *кәрілік жас*

90 жастан жоғары – *ұзақ
өмір сүруші*

Кеш жас

Кеш жасқа тән арнайы психикалық бұзылыстар

Функциональдық

Қайтымды, ақыл кемістігінің дамуына әкелмейді

1. Инволюциялық депрессия
2. Инволюциялық параноид

Органикалық

Интеллектің қайтымсыз бұзылыстарымен бірге, БМ дегенеративті процесстердің дамуы жүреді

1. БМ біріншілік дегенеративті аурулары
2. БМ қан тамырлық аурулары

ФУНКЦИОНАЛЬДЫҚ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАРДЫҢ ДАМУ СЕБЕПТЕРІ

Биологиялық:

- Гормональді бұзылыстар
- Созылмалы соматикалық аурулардың жиналуы
- БМ қан тамырлық аурулары

Социальді:

- Еңбек және социальді статустағы өзгерістер
- Кедейлік
- Жақын адамдарымен конфликт
- **Жалғыздық (!)**

Психологиялық

- Қартайғандығын түсіну
- Сенсорлық депривация (уменьшение количества новых впечатлений)
-

Инволюциялық депрессия (кеш жастағы депрессия)

- ? Инволюциялық кезінде алғаш дамыған үрейлі-сандырақтық депрессия.
- ? Психоздың басталуы жиі психотравма немесе ауыр соматикалық аурулардың дамуына алып келеді.
- ? Жиі 45-55 жас.

Бұрынғы атуды –
Инволюциялық
мелонхолия

Инволюциялық депрессия

- ?
- Урей мен қорқынышпен жүретін **депрессия**;
- ?
- Қимылдық қозу**(өздерін қоярға жер таппай ауыр жан күйзелісін білдіретін күрсінген дыбыстар шығарады)
- ?
- Қимылдық тежелу** (мелонхолиялық ступор) – бет-әлпеті қайғы мұнды бейнелейді, беттерінде іркіліп қалған **мұң маскасы** болады.

Депрессивті – сандырақтық идеялар:

- **Өзін-өзі кінәлау** (жақын адамдардың өліміне өзін кінәлайды, яғни оларға дұрыс күтім жасамадым, ертерек дәргерге көрсетпедім деп өздерін жазғырады. Тамақ қабылдаудан бас тартады, оған құқым жоқ деп айтады) **соңына тусу идеялармен** ұштасады.
- **Ипохондриялық** (ішкі мүшелері шіріп, жоқ болып кеткен КОТАР СИНДРОМЫ; ішектері атрофияланған; бауыр немесе бүйрек қызметі толық бұзылған;)
- **Кедейлену** (ақшасы мұлде жоқ екеніне сенеді; үйін алыш алуына байланысты, аштан өлем деп ойлады)

Инволюциялық параноид

- ? Инволюциялық кезеңде дамитын, параноидты сандыракпен (кіші)сипатталатын сандырактық немесе галлюцинаторлы-сандырактық психоз.
- ? *Сандырактық идеялар* : материалдық шығын, уландыру сипатта.
- ? *Есту галлюцинациялары*: науқас қабырғаның арғы жағынан шу, аяқ дыбысын, өзін қорқытатын дыбыстар естиді.

Функциональдық психикалық психоздардың емі

- ? Антидепрессанттар
- ? Нейролептиктер
- ? Электроустамалық терапия(инволюциялық депрессия)
- ? Функциональдық психикалық психоздардың ағымы жиі созылмалы, рецидивпен жүреді.

Альцгеймер ауруы



Жоғарғы қыртыстық функциялар мен есте сақтаудың үдемелі төмендеуімен сипатталатын ОЖЖ дегенеративті ауруы.

Неміс психиатры
Ауруды алғаш 1906 ж сипаттаған.

Alois Alzheimer
1864 - 1915

Қауіп факторлары

- ? Кәрілік жас;
- ? Тұқымқуалаушылық ;
- ? Бақыланбайтын артериальді гипертензия;
- ? Қант диабет;
- ? Липерлипидемия;
- ? Гипергомоцистеинемия;
- ? БМ қанмен қамтамасыз ететін тамырлардың атеросклерозы;
- ? Анамнезінде БМЖ;
- ? Жастық шақтағы депрессия;
- ? Ұзак жасаған әйел адам;
- ? Білім мен интеллектуалды белсененділіктің төмен болуы

Клиника

- 1. Үдемелі амнезия(Рибо заңы)**
2. Жоғарғы қыртыстық функциялар бұзылышы
 - **Апраксия** – күнделікті дағдыларын жоғалту
 - **Агнозия** –танымдық қабілеттерін жоғалту (зат немесе адамдар)
 - **Афазия** – сөзді түсіну және өз ойын жеткізу қабілетін жоғалту (артикуляционный аппарат и слух при этом сохранны)
 - **Аграфия** – жазу қабілетін жоғалту
 - **Акалькулия** – санау қабілетін жоғалту
 - **Алексия** – оқу қабілетін жоғалту

Альцгеймер ауруындағы жоғарғы қыртыстық функциясының бұзылыстардың Динамикасы

?

- **Афазия:** 1) амнестикалық афазия (заттың атуын, есім, сөздерді ұмыту);
2) импресивті(бастапқыда сөйлемді, кейін жеке сөздерді түсіну бұзылады)
3) экспрессивті (сөздік қоры кедейленеді-сөздерін жеңілдетеді-дизартрия – эхолалия) → тотальді афазия
- **Агнозия:** **таным бұзылысы** (алдымен ескі таныстары мен орын; кейін жақсы білетін орындар, туыстары мен жақындарын, айнадан өзін танымайды), **кеңістікті түсіну бұзылысы** (алдымен жаңа жабдықтарды, кейін өз пәтерін, бөлмесін танымайды) → бет-әлпеті абыржыған, көз-қарасы мұлт кетеді.

Апраксия: алдымен **күрделі іс-әрекеттер** (тамақ дайындау, тігу т.б) → кейін **қарапайым іс-әрекеттер** (кине алмайды, жуына алмайды, тамақ іше алмайды) бұзылысы.

Альцгеймер ауруы

? Инициальді стадия

- когнитивті бұзылыстар біртіндеп дамиды:
зейін мен есте сақтауы кенет төмендемейді,
кеңістікті бағдарлау қындаиды, кәсіби әрекеттерінде қателіктер болады.

— Альцгеймерлік таңқалу

- көп науқастарда продуктивті бұзылыстар байқалады(депрессивті және параноидты)

•Деменцияның жеңіл стадиясы

- когнитивті бұзылыстар(кәсіби әрекеттерді орындау бұзылады)
- қарапайым тұрмыстық әрекеттер сақталады, бірақ үнемі туыстарының бақылауын қажет етеді.

? Деменцияның ауыр стадиясы

- тотальный распад интеллект пен барлық психикалық әрекеттердің тотальді ыдырауы

Альцгеймер ауруы

Ерте басталуы

(65 жасқа дейін, пресенильді деменция)

- Инициальді этапта ауру баяу дамиды, кейін тез үдейді
- Парамнезиясыз үдемелі амнезия
- Жоғарғы қыртыстық функциялар бастапты этапта бұзыла бастайды, ары қарай күшеді

Кеш басталуы

(65 жастан кейін, сенильді деменция)

- Барлық этаптары баяу дамиды
- Үдемелі амнезия бұрыңғы оқиғаларлы еске алумен бірге→ өзін жас санайды, ескі таныстарын таниды, күйгелек, үнемі парамнезиялар.
- Жоғарғы қыртыстық функциялар деменцияның ауыр стадиясында байқалады
- Тұлға өзгерісі (дөрекіленген, эгоизм, қанғыруышылық, керек емес заттарды жинау), критика жоқ

диагностика

PET-сканирование мозга при болезни Альцгеймера демонстрирует угасание активности в височных долях.

В диагностике болезни Альцгеймера может помочь нейропсихологическое скрининг-тестирование, при котором пациенты копируют фигуры, запоминают слова, читают, выполняют арифметические действия.

КТ

Емі АА

- 1) Холинэстераза ингибиторы орталыққа әсер ететін (Үдемелі когнитивті жетіспеушілікті баяулатады.
Ерте стадияларында тиімді): ривастигмин (Экселон); галантамин (Реминил)
- 2) Нейропротективті терапия: нейрондарды сақтау – глутамат рецепторларының блокаторларын (Акатинол Мемантин), ноотроптар (пирацетам и т.д.), антиоксиданттар

Пик ауруы

- ? Үлкен жарты шар қыртысының Мандай және самай бөлігінің біріншілік пресенильді атрафиялануы.
- ? Жиі- 50-54 жас.
- ? Ауру тұлға мен ойлаудың терең бұзылыстармен басталады. Критика болмайды, жағдайды бағалау бұзылады, ерік пен таным бұзылыстары дамиды. Автоматтандырылған дағдылар(санау,хат жазу) сақталады, бірақ логикалық бағалау болмайды. Есте сақтау қабілеті кейін төмендейді. Жүріс-тұрысы пассивті, спонтанды, дөрекі. Сөздік белсенділік төмендейді ,«стоячие симптомы» тән.
- ? Морфология: ісінген пирамидті жасушалар анықталады (тельца Пика). КТ –да ақ және сұр зат шекарасы анық емес.

Церебральді атеросклероз

- ? Жиі 50-65 жас
- ? **Псевдоневрастениялық шағымдар**(бас ауру, бас айналу, құлақта шу, тез шаршағыштық, эмоциялық лабильділік)
- ? **Үйқы бұзылсы**
- ? Органикалық өзгерістер- **есте сақтау қабілетінің төмендеуі**(бастапқыда: есімдерді, көрген кино мен оқыған кітаптарының мазмұнын есте сақтауы қын, кейін үдемелі амнезия дамиды. Тек соңғы этаптарда фиксациялық амнезия мен Корсаков синдромы дамуы мүмкін).
- ? Ауруына анық **kritika** болады.
- ? Мидың гемодинамикасы кенет нашарлауы **ЖЕДЕЛ ӨТКІНШІ ПСИХОЗ** (сананың күнгірттену, делирий)дамуына әкелуі мүмкін
- ? Негативті симптоматика **тұлға өзгерісімен** көрінеді(эгоцентризм, ұрсақтық, күмәншілдік, ұсақтық, сараңдық күштейеді. Айналадағыларға кеңестер береді, ескі заттарды тастағылары келмейді, ескі газеттерді, упаковкалар жинаиды, тозған көйлектерді жөндеп беруді өтінеді).
- ? ЦА кезінде терең органикалық бұзылсы **ДЕМЕНЦИЯ**
- ? Деменция жиі сандырақтық психозбен бірге жүреді(сонына тұсу және материалды шығын идеялары)

Колданылған әдебиеттер :

“Психиатрия” М.В. Коркина

- ? “Психиатрия” М. Н. Жариков
- ? “Психиатрия и наркология” Н.Н.Иванец, Ю.Г. Тюльпин, В.В.Чирко, М.А.Кинкулькина
- ? Журнал «Психиатрия и психофармакотерапия» 2010 г.