

Экзема

Орындаған: Исаева.К

Тексерген: Алгазиева Ж.Б.

Экзема дегеніміз –эпидермис пен дерманың қабынуы.
Экзема грек тілінен аударғанда "есзео "- қайнау деген сөзінен шыққан.



Экземаның түрлері:

1. Шынайы экзема
2. Микробты экзема
3. Себореялық экзема
4. Дисгидротикалық экзема
5. Балалар экземасы
6. Кәсіптік экзема

Клиникалық ағымына байланысты: жедел экзема (3 айға дейін), жедел алды (3 айдан 6 айға дейін), созылмалы (6 айдан асса)

Экзема себептері



Эндогенді



Экзогенді

- Эндогенді: нейробиологиялық өзгерістер, аллергиялық, тұқым қуалаушылық факторлардың комплексті әсерінен дамиды.
- Экзогенді: медикаменттер (жергілікті анестетиктер, антибиотик, лейкопластрь), өсімдіктер, саңырауқұлақтар, микроорганизмдер, мұнай, формалин т.б

Шынайы экзема

- Алдымен жедел қабынулық ісінген эритема шығады, содан кейін топталған өте ұсақ көпіршіктер пайда болады, олар түгел дамып бітпей жатып тез жарылады.



- **Дисгидротикалық экзема** алақан мен өкшеде орналасады, себебі эпидермистің мүйізді қабаты өте қалың болғандықтан эритематозды саты әлсіз болады, бірақ "саго дәні" жақсы түзіледі.



- **Микробты экзема**-созылмалы іріңді аурулардың орнында,трофикалық жаралардың айналасында дамиди.
- Микробты экземаның ошағы алғашында ассиметриялы және аяқта орналасады.



- **Себореялық экзема.** Бастың шашты бөлігінде, құлақ қалқанында, төс аймағында, жауырын аралықта, мұрын бет және мұрын ауыз қатпарларында дамиды.



Емі

- 1) Созылмалы инфекция ошағын санациялау.
- 2) Аллергияны шақырған тағамды анықтау, гипоаллергенді диета
- 3) Антигистаминді препараттар: лоратадин 0,001 г не фексофенадин 180мг күніне 1 рет.
- 4) Антигистаминді препарат+седативті: хифенадин 0,025г күніне 3рет. Клемастин 0,001г 2-3 рет күніне.

- 1) Гипосенсибилиздеуші препараттар: 30% натрий сульфат 5-10 мл к/т. 10% кальций глюконат 10 мл к/т.
- 2) Транквилизатор: нитразепам 0,005г ұйықтар алдында.
- 3) Иммуномодулятор: тактивин 0,01% 1 мл күніне 1 рет б/етке. Ликопид 10мг 1 рет күніне.
- 4) Эритродермияда: преднизолон таб. 20-30 мг/тәу. плазмаферез
- 5) Сыртқы ем: фукорцин, 25% күміс нитраты, 0,01-0,1% калий перманганатпен сүрту.