

# Эпидемиология



- Эпидемиология — наука о закономерностях возникновения, распространения и течения болезней, выявляемых при **популяционных исследованиях**.
- Эпидемиология – наука об **объективных закономерностях**, лежащих в основе возникновения, распространения и **прекращения** инфекционных болезней в человеческом **коллективе** и методах **профилактики и ликвидации** этих болезней.





# Наиболее распространенные виды обсервационных исследований

- Поиск причин, этиологических и прогностических факторов, выявление лучших диагностических методов, оценка эффективности лечения. Исследователь **наблюдает** за событиями, не вмешиваясь в процесс лечения.
  - Оглядываясь назад: **исследования «случай-контроль»** (ретроспективные)
  - Заглядывая вперед: **когортные исследования** (проспективные)
- Метод: сравнение групп пациентов (например, получавших и не получавших лечение) для установления возможной причинной зависимости с помощью методов **статистического анализа**

исследования.

# исследования «случай-контроль»



- Вначале выявляют **случаи заболевания** (отбор пациентов с изучаемым заболеванием)
- **Ретроспективно** выдвигают гипотезу о возможном факторе риска
- Отбирают **контрольную группу** людей, не имеющих данного заболевания, **сходную по остальным признакам** с изучаемой группой
- Определяют **наличие или отсутствие фактора риска** в этих двух группах.
- Связь заболевания с фактором риска определяется по **отношению шансов (>1)**



# Обсервационные исследования: когортные исследования

## Фактор риска

Лица, подвергавшиеся  
воздействию фактора



Лица, не подвергавшиеся  
воздействию фактора

- **Проспективно** прослеживают исход у лиц, подвергавшихся воздействию фактора риска
- Для оценки исходов часто требуются годы наблюдения
- Более дорогостоящее по сравнению с исследованиями «случай-контроль»
- Связь заболевания с фактором риска определяется по значению относительного риска ( $>1$ )

# Сравнение исследований «случай-контроль» и когортного исследования

## ■ «Случай-контроль»

- Ретроспективное
- Критерий:

### Отношение шансов

- Низкая стоимость
- Меньшая выборка
- Эффект причина



## ■ Когортное

- Проспективное
- Критерий:

### Относительный риск

## ■ Высокая стоимость

- Большая выборка
- Причина



эффект

# Экспериментальные исследования: рандомизированные клинические исследования (РКИ)

---

- Сравнение **исходов** (этиологии, причин, эффективности) в исследуемой и контрольной группах **после** вмешательства
- Наиболее мощный способ оценки эффективности
- «Золотой стандарт» проведения клинических исследований - контролируемые **рандомизированные** исследования с применением двойного слепого метода.

# Дизайн исследования зависит от множества факторов

---

- Контрольная группа
- Рандомизация
- Слепота (маскирование)
- Структура исследования
- Определение клинического фенотипа
- Границы

# Рандомизированные клинические исследования (РКИ): «слепота» исследования

## ■ ~~Неслепое (открытое)~~

- Испытуемые и исследователь знают, какое лечение проводится.

## ■ Простой слепой метод

- Исследователь знает, какое лечение проводится, а испытуемые не знают (в редких случаях бывает наоборот)

## ■ Двойной слепой метод

- Ни участники испытания, ни исследователи (те, кто оценивают исход) не знают, какое именно вмешательство проводится
- «Двойной болван» – используется при сравнении видов лечения, которые осуществляются по-разному (т.е. при разных путях введения).

# РКИ: исследование параллельных групп

## Рандомизация






# Модель 1

Достаточная  
причина  
I



Достаточная  
причина  
II



Достаточная  
причина  
III















































































































# Эпидемиология на современном этапе одновременно рассматривается как:

1. особый подход к изучению болезней с применением теории вероятности, статистики и специфических методов проведения научных экспериментов;
2. метод, с помощью которого можно установить причинно-следственные связи путем проверки гипотез о причинах возникновения болезней и способах их предупреждения;
3. инструмент для принятия управленческих решений в сфере общественного здравоохранения, основанный на научных данных и вскрытых причинно-следственных связях.
4. инструмент для оценки эффективности вмешательств (диагностических тестов, лечебных технологий, мероприятий по охране здоровья и т.п.).



Основоположником науки эпидемиологии считается Гиппократ

Со времен Гиппократа, то есть около 2400 лет назад, под словом «эпидемия» понимали массовые заболевания среди людей, которые могли включать болезни инфекционной и неинфекционной природы.

# Ещё в древности возникли две теории развития эпидемии

■ Первая теория, выдвинутая Гиппократом, предполагала, что причиной эпидемий является проникновение в организм людей неких веществ — миазмов, находящихся в космосе или в почве, в частности, в болотистых местах. Согласно этому представлению, вдыхание миазм большим количеством людей приводит к возникновению массовой заболеваемости.

■ Вторая теория предполагала, что причиной развития эпидемий является распространение среди людей живого болезнетворного агента. Эту точку зрения высказал величайший философ Греции Аристотель (IV в. до н. э.), в дальнейшем она нашла последователей в Древнем Риме. Марк Теренций Варрон (116–27 гг. до н. э.)

В эпоху Возрождения контагионистская гипотеза получила развитие в трудах итальянского врача Фракасторо



■ Он опубликовал книгу «*Siphilides Libris III*» (откуда и название болезни — сифилис), в которой сформулировал положение о заразности больного для других. Поскольку при венерических заболеваниях проследить контакты с больным не трудно, в книге были представлены неопровергимые доказательства в пользу контагионистской теории.


■ Последовательным сторонником этой гипотезы был основоположник отечественной эпидемиологии Д. С. Самойлович (1724—1810).

Следующим, причём решающим этапом в познании внутренней сущности эпидемии стали великие микробиологические открытия и достижения второй половины XIX в.:



- открытие микробов (А. Левенгук, 1632—1723).
- Исследования Л. Пастера (1822—1895), Р. Коха (1843—1910) и их многочисленных учеников определили не только торжество контагионистской теории, но и привели к разработке множества практических мер в борьбе с заразными заболеваниями (современная диагностика заболеваний, использование дезинфекции, разработка и введение в широкую практику специфической профилактики с помощью вакцин и сывороток и т. д.).

# В течение долгого времени основной задачей эпидемиологии было



- **изучение инфекционных заболеваний.** Во время эпидемий частота особо заразных инфекционных заболеваний резко возрастила. Было замечено, что люди, побывавшие в контакте с больными, обычно заражались, но выздоровев, редко заболевали повторно.
- эти эпидемиологические наблюдения легли в основу теорий контагиозности и невосприимчивости к инфекции - и стали эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний еще до открытия микроорганизмов и механизмов иммунной защиты.
- Хорошо известным классическим примером служит исследование холеры в Лондоне, проведенное **Джоном Сноу в 1854 г.** (Snow, 1855).

# В XX веке изучалась в эпидемиологии исследовалось влияние:

---

- химического состава пищи;
- нарушения питания. Еще до открытия витаминов были высказаны предположения о причинах таких болезней, велась их профилактика, предпринимались попытки излечения больных. Хорошим примером служат работы о распространенности пеллагры, проводившиеся Голдбергером в 1915-1926 гг. (Terns, 1964).
- В последние времена особое внимание привлечено к эпидемиологии онкологических заболеваний. (эпидемиологические исследования внесли значительный вклад в понимание роли курения в развитии рака легкого);
- Сердечно-сосудистых заболеваний.

■ Инфаркт миокарда стал одной из основных причин смерти в промышленно развитых странах. Роль различных компонентов образа жизни пока в этой патологии не совсем ясна. Не хватает фундаментальных знаний о патогенном значении таких факторов как стресс, сниженная физическая активность, курение, потребление высококалорийной и богатой жирами пищи и др.

- 
- раньше основное внимание уделялось острым инфекционным заболеваниям, то в последние годы оно все более смещается в сторону хронических болезней. Они имеют особое значение, т. к. являются причиной длительных страданий большого числа людей и ложатся тяжким бременем на систему здравоохранения. Иногда отправной точкой эпидемиологического исследования становится не заболевание, а определенная характеристика или фактор. В исследованиях *влияния профессиональных вредностей* начальной точкой нередко является характеристика производственного окружения или рабочего места; эффект такой экспозиции может учитываться с помощью оценки состояния здоровья или частоты заболевания в производственной сфере.

- 
- В последнее время принципы, лежащие в основе проведения и интерпретации эпидемиологических исследований, развились в систему для руководства планированием научной работы и осмыслиения ее результатов.

- 
- Эпидемиология на современном этапе одновременно рассматривается как:
  - особый подход к изучению болезней с применением теории вероятности, статистики и специфических методов проведения научных экспериментов;
  - метод, с помощью которого можно установить причинно-следственные связи путем проверки гипотез о причинах возникновения болезней и способах их предупреждения;
  - инструмент для принятия управленческих решений в сфере общественного здравоохранения, основанный на научных данных и вскрытых причинно-следственных связях.
  - инструмент для оценки эффективности вмешательств (диагностических тестов, лечебных технологий, мероприятий по охране здоровья и т.п.).

# Классификация клинических исследований



# Основные типы эпидемиологических исследований

---

- Обсервационное исследование (исследование без преднамеренного вмешательства со стороны исследователя)
  - Описательное.
  - Аналитическое (наиболее известными являются одномоментное, когортное и исследование типа "случай—контроль").
- Экспериментальное исследование — сравнительное исследование при преднамеренном вмешательстве в одну из исследуемых групп (рандомизированный клинический эксперимент).

# Обсервационное эпидемиологическое исследование

---


- Описание является первым этапом любого эпидемиологического исследования и дает ответ на вопросы "кто?", "где?" и "когда?" заболел. Выявляются временные тенденции заболеваемости, сезонность ("когда?"), распределение заболевших по месту жительства, рождения, работы, получения медицинских услуг ("где?"), полу, возрасту, национальности, семейному и социально-экономическому положению ("кто?") и т.п.
- Однако чтобы ответить на вопрос "почему?", одного описания уже недостаточно. Требуется проведение аналитического или экспериментального исследования, на котором и происходит подтверждение или исключение гипотез о наличии причинно-следственных связей.

# Эпидемиологическое исследование

---

- Информация об исследуемом факторе.
- Информация о заболеваемости.
- Статистическая обработка данных.

# Схема обследования



# Информация о факторе.

---

- Характеристика агента.
- Дозы воздействия.
- Продолжительность воздействия.

# Информация о заболеваемости.

---

- Для того чтобы приступить к изучению встречаемости конкретной болезни, необходимо решить, кто из членов интересующей нас группы страдает данным заболеванием.
- Такая диагностика осуществляется путем обследования каждого пациента, выявления у него субъективных и объективных признаков болезни, проведения лабораторных и инструментальных исследований и последующего сравнения результатов обследований с разработанными диагностическими критериями.

# БОЛЕЗНЬ и ДИАГНОЗ

## Симптомы болезней и результаты исследований

---

- **Субъективные симптомы** - это обусловленные заболеванием ощущения исследуемого, например, боль, тошнота, повышенная утомляемость.
- На выявление симптомов во время интервью влияет, однако, не формулировка вопросов, но также сам *интервьюер и обстановка при опросе.*
- ТОЛЬКО

# *Объективные симптомы*

---

- **Объективные симптомы** - это проявления заболевания, которые может наблюдать обследующее лицо (обычно врач), например, сыпь или отек.
- На подтверждение признаков влияет субъективное суждение одного исследователя (или нескольких исследователей). Такая субъективность присуща результатам, получаемых при аусcultации (выслушивании) сердца и легких или при пальпации (прощупывании) органов брюшной полости. Она отмечается также в рентгенографических исследованиях, включающих интерпретацию рентгеновского снимка, и в морфологическом исследовании тканей. Точность таких обследований зависит от степени согласованности действий различных исследователей (межличностная изменчивость) и от согласованности различных исследований, проводящихся одним лицом (внутриличностная изменчивость).

# *Лабораторные и инструментальные исследования*

---

- Проявления, которые фиксируются прибором и, значит, меньше зависят от субъективных суждений обследуемого или обследующего.
- Например, биохимические анализы крови часто выполняются автоматическими анализаторами, без участия человека. Воспроизводимость результата можно определить, например, если сделать в одной лаборатории повторные анализы одной и той же порции крови (внутрилабораторная изменчивость) или ту же кровь исследовать в разных лабораториях (межлабораторная изменчивость).

# Диагностические критерии

- Для формулировки диагностических критериев, т.е., условий, которые должны выполняться для постановки диагноза, используются проявления (субъективные и объективные симптомы и результаты исследований), считающиеся характерными для данного заболевания.
- Выбор диагностических критериев определяет, следовательно, должно ли обследуемое лицо классифицироваться как имеющее определенное заболевание.
- Чем строже критерии заболевания, тем меньше вероятность того, что не имеющие данного заболевания люди будут причислены к больным, но относительно выше вероятность того, что у некоторых страдающих этим заболеванием лиц диагноз тем не менее не будет установлен.
- С другой стороны, при использовании менее строгих критериев возникает тенденция к ошибке противоположного типа: у большинства страдающих данным заболеванием диагноз будет установлен правильно, но существует относительно большая вероятность того, что к больным будут причислены и люди, не имеющие его.

# Диагностические критерии инфаркта миокарда (Henning, Lundman, 1975).

---

- При инфаркте миокарда должно быть соответствие двум из трех критериев а, б и с, или должен быть выполнен критерий а:
  - а) Боль в загрудинной области, отек легких, коллапс или шок.
  - б) Изменения ЭКГ.
  - в) Изменения показателей крови (повышение активности АСТ, повышение активности АЛТ).
  - д) Выявление признаков свежего или ранее перенесенного инфаркта миокарда на вскрытии.
- Первый критерий (а) основан на жалобах больного и симптоматике, обнаруживаемой врачом при объективном осмотре. Второй и третий критерии (б) и (в) опираются соответственно на данные ЭКГ и биохимического исследования крови. Четвертый критерий (д) - морфологический.

# Диагностические критерии

---

- Аналогичные критерии сформулированы и для некоторых других заболеваний. Однако, для большинства болезней четко сформулированные и общепризнанные диагностические критерии отсутствуют.







- 
- Точно так же в исследованиях *побочного действия лекарственных репаратов* исходной точкой является определенный фактор (экспозиция к лекарству), а не болезнь. Круг стоящих перед эпидемиологией задач предполагает ее тесное взаимодействие с *профилактической медициной*. Так как профилактические программы редко охватывают все население, их результаты могут использоваться для изучения влияния данного мероприятия на частоту заболевания в отдельной его группе, путем сравнения заболеваемости среди охваченных профилактической программой с заболеваемостью всего населения. Таким образом появляется возможность оценить эффективность различных программ профилактики при помощи *экспериментальной эпидемиологии*. В последние годы очевидной стала важность информации