

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ №1

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА

Докладчик: *Червань Ирина*
5 курс, 2-й мед.фак-т,
15 группа

Дебатный клуб:
«Лихоманка Эбола – виклик
людству»

19.01.2015г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ

ЛИКОРРАДИКА ОБОЛГА

18 464 – ЧИСЛО

ЗАРАЗИВШИХСЯ

ЛЮДЕЙ

6 841 -

КОЛИЧЕСТВО

СМЕРТЕЛЬНЫХ

ИСХОДОВ

Геморрагическая лихорадка Эбола — острая вирусная высококонтагиозная болезнь, характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью и развитием геморрагического синдрома.



**Вирус Эбола:
месть природы или
биологическое оружие ?**

**Заир. Первый заболевший - Мабало
Локелу (директор сельской школы)
Всего заболело 318 человек,
280 (88%)- умерло**



1976 год

**Судан. Заболело 284 человека,
умерло- 151 (53%)**

**Март
2014 год**

**Западная Африка- текущая
вспышка лихорадки Эбола- самая
крупная и сложная из всех ранее
регистрируемых вспышек.**



Резервуар и источник инфекции:

- разнообразные грызуны
- шимпанзе
- гориллы
- летучие мыши
- обезьяны
- макаки-крабоеды
- лесные антилопы
- дикообразы

- ✓ Контакт с выделениями, биологическими жидкостями, кровью или органами инфицированного человека.
- ✓ Контакт с любыми средами (белье, вода, пища, иглы, медицинские инструменты и т.д.), загрязненными выделениями, кровью, биологическими жидкостями или частичками органов (например, кусочками кожи) инфицированного вирусом Эбола человека;
- ✓ Прямой контакт с телом умершего от лихорадки Эбола (например, поцелуи, обмывание и другие похоронные ритуалы);
- ✓ Половой акт с больным лихорадкой Эбола без презерватива. Со спермой вирус может передаваться от одного человека к другому в течение семи недель после выздоровления от лихорадки;
- ✓ Вдыхание частиц мокроты, выделяемых инфицированным человеком.



Случаи заражения при лабораторной контаминации:

1) 1976 год, Великобритания
(пациент выжил)


2) 1994 год- Кот-д'Ивуар
(пациент выжил)

3) 1996 год- Россия- умерла лаборантка вирусологического центра, которая заразилась вирусом Эбола, уколов себе палец, когда делала инъекции кроликам

4) 19 мая 2004 год- Россия- умерла Антонина Преснякова, 46-летняя старшая лаборантка отдела особо опасных вирусных инфекций научного центра вирусологии



Очаги циркуляции вируса Эбола располагаются в зоне влажных тропических лесов Центральной и Западной Африки (Заир, Судан, Нигерия, Либерия, Габон, Сенегал, Кения, Камерун, Эфиопия, Центрально-Африканская республика).



Существует предположение, что причины распространения болезни могут быть связаны с сокращением площади лесов (основного местообитания летучих мышей)

Крайне важным является соблюдение мер борьбы со вспышками заболевания: правильное ведение больных, эпиднадзор и отслеживание контактов, качественная лабораторная служба, безопасные погребения и социальная мобилизацию, исключение контактов с летучими мышами, обезьянами или приматами и потребления их сырого мяса, повышение информированности о факторах риска заражения вирусом Эбола и мерах индивидуальной защиты.





Спасибо за внимание