

Департамент здравоохранения г.Москвы  
Государственное образовательное бюджетное учреждение  
Среднего профессионального образования  
Медицинский колледж №4

# *Фоновые и предраковые заболевания*

2014 год

Злокачественным заболеваниям как правило способствуют патологические процессы, на фоне которых они возникают.

Выделяют:

□ Фоновые

□ Предраковые заболевания (наружных половых органов, влагалища, шейки матки, эндометрия, яичников).

# ***Предраковые заболевания наружных половых органов и вагалища***

Клиника:

Длительное бессимптомное течение, возможно появление ночного зуда.

Диагноз ставится на основании клинических проявлений, кольпоскопии, пробы Шиллера, биопсии, гистологии.

Лечение: комплексное.

**1. Лейкоплакия** – дистрофическое заболевание, в результате которого возникает изменение слизистой оболочки, сопровождающееся ороговением слизистой. Характеризуется появлением в области наружных половых органов сухих белых бляшек различной величины, представляющие собой участки повышенного ороговения с последующим склерозом и сморщиванием тканей. Помимо наружных половых органов, лейкоплакия может локализоваться во влагалище и на влагалищной части шейки матки.

Клиника:

Длительное бессимптомное течение, возможно появление ночного зуда.

Диагноз ставится на основании клинических проявлений, кольпоскопии, пробы Шиллера, биопсии, гистологии.

Лечение: комплексное.



**2. Крауроз** – атрофия малых и больших половых губ, клитора; патологическое сморщивание кожи слизистой оболочки наружных половых органов.

Стадии:

- Стадия клинических проявлений
- Стадия прогрессирования
- Стадия склерозирования

Возникают затруднения при половом акте, мочеиспускании, дефекации.

Диагноз ставится на основании клинических проявлений, кольпоскопии, пробы Шиллера, биопсии, гистологии.

Лечение: комплексное.

*Фооновые и  
предраковые  
заболевания шейки  
матки.*

# Фоновые заболевания

## **Фоновые процессы –**

патологические состояния, врождённые или приобретённые, на фоне которых возникает предрак или рак шейки матки. Возникновению способствуют травмы, во время родов, аборты, воспаления.

**3. Лейкоплакия** – пограничное состояние зрелого метапластического эпителия с ороговением.

**1. Эктопия (псевдоэрозия)** – смещение границы цилиндрического эпителия канала шейки матки и плоского эпителия на влагалищную поверхность шейки матки. Сопровождается воспалительными процессами.

**2. Эктропион шейки матки** – участок эктопии, покрытый цилиндрическим эпителием,. При осмотре: яркая гиперемия, зернистая или бархатистая поверхность, легко травмирующаяся при касании.

## Полип шейки матки



**4. Полип шейки матки** – возникает из-за чрезмерного роста слизистой оболочки шеечного канала.

При осмотре: слизистая бледно-розовая, может быть багровая, полип свисает на ножке во влагалище.

Лечение: оперативное.

**5. Эритроплакия шейки матки** – участок истончённого плоского эпителия с его дискератозом.



# Предраковые заболевания шейки матки

Диагноз ставится на основании клинических проявлений, данных осмотра, биопсии, кольпоскопии.

Лечение:  
Консервативное,  
оперативное  
(ампутация шейки  
матки, удаление  
матки).

Предраковые заболевания шейки матки или дисплазия – заболевания, для которых характерна атипия клеток слизистой шейки матки и цервикального канала. Различают три степени тяжести заболевания. При последней степени тяжести дисплазия часто переходит в рак.



# Диагностика фоновых и предраковых заболеваний шейки матки

## Цервикальная биопсия

Небольшие образцы тканей берут из шейки матки для исследований



Шейка матки рассматривается через гинекологическое зеркало в положении пациента лежа

# *Предраковые заболевания эндометрия*

Возникновению способствуют такие заболевания, связанные с нарушением обменных процессов, как: артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет.

Диагноз ставится на основании жалоб, объективного исследования, цитологического исследования, гистероскопии.

Лечение:

Консервативное (гормоны),  
оперативное.

Профилактика: своевременное лечение заболеваний, диспансерное наблюдение.

К предраковым заболеваниям эндометрия относятся:  
Атипичическая гиперплазия, аденоматозные полипы, полипы эндометрия.  
Заболевания возникают из-за нарушений гормонального фона.  
Сопровождаются маточными кровотечениями после задержки менструации, реже возникают циклические.

# *Предраковые заболевания яичников*

Выделяют:

- Доброкачественные - кисты (фолликулярные, жёлтого тела). Возникают при неправильной имплантации эндометрия.
- Пограничные – кистомы (способны переродиться в рак).

Жалобы на: тупая ноющая боль (в животе, пояснице).

Осложнения:

- Перекрут ножки
- Разрыв капсулы
- Кровоизлияние в полость

Лечение: оперативное (удаление).

*Спасибо за внимание!*