



**СРС**  
**НА ТЕМУ:**  
**ГАШИШНАЯ НАРКОМАНИЯ**

Выполнил : Мамырбеков Ернар  
Мамырбекұлы

Проверил:

Факультет: Общая Медицина

Группа: 558-01 р

2016 год

# ГАШИШНАЯ НАРКОМАНИЯ

- Гашиш ([перс.](#) حشيش, «хашéша» — «сено, сухая трава»), общее название целого ряда [психотропных хашéша](#) — «сено, сухая трава»), общее название целого ряда психотропных продуктов из [конопли хашéша](#) — «сено, сухая трава»), общее название целого ряда психотропных продуктов из конопли, представляющих собой смолу [каннабиса](#), изготавливающуюся путём прессования порошка, получаемого в результате высушивания и измельчения или просеивания высушенных листьев и липких маслянистых слоёв с цветущих верхушек растения<sup>[1]</sup>. Это вещество собирают и прессуют в брикеты, которые могут быть пластичными или твёрдыми, сухими или порошкообразными. Основным активным ингредиентом является [дельта-9-тетрагидроканнабинол](#).



- Гашиш не следует путать с [марихуаной](#) Гашиш не следует путать с марихуаной, представляющей собой препарат, получаемый из прессованной травы [каннабиса](#) и имеющий форму кубиков, состоящих из измельчённой в порошок растительной массы, включающей различные части растения: соцветия, листья, стебли и семена<sup>[1]</sup>. Как правило, гашиш отличается от высушенной марихуаны гораздо более сильным психоактивным действием, получаемым за счёт большей концентрации в нём психоактивных веществ, так как в цветущих верхушках растения концентрация [тетрагидроканнабинола](#) выше, чем в листьях, тогда как стебли содержат до 3 %, а семена этого вещества вообще не содержат.
- Цвет гашиша варьируется от светло-серого, коричневатого до чёрного. Считается, что чем темнее гашиш, тем восточнее его происхождение. Гашиш имеет различные названия в зависимости от страны происхождения. В странах Азии гашиш называют «ганджа» и «чаррас»<sup>[2]</sup>.
- Крупнейшей страной-экспортёром гашиша является [Афганистан](#) Крупнейшей страной-экспортёром гашиша является Афганистан за счёт высоких урожаев — 145 кг с гектара против 40 кг с гектара в Марокко. Доходы с гектара для каннабиса составляет 3900 [долларов США](#) Крупнейшей страной-экспортёром гашиша является Афганистан за счёт высоких урожаев — 145 кг с гектара против 40 кг с гектара в Марокко. Доходы с гектара для каннабиса составляет 3900 долларов США, что выше, чем для [опийного мака](#) — 3600 долл.<sup>[3]</sup>



# КАННАБИС

Наркотическое действие оказывают психоактивные вещества – каннабиноиды (конопля содержит около 60 каннабиноидов). Наиболее активный - транс-О-9-тетрагидроканнабиол (ТГК)

Виды препаратов каннабиса:

- Марихуана (порт. *marijuana*) - наркотик, приготовленный из стеблей и листьев конопли (содержание ТГК от 0,5% до 4%)
- Гашиш - смолистое вещество, собранное из цветущих верхушек травы каннабиса (содержание ТГК от 2% до 20%)
- Гашишное масло - это концентрированные каннабиноиды, получаемые с помощью экстракции из необработанного материала или смолы (концентрация ТГК - от 15 до 50%)

# ИСТОРИЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

- 1810 г. - появление первых статей о каннабисе (Rouger)
- 1838-1860 - работы W.B.O.Shanghnessy, J.Moren de Tours, A.Brigham , J.P.Hay о терапевтических свойствах конопли
- начало 60-х годов – эпидемия злоупотребление марихуаной в США, в европейских странах
  
- По частоте употребления после алкоголя находится на 2 месте
- В 80-е годы в СССР гашишная наркомания составляла 20-30% от общего числа наркоманов (Э.А.Бабаян, 1988)
- По данным социологических исследований, производные конопли составляют 62,5% всех наркотиков
- Приобщение к наркотикам в 62% начинается с препаратов конопли (Л.Д.Мирошниченко, В.И.Туманов, 1994)

# ДЕЙСТВИЕ КАННАБИСА

- Подавляет синтез, освобождение и разрушение ацетилхолина
- Существуют специфические каннабиноидные рецепторы (в базальных ядрах, гиппокампе и коре) (играют роль в процессах познания, запоминания, воспроизведения, восприятия и моторной координации)
- При курении ТГК всасываются быстрее, чем при приеме *per os*
- Фармакологическое действие наступает немедленно, пик через 30 минут
- Дозировка определяется качеством наркотика, числом затяжек, имеет значение место произрастания конопли

# СМЕНЫ СИМПТОМОВ ПРИ ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (VOUQUET, 1950)

Фаза	Симптом	Основные проявления
1	Моторное возбуждение	острое желание двигаться, ходить и т. д., однако старается воздержаться от исполнения желания
2	Ослабление контроля за поведением	ум заполняют идеи, чуждые субъекту; незначительный эпизод вызывает неадекватный, неудержимый смех
3	Состояние дурмана (одурманенности)	опьяневший часто открывает свои сокровенные мысли, которые отражаются как в бессознательных движениях, так и в высказываниях, поступках, иллюзиях и галлюцинациях



# СМЕНЫ СИМПТОМОВ ПРИ ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (VOUQUET, 1950)

Фаза	Симптом	Основные проявления
4	Диссоциация идей	появление потребности в разговоре; высказывания неадекватные. Опьяневший говорит взволнованно, с жаром
5	Гипертрофия своего “Я”	опьяневший считает себя высшим существом, смотрит на других с презрением, считает их ниже себя
6	Бредовое возбуждение	утрата правильного представления об окружающих людях или предметах

# СМЕНЫ СИМПТОМОВ ПРИ ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (VOUQUET, 1950)

Фаза	Симптом	Основные проявления
7	Ужас перед шумом	путаница мыслей все возрастает; моменты просветления все короче, постепенно оказывается во власти своих субъективных переживаний; человек впадает в состояние апатии
8	Нарушение представления о времени	время течет бесконечно медленно, представляется нескончаемо долгим
9	Нарушение представления о пространстве	расстояние между опьяневшим и объектом, стоящим совсем рядом с ним, представляется огромным

# СМЕНЫ СИМПТОМОВ ПРИ ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (VOUQUET, 1950)

Фаза	Симптом	Основные проявления
10	Искажение восприятий	восприятия искажены, форма и цвет предметов кажутся измененными
11	Раздвоение личности	особое состояние, когда ощущают свое собственное действительное “Я” и фантастическое, которое возбуждает бесчисленные идеи
12	Появление повышенной внушаемости	любое впечатление, действующее на органы чувств, немедленно вызывает мнимые восприятия
13	Возникновение галлюцинаций	происходит у некоторых субъектов; кажется, что их преследуют дикие звери или что им грозят убийством

# СМЕНЫ СИМПТОМОВ ПРИ ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (VOUQUET, 1950)

Фаза	Симптом	Основные проявления
14	Повышенная чувствительность к звукам	самый слабый звук приобретают особо громкое звучание
15	Обострение эмоциональных переживаний	давно забытые сцены предстают перед глазами в мельчайших подробностях
16	Состояние онейрического экстаза	туман, окутывающий все предметы (существующие или воображаемые), густеет; собое воздействие на половую систему: наступает эротическое возбуждение без всяких физических изменений

# ФАЗНОСТЬ ПРИ ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (И. Н. ПЯТНИЦКАЯ, 1994)

Фаза	Основные проявления
Первая фаза	Не обязательна. Через 2-5 мин появляется чувство страха, тревожной подозрительности. Обостряется восприятие внешних раздражителей. Длится 5–10 мин.

# ФАЗНОСТЬ ПРИ ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (И. Н. ПЯТНИЦКАЯ, 1994)

Фаза	Основные проявления
Вторая фаза	Появляется расслабление, легкость, благодушие. Присоединяются расстройства восприятия (пространства, цветов, интенсивности и характера звуков, времени, схемы тела), мышления и сознания. (легкость решений, беспечность и безответственность; темп ускорен; с углублением интоксикации происходит сужение, оглушение, сумерки)

# ФАЗНОСТЬ ПРИ ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (И. Н. ПЯТНИЦКАЯ, 1994)

Фаза	Основные проявления
Третья фаза	<p>Характеризуется парадоксальностью восприятия, эмоциональной спутанностью, хаотичностью переживаемых чувств. Мышление бессвязанное, вплоть до отрывочного бреда. Сознание оглушено. Эмоциональная спутанность проявляется в форме индуцированной мимической имитации аффектов, которые субъективно не ощущаемы. АД повышено, тахикардия. Двигательное оживление сменяется вялостью, речевая продукция бессвязна</p>

# ФАЗНОСТЬ ПРИ ГАШИШНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ (И. Н. ПЯТНИЦКАЯ, 1994)

Фаза	Основные проявления
Четвертая фаза	<p>Спад возбуждения. Бледность, вялость, слабость, гипотензия, гипорефлексия. Аппетит повышен. Сознание ясное, хотя отмечается медлительность, заторможенность, апатия. Вскоре наступает сон продолжительностью до 10–12 ч, беспокойный, поверхностный, со вздрагиваниями, бормотанием. После пробуждения снова много ест и пьет.</p>



# РАЗВИТИЕ ЗАВИСИМОСТИ (ЭТАП ЭПИЗОДИЧЕСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ)

- В течение первого года не развивается привыкания к наркотику; употребления наркотика эпизодическое.
- Толерантность возрастает от 1 до 3-5 сигарет за вечер.
- До появления первых признаков влечения проходит 1-1,5 года.

# РАЗВИТИЕ ЗАВИСИМОСТИ (1 СТАДИЯ)

- Наркотическое опьянение протекает без первой фазы.
- Снижаются вегетативные проявления.
- Курение становится систематическим, поиск наркотика активный.
- Психическая зависимость представлена obsессивным влечением к наркотику.

# РАЗВИТИЕ ЗАВИСИМОСТИ

## (2 СТАДИЯ)

- Появляется синдром физической зависимости.
- Первая и четвертая фазы опьянения исчезают.
- В интоксикации испытывается очень краткое первоначальное расслабление; в дальнейшем работоспособность, активность.
- Опьянение длится теперь 1-1,5 ч, затем снижение тонуса, энергии.
- Толерантность к наркотику возрастает, спиртное не употребляется; интоксикация становится единственным состоянием физического комфорта
- Компulsive влечение выражено, однако не сопровождается вегетативными реакциями и психической напряженностью.
- Абстинентный синдром при гашишизме развивается спустя 2-3 года систематического курения.
- Могут возникать различные психотические состояния.

# РАЗВИТИЕ ЗАВИСИМОСТИ

## (3 СТАДИЯ)

- Падает толерантность, наркотик оказывает лишь тонизирующий эффект, форма потребления систематическая.
- Абстинентный синдром носит затяжной характер.
- Последствием гашишизма являются прогрессирующее снижение энергетических ресурсов, физическое и психическое истощение, нарастание вялости, отупения, потеря социальных связей, появление затяжных психозов.

# ПРИЗНАКИ И ФАЗНОСТЬ АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА ПРИ ГАШИШИЗМЕ (И. Н. ПЯТНИЦКАЯ, 1994)

Фазы	Основные проявления
Первая фаза	Зрачки расширены, зевота, озноб, вялость, мышечная слабость, беспокойство, дисфория. исчезновение сна и аппетита. Развивается через 4-5 ч. после курения.
Вторая фаза	Общее вегетативное возбуждение нарастает. Мышцы напряжены, появляется мелкий тремор, гиперрефлексия, возможны подергивания отдельных мышечных пучков. Повышается АД, учащается пульс, дыхание. Появляется к концу первых суток отнятия
Третья фаза	<del>наркотика</del> Сенестопатические жалобы, ощущение тяжести и сдавление в груди, затрудненное дыхание, сдавление головы, на коже парестезии. Влечение достигает своей интенсивности. Больные плаксивы.

# ПОСЛЕДСТВИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ

## **психические нарушения:**

- "амотивационный синдром" (пассивность, вялость, замкнутость)
- внимание неустойчиво, память снижена
- шизоформные галлюцинаторно-параноидные психозы

## **соматические нарушения:**

- повышенный риск развития хронических бронхитов, рака дыхательных путей, других заболеваний лёгких
- высокий риск рождения ребенка с низким весом (если каннабис употребляется матерью во время беременности)