

Карагандинский Государственный
Медицинский Университет
Кафедра инфекционных болезней

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Клинические периоды

Доцент А.А.Ким
«Сестринское дело»
3 курс

Караганда 2011

Клинический случай

- Больной Н., 32 лет, обратился за медицинской помощью на 4-й день болезни с жалобами на повышение T до 39°C , озноб, сильную головную боль, боли в глазах, мышцах спины и поясничной области.



Три недели назад вернулся из
командировки по Западно-

й б н п

При осмотре: состояние средней тяжести. Лицо одутловато, шея, верхние отделы груди гиперемированы, на боковых поверхностях туловища петехиальная сыпь.



Склеры инъецированы, в
ротоглотке гиперемия,
обложенность языка.



**Какие синдромы можно
выделить?**

-
- **Токсический**
 - **Катаральный**
 - **Геморрагический**



**Для каких заболеваний
характерны данные
синдромы?**

- Геморрагическая
лихорадка с почечным
синдромом

- Грипп
- Лептоспироз
- Менингококковая
инфекция
- Сепсис
- Заболевания почек



**О каком заболевании
можно думать?**

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

**Какие
эпидемиологические
данные являются
настораживающими в
отношении ГЛПС?**

-
- Вернулся из командировки по ЗКО 3 недели назад
 - Проживал в общежитии барачного типа
 - В помещении обитали грызуны (установлено из дополнительного анамнеза)



■ Какие клинические периоды выделяют в течении болезни?

Клинические периоды ГЛПС

- **Инкубационный** – 7- 48 дней (в среднем 21 день)
- **Лихорадочный**
(начальный) - 5-6 дней

Лихорадочный период

- Лихорадка 38-40° С
- Озноб
- Головная боль
- Сухость во рту
- Жажда
- Мышечные боли

Лихорадочный период

- **Одутловатость лица**
- **Пастозность век**
- **Гиперемия шеи,
конъюнктив**
- **Инъекция склер**

Лихорадочный период

- Со 2-3 дня геморрагическая энантема на мягком небе
- С 3-4 дня – петехиальная сыпь
- Гепатомегалия

Олигурический период

- **Сильные боли в поясничной области**
- **Тошнота, рвота, икота**
- **Кровоточивость слизистых оболочек**

Олигурический период

- **Кровоизлияния в местах инъекций**
- **Петехиальная сыпь**
- **Возможны носовые, маточные, кишечные кровотечения**







**Какова частая причина
летальных исходов
ГЛПС?**



Уремическая эклампсия

**■ Какие лабораторные
признаки ГЛПС в данном
периоде?**

-
- **Массивная протеинурия**
 - **Прогрессирующая азотемия**
 - **Гиперкалиемия**
 - **Снижение гематокрита**
 - **Снижение относительной плотности плазмы крови**

Полиурический период

- Исчезают боли в пояснице, животе
- Полиурия до 5-8 литров
- Сухость во рту
- Сильная жажда
- Геморрагические проявления регрессируют

Период реконвалесценции

- Наступает восстановление функций организма
- Длительное время сохраняется постинфекционная астенизация