



**Дифузний токсичний  
зоб. Клініка  
Діагностика,  
принципи лікування.**

# Дифузний токсичний зоб (ДТЗ)

## Визначення:

Органоспецифічне аутоімунне захворювання, яке характеризується стійким патологічним підвищеннем продукції тиреоїдних гормонів, як правило, дифузно збільшеною щитоподібною залозою з наступним порушенням функціонального стану різних органів і систем.

# Thyroid Anatomy



# *Пальпація щитоподібної залози*

- Пальпація, коли лікар знаходиться позаду стоячого або сидячого пацієнта; обидві руки знаходяться перед проекцією щитоподібної залози;
- Пальпація, коли лікар знаходиться перед стоячим пацієнтом; великі пальці рук розміщаються горизонтально на верхньому краї щитоподібної залози;
- Хворого просять проковтнути слину;
- Пальці лікаря ковзають на поверхні щитоподібної залози;

*Проводиться оцінка щитоподібної залози:*

- рухомість
- консистенція
- наявність або відсутність вогнищ ущільнення, вузлів
- ступінь збільшення вузлів

## *Класифікація збільшення щитоподібної залози (ВООЗ, 2001)*

<b>Ступінь збільшення – 0</b>	Зоба немає (розміри часток не перевищують розмірів дистальної фаланги великого пальця обстежуваної особи)
<b>Ступінь збільшення - I</b>	Зоб пальпується, проте невидимий при нормальному положенні шиї (видимого збільшення ЩЗ немає). Сюди відносять вузлові утворення, які не спричиняють збільшення самої залози
<b>Ступінь збільшення - II</b>	Зоб чітко видимий при нормальному положенні шиї

# **Причини тиреотоксикозу**

**Тиреотоксикоз, зумовлений підвищеною продукцією гормонів ЩЗ:**

**1. Дифузний токсичний зоб (хвороба Грейвса – Базедова);**

**2. Функціональна автономія ЩЗ:**

- > уніфокальна функціональна автономія (в тому числі тиреотоксична аденома);
- > мультифокальна функціональна автономія (в тому числі багатовузловий токсичний зоб);
- > дисемінована функціональна автономія.

**3. Йодіндукований тиреотоксикоз.**

**4. Автоімунний тиреоїдит в тиреотоксичної фазі.**

**5. ТТГ-індукований тиреотоксикоз:**

- > ТТГ-продукуюча аденома гіпофіза;
- > синдром неадекватної секреції ТТГ (резистентність тиреотропоцитів до тиреоїдних гормонів).

**6. Трофобластичний тиреотоксикоз.**

**7. Гестаційний транзиторний тиреотоксикоз.**

# *Клініка тиреотоксикозу і патогенез окремих симптомів*


## *Синдром змін з боку очей*

### *Скарги:*

відчуття вип'ячування очей; слізотеча; світлобоязнь

### *Дані об'єктивного обстеження:*

- погляд пристальний, наляканий або здивований; наявні очні симптоми: Краусо, Грефе, Кохера, Дальрімпля;
- ендокринна офтальмопатія



# *Клініка тиреотоксикозу і патогенез окремих симптомів*

## *Ектодермальні порушення*

### *Скарги:*

- ламкість нігтів, випадіння волосся;
- зміна кольору (коричнево-оранжева), ущільнена шкіра передньої поверхні гомілок

### *Дані об'єктивного обстеження:*

- шкіра тепла, волога, м'яка, оксамитова;
- оніхомікоз;
- претібіальна мікседема

# претібіальна мікседема





Оніхолізис



Вітіліго



Акропатія



Дерматопатія

# Дифузний токсичний зоб (ДТЗ)

## *епідеміологія*

- розповсюдженість тиреотоксикозу складає 0,5 %
- на долю ДТЗ приходиться 80 % випадків тиреотоксикозу
- ДТЗ частіше розвивається у віці 20-50 р.
- жінки хворіють у 5-7 р. частіше, ніж чоловіки

## *етіологічні та сприяючі фактори*

автоімунне захворювання, яке розвивається в осіб із:

- спадковою схильністю (носійство генів головного комплексу гістосумісності (HLA-B8 або HLA-DR3);
- стресорними впливами;
- інфекційними захворюваннями;
- інсоляціями;
- гормональними спалахами тощо

# **Клініка тиреотоксикозу і патогенез окремих симптомів**

## **Ендокринні порушення**

### **щитоподібна залоза**

**Скарги:** відчуття тиску в ділянці шиї, утруднення ковтання

**Дані об'єктивного обстеження:**

- Щитоподібна залоза збільшена (розміри і консистенція залежать від причини тиреотоксикозу); при ДТЗ: щільноеластичної консистенції, не болюча при пальпації); аускультивно над щитоподібною залозою – систолічний шум

### **статеві залози**

**Скарги:** порушення менструального циклу у жінок; зниження потенції у чоловіків

**Дані об'єктивного обстеження:** фіброзно-кістозна мастопатія, гінекомастія

**Дані додаткових методів обстеження:** порушення сперматогенезу; збільшення тестостерону; збільшення естрадіону; ЛГ і ФСГ в нормі або збільшенні

### **наднирникові залози: тиреогенна (відносна) наднирникова недостатність**

**Скарги:** загальна слабкість, потемніння шкіри відкритих ділянок тіла

**Дані об'єктивного обстеження:** синдром Елінека; артеріальна діастолічна гіпотензія

### **порушення толерантності до вуглеводів**

**Дані додаткових методів обстеження:** порушення ТТГ





# *Діагностика ДТЗ*

## **анамнез**

наявність сприяючого фактору

## **клініка**

ознаки тиреотоксикозу та дифузне збільшення щитоподібної залози

## **Лабораторні дані**

- 1) загальні та вільні  $T_3$  і  $T_4$  підвищені;
- 2) підвищений загальний  $T_3$  і нормальній  $T_4$  ( $T_3$  – тиреотоксикоз)
- 3) рівень ТТГ знижений
- 4) підвищене поглинання радіоактивного  $I^{131}$  щитоподібною залозою
- 5) тиреостимулюючі аутоантитіла (методом ІФА)

## **Інструментальні дані**

- 1) УЗД щитоподібної залози (дифузне зниження ехогенності збільшеної в розмірах щитоподібної залози);
- 2) сцинтіграфія щитоподібної залози (при підозрі на наявність загрудинного зоба і при наявності вузлових утворів)

# **Медикаментозне лікування**

## **Антиреоїдні препарати (пропілтіоурацил, мерказоліл (тіамазол, тирозол)**

### **Механізм дії:**

- пригнічують синтез тиреоїдних гормонів, інгібуючи йодидпероксидазу;

 **пропілтіоурацил** гальмує периферичне перетворення  $T_4$  в  $T_3$

### **Бета-адреноблокатори:**

- > селективні (метопролол, атенолол);
- > неселективні (пропранолол, анаприлін)



### **Механізм дії:**

- блокада  $\beta$ -адренорецепторів, ліквідація тахікардії, пітливості, тремору, відчуття тривоги, інших симптомів тиреотоксикозу
- зниження рівня  $T_3$ , гальмуючи периферичне перетворення  $T_4$  в  $T_3$  (характерно лише для неселективних препаратів)

### **Доза та режим:**

- 20-40 мг перорально (анаприлін - 80-120, атенолол 50-100);
- кожні 4-8 год;
- дозу підбирають до зниження ЧСС до 70 - 90 на хв., після зникнення симптомів тиреотоксикозу дозу зменшують, а при еутиреозі відміняють

### **Відносні протипокази:** обструктивні захворювання легень



Дякую за увагу