

ГНОЙНЫЙ ПЕРИТОНИТ

Этиология, патогенез,
классификация, хирургическое
лечение



Классификация перитонита

- 1. По этиологии
- 2. По виду возбудителя
- 3. По распространенности процесса
- 4. По причинам возникновения
- 5. По стадийности течения



Стадии течения
перитонита

Реактивная фаза
(24-48 час)

Токсическая
фаза
(24-72 час)

Фаза
разрешения
(более 72 час)

Диагностика гнойного перитонита

- 1. Анамнез и клиническая картина
- 2. Объективное исследование
- 3. Рентгенологические методы
- 4. Лапароскопия



Дифференциальный диагноз

- Острая непроходимость кишечника
- Острый панкреатит
- Кровоизлияния в брюшную полость
- Печеночная, почечная колика
- Тромбоз сосудов брыжейки
- Пищевая интоксикация
- Центральная пневмония
- Множественные переломы ребер и др.



Симптомы при остром разлитом перитоните

- **Постоянные симптомы**

1. Боль в животе
2. Симптомы раздражения брюшины
3. Мышечное напряжение
4. Тахикардия
5. Тошнота, рвота
6. Вздутие живота
7. Задержка газов и кала
8. Нарушения гемодинамики
9. Изменение картины крови
10. Изменения мочи

- **Непостоянные СИМПТОМЫ**

1. Озноб
2. Экссудат в брюшной полости
3. Икота
4. Понос (в 3% случаев) при пневмококковых, пуэрпериальных и септических перитонитах
5. Газ в брюшной полости
6. Дизурические явления



Хирургическое лечение гнойного перитонита

1. Устранение источника инфекции
2. Полноценная санация
3. Дренирование брюшной полости (с учетом распространения и фазы перитонита)
4. Дренирование ЖКТ(назогастральный зонд)



Лечение в послеоперационном периоде

1. Дезинтоксикация
2. Коррекция нарушений гомеостаза
3. Антибактериальная терапия
4. Стимуляция и иммунокоррекция

