



Патогенные кокки Гр(-)


Род *Neisseria*

СПбГУ
2015г.



ГОНОКОККИ

Морфология *N. gonorrhoeae*



Длина:
1,25-1,6мкм
Ширина:
0,7-0,9мкм


ПЭМ, Ультратоний срез.

- А) бинарное деление гонококка;
- Б) гонококки на поверхности эпителиальной клетки

Возбудитель гонореи в мазке гноя




Окраска метиленовым синим.



Окраска по Граму

Колонии *N. gonorrhoeae*



Факторы патогенности *Neisseria gonorrhoeae*

Факторы вирулентности

Биологический эффект

- Пили (белок пилин)
(Пили IV типа – токсич. эффект)

Прикрепление гонококков к эпителию (уретры, влагалища, фаллопиевых труб, полости рта, конъюнктивы)

- Капсула

Антифагоцитарная активность

Белки наружной мембраны:

- Протеин I (Por-пориновый белок)
- Протеин II (Opa — Opacity protein; Opacity — мутность), т.е. протеин мутности;
- Протеин III (Rmp — Reduction modifiable protein)
 - ЛПС
- Бета –лактамаза (не у всех)

Способствует внутриклеточному выживанию бактерий, препятствуя слиянию лизосом с фагосомой нейтрофилов


Опосредует плотное прикрепление к эпителиальным клеткам и инвазию внутрь клеток

Защищает поверхностные антигены (Por-белок, липоолигосахарид) от бактерицидных антител

Липополисахарид обладает свойствами эндотоксина, подавляет рост других микроорганизмов – явление «стерильного гноя»


Гидролизует бета-лактамное кольцо пенициллинов

Патогенез гонококковой инфекции




Патогенез гонококковой инфекции

b *N. gonorrhoeae*




Механизм токсического действия, связанного с пилями IV типа

Митоген-активируемые протеинкиназы, МАПК (mitogen-activated protein kinases, MAPK) [греч. *mitos* — нить и *genes* — порождающий, рождающийся; греч. *protos* — первый и *kineo* — двигаю, перемещаю] — серин-треониновые протеинкиназы, участвующие во внутриклеточном каскаде реакций фосфорилирования, которые начинаются после митогенного или генотоксического (мутагенного) воздействия на клетку внешних сигналов, а также в ответ на действие цитокинов или процесса апоптоза. Каскады реакций фосфорилирования регуляторных белков, обеспечивают постепенное декодирование первичных эффекторных сигналов путем их передачи от поверхности клеток к ядру или другим внутриклеточным компонентам, завершающееся специфической активацией или подавлением активности факторов транскрипции или других регуляторных белков, что сопровождается изменением уровня экспрессии соответствующих генов. Идентифицировано более 10 представителей семейства М.-а.п., оказывающих клеточные эффекты путем фосфорилирования последующих метаболических звеньев сигнального каскада, и, в частности, транскрипционных факторов. В свою очередь, некоторые М.-а.п., напр. Erks (extracellular regulated kinases), p38, Jnk (c-Jun N-terminal kinase), также активируются путем фосфорилирования при участии другого семейства белков, называемого MAP / Erk киназы (MEK), которые сами фосфорилируются и активируются MEK киназами (MEKKs: A-Raf, B-Raf, Raf-1).



Биохимическая активность *N. gonorrhoeae*



Изменение цвета индикатора с красного на желтый в пробирке с глюкозой.

Лабораторная диагностика:

1. Морфология – диплококки (кофейные зерна, пчелиный рой)
2. Гр(-) бактерии
3. Эндоцитобиоз (внутри нейтрофилов, клеток цилиндрического эпителия)
4. ПЦР (для ротовой полости и прямой кишки не используют) - скрининг

Поражено 1-2% нейтрофилов – **начало** заболевания

Поражено 12-20% нейтрофилов – **разгар** заболевания

Лабораторная диагностика:

- Условия оптимальные для культивирования *N. gonorrhoeae* :
- 37°C
 - сыворотка крови или цельная кровь
 - асцитическая жидкость
 - 10-20 % углекислого газа
 - pH 7,2-7,8

Гонорея - острое воспаление мочеиспускательного канала у мужчин, уретры и шейки матки у женщин обычно сопровождается выделением наружу гноя.

Течение заболевания

Инфекции:

- Острая
- Хроническая (L-трансформация)
- Бессимптомная (70-80% у женщин, 5-10% у мужчин)



Осложнения

- Гонококковый сепсис
- Осложнения любых органов
- Кожные поражения

Гонобленорея новорожденных - поражение слизистой глаза гонококками



(греч. blenna - слизь и геон - теку)

Профилактика и лечение



1. Диагностика (установление излеченности) гонореи.
2. Лечение гонореи (вспомогательный метод): после безуспешной антибиотикотерапии при вялопротекающих рецидивах, при свежих торпидных и хронических формах заболевания, мужчинам с осложненной и женщинам с восходящей гонореей (после стихания острых воспалительных явлений), в гинекологической практике при лечении воспалительных процессов.
3. В гинекологии используется по схеме: 1-й день - 0.3 мл; затем, ежедневно увеличивая дозу на 0.1 мл, доводят до 1 мл, после чего, ежедневно снижая дозу на 0.1 мл, доводят ее до 0.3 мл.

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует 4 схемы лечения гонореи:

- 1) ципрофлоксацин**
- 2) цефтриаксон**
- 3) цефиксим**
- 4) спектиномицин**

**Эти схемы предусматривают однократное
назначение препарата.**

Чувствительность к антимикробным препаратам

- **Чувствительны:** пенициллин, левомицетин, ампициллин, рифампицин, тетрациклин, эритромицин.
- **Устойчивы:** ристомицин, линкомицин (это свойство используют при лабораторной диагностике, для выделения чистой культуры)