

Gospodarka plynami i transfuzjologia

Dlaczego?

Masa komórkowa (42% wagi) jest to suma wszystkich komórek ustroju, wśród których najliczniejsze są komórki mięśni szkieletowych i narządów mięsnych. Przestrzeń pozakomórkowa (33%) dzieli się na dwie frakcje: stałą i płynną. Frakcja stała to elementy podporowe (np. kości, ścięgna, powięzie), natomiast płynna to osocze, chłonka, płyn międzykomórkowy, soki trawienne. Tłuszcz stanowiący trzeci element (25%) stanowi rezerwę kaloryczną, i o ile dwie pierwsze przestrzenie tworzące tzw. beztłuszczową masę ciała zawierają dużo wody (około 73%), to tłuszcz jest w zasadzie bezwodny.

Dlaczego?


Zawartość wody w organizmie = 60% m.c.



Wewnątrzkomórkowa
– 40%

Zewnątrzkomórkowa
– 20%

Przestrzenie płynowe



Przedział zewnątrznaczyniowy

- Światło jelit – 9 litrów
- Woda w tkance łącznej & chrząstkach – 3 litry
- Układ kostny – 3 litry
- Przedział międzykomórkowy – 1 litr (Pp i układ moczowy)

Z czego składa się organizm?

Krew 70 ml/ kg

Osocze 40 ml/ kg

Składniki morfotyczne 30 ml/ kg

Bilans wodny

PODAŻ

- Podaż płynów - 1500ml
- Pokarmy – 700 ml
- Metabolizm 300 ml

UTRATA

1. **Perspiratio insensibilis – 900 ml**
2. **Mocz - 1500 ml**
3. **Straty nefizjologiczne: wymioty, biegunki, przetoki**
4. **Utrata do III przestrzeni**
5. **Stolec 100 ml**

Przewód pokarmowy

Podaż doustna (1.5 – 2.0 l)

Ślina (1.5 l)

Sok żołądkowy
(1.5 l)

Sok trzustkowy
(2.0 l)

DWUNASTNICA (8 l)

Żółć (1.0 l)

Jelito cienkie (3 l)

**NIEDROŻ
NOŚĆ !**

Zastawka krętniczo-kątnicza (1.5 l)

Stolec (0.1 l)

Zawartość elektrolitów w płynach wydzielniczych

Elektrolit	Sód [Na ⁺] (mmol/l)	Potas [K ⁺] (mmol/l)	Chlor [Cl ⁻]
Ślina	44	20	
Sok żół.	70-120	10	100
Jelito cienkie	110-120	5-10	105
Żółć	140	5	100
Sok trzustkowy	140	5	75
Biegunki			
- Cholera (dorosły)	120	15	90
- Cholera (dziecko)	100	27	90
- Niespecyficzna (dziecko)	56	25	55

Zapotrzebowanie

- **W niektórych sytuacjach zapotrzebowanie na wodę wzrasta, np.**
- **- wzrost temperatury ciała o 1 stopień zwiększa zapotrzebowanie o około 0,1 - 0,5 litra,**
- **- umiarkowane poty 0,5 l,**
- **- zlewne poty, wysoka gorączka 1,0 - 1,5 l,**
- **- hiperwentylacja 0,5 l,**
- **- otwarte rany lub jamy ciała (zabiegu krótsze niż 5 godzin) 0,5 - 3,0 l,**
- **Należy pamiętać, że utrata 10% wody wywołuje groźne dla życia konsekwencje, a 20% śmierć.**

Elektrolity – zapotrzebowanie dzienne

- Sód 1 – 2 mM/ kg
- Potas 0.5 – 2 mM/ kg
- Wapń 0.1 mM/ kg
- Magnez 0.1 – 0.2 mM/ kg
- Fosfor 0.1 – 0.5 mM/ kg

Płynoterapia

Najczęściej stosowane roztwory krystaloidów to:

1. 0,9% roztwór NaCl (zawiera po 154 mmol/ l sodu i chloru); tzw. ‘sól fizjologiczna’
2. płyn Ringera (zawiera ok. 130 mmol/ l sodu, 4 mmol/ l potasu, 109 mmol/ l chloru, 3 mmol/ l wapnia, ew. 28 mEq/ l mleczanu sodowego – tzw. Ringer zbuforowany mleczanem)
3. PWE (= płyn wieloelektrolitowy, zawiera ok. 141 mmol/ l sodu, 5 mmol/ l potasu, 4 mmol/ l wapnia, 34 mEq/ l dwuwęglanu sodu oraz 2 mEq/ l magnezu)

Płynoterapia

Chory jest w stanie przeżyć 6 dni bez podawania żywienia pod warunkiem zapewnienia podaży płynów i elektrolitów.

Standardowe zapotrzebowanie (M/ K, 70kg):

- 1000 ml 5% Glukozy iv
- 1500 ml r-r Ringera (lub inny płyn wieloelek.)iv
- 40 mEq K⁺ iv

Odwodnienie hipotoniczne

Rodzaj zaburzenia: niedobór wody, ale i większy niedobór sodu w organizmie.

Przyczyna: brak uzupełniania strat podczas wymiotów, biegunek, potów lub zaburzenia endokrynologiczne (np. stan po wycięciu nadnerczy, niewydolność nadnerczy).

Objawy: osłabienie, omdlenie, przyspieszenie akcji serca, zaburzenia świadomości

Leczenie: 0,9% NaCl, 5,85% NaCl

Odwodnienie izotoniczne

Rodzaj zaburzenia: niedobór wody i niedobór sodu w proporcjonalnym stosunku.

Przyczyna: utrata płynów podczas wymiotów, biegunek, potów, oparzenia, odbarczania wodobrzusza, zatrucia tlenkiem węgla

Objawy: pragnienie, osłabienie, omdlenie, wymioty, przyspieszenie akcji serca

Leczenie: płyn Ringera, PWE

Odwodnienie hipertoniczne

Rodzaj zaburzenia: niedobór wody i stosunkowo mniejszy niedobór sodu.

Przyczyna: niedostateczne uzupełnianie płynów podczas potów, przyjmowanie środków moczopędnych, hiperwentylacja, moczówka prosta (zaburzenie hormonalne – utrata samej wody), ostra niewydolność nerek

Objawy: pragnienie, niepokój ruchowy, delirium, śpiączka

Leczenie: roztwory glukozy (najczęściej 5%)

Przewodnienie hipotoniczne

Rodzaj zaburzenia: nadmierna ilość wody w ustroju

Przyczyna: nadmierna podaż płynów bezelektrolitowych, płukanie pęcherza i żołądka

Objawy: nudności, wymioty, duszność, zaburzenia świadomości

Leczenie: przyczynowe, restrykcje płynowe

Przewodnienie izotoniczne

Rodzaj zaburzenia: nadmierna ilość wody i sodu

Przyczyna: nadmierna podaż płynów izotonicznych (np. 0,9% NaCl) u chorych z zaburzeniami czynności nerek,

Objawy: obrzęki, duszność

Leczenie: przyczynowe, restrykcje płynowe i sodu, środki moczopędne

Przewodnienie hipertoniczne

Rodzaj zaburzenia: nadmierna ilość wody i sodu (szczególnie sodu)

Przyczyna: nadmierna podaż sodu, zaburzenia czynności nadnerczy

Objawy: nudności, wymioty, duszność, biegunka, obrzęk płuc

Leczenie: przyczynowe, środki moczopędne

Sód

- **Całkowity Na - 3 000 - 4 000 mmol**
- **Główny kation ECF**
- **50% ulega stałej wymianie**
- **Filtracja/ dzień 22 400 mmol**
- **Resorpcja/ dzień 22 300 mmol**
- **Wydzieliny Pp–zawartość 100-130mmol/l**

Ciągła ścisła regulacja stężenia Na !

- **Na stanowi wskaźnik ciężkości stanu chorego !!!**
- **Organizm traci inne kationy, a nie sól !**

Hiponatriemia

Postać ostra

- spadek poziomu Na $> 0,5$ mmol/h lub
- szybki spadek < 120 mmol/l
- objawy neurologiczne
- należy traktować jak zagrożenie życia

Postać przewlekła

- rozwija się w ciągu > 48 godzin
- bez (rzadko) objawy neurologiczne

Zbyt szybkie wyrównywanie natriemii może spowodować:

- **wiotkie porażenie czterokończynowe**
- **zaburzenia opuszkowe**
- **zaburzenia oddychania**
- **zaburzenia świadomości**

Hiponatremia - leczenie

- Hiponatremia bezobjawowa < 120 mmol/l - nie wyrównywać !**
 - Im szybszy rozwój hyponatriemii - tym szybsze wyrównywanie**
 - NIE przekraczać stężenia 125 mmol/l podczas wyrównywania**
 - **Max przyrost w surowicy to 12 mmol/DOBE \dot{z} – $0,5$ mmol/godz**
 - **Jeżeli hipowolemia – wyrównanie za pomocą $0,9\%$ NaCl (1gNaCl= 17 mmol Na)**
 - **Normowolemia – r-ry hipertoniczne $3-10\%$**
- Monitorowanie stężenia – co godzinę !!!**

Hiponatremia - leczenie

Kalkulacja niedoboru:

Na praw. – Na aktualny x woda całkowita (60% mc)

Częstą przyczyną ostrej hiponatremii jest podanie r-rów bezelektrolitowych po zabiegach operacyjnych (hipersekrecja ADH) – leczenie – 3% NaCl 1-2 ml/kg/h

0,9% NaCl – 1 ml zawiera 0,15 mmol Na i Cl

10% “ 1 ml zawiera 1,7 mmol Na i Cl

Hipernatriemia

> **145 mmol/l** – przesunięcie wody z komórki do pp kom i odwodnienie komórki

Hipernatriemia z normalnym st. Na – moczówka prosta

Obniżone st. Na – diureza osmotyczna, intensywne pocenie, biegunka

Podwyższone stężenie – zatrzymanie sodu przez nerki

Jak obliczyć utracona wodę?

Prawidłowy poziom Na/ aktualny Na x m.c. x 0,6

Potas

- Całkowita zawartość: 3 000-3 500 mmol
- ICF – główny kation
- Filtracja/ absorpcja 680 / 640 mmol
- Stężenie w sokach jelit. 5-20 mmol/l

Straty potasu zwykle wynikają z hypowolemii

- Katabolizm – K^+ ucieka z komórki
proporcjonalnie do stopnia rozpadu białka
- Anabolizm – zagrożenie stężenie K^+ !!! (pobór do wnętrza komórek)

Potas – hiperkaliemia ($> 5,5$ mM/l)

Objawy:

- porażenia mięśni,
- parestezje,
- EKG: uniesienie załamka T
- cardiac arrest

Potas – hiperkaliemia ($> 5,5$ mM/l)

- *Przerwać przetaczanie K^+*
- *środki moczopędne, osmoterapeutyki*
- *Glc + Insulina (1j/ 4-5 g Glc) - 10j w 500 ml 10% Glc*
- *Powtarzane iniekcje 10 ml glukonian wapniowy (co 30 min.)*
- *Wlew 50-100 mEq $NaHCO_3$*
- *Wyrównanie kwasicy*
- *Wymienniki jonowe: Resonium, sól sodowa Resonium)*
podaż doodbytnicza; 30g (100 ml w 10% Glc) obniża – 1 mEq
w osoczu
- *Dializa otrzewnowa lub hemodializa*

Potas - hipokaliemia (< 3,5 mM/l)

Objawy:

- osłabienie, osłabienie odruchów ścięgnistych,
- niedrożność porażenna,
- EKG: spłaszczenie załamka T
- wzdęcie jelit
- nudności

Potas - hipokaliemia (< 3,5 mM/l)

Roztwór – KCl 15% 20ml - 1ml – 3 mmol K i Cl

Spadek kaliemii z 4,0 do 3,0 – 150 mmol

Spadek kaliemii z 3,0 do 2,0 – 300 mmol

Spadek kaliemii z 2,0 do 1,5 – 150 mmol

Ale: - < 20 mEq K/h

- < 20 mEq K/l żyły obwodowej
- < 30 mEq K do 500 ml
- < 2-3 mEq/kg/dobę

7,5 g K⁺ = 100 mmol

Fosfor

- **Zawartość w organizmie: 30 000-32 000 mmol**
- **Rozkład:**
- **Kości: 25 000 - 27 000 mmol**
- **ICF: 4 500 - 5 000 mmol**
- **ECF: 12 - 20 mmol**
- **Filtracja/ Resorpcja: 150/ 120 mmol**

Fosfor

- ⇒ **Duża utrata w sytuacjach krytycznych**
- ⇒ **Utrata zależy od stężenia w osoczu**
- ⇒ **Wzrost stężenia w kwasicy metabolicznej**
- ⇒ **Niedobór fosforu przyczyną ‘refeeding syndrome’**
- ⇒ **Wyrównywać i.v., jeżeli $< 0,7$ mmol/l – ale:**
- ⇒ **Pierwsza dawka $< 2,5$ mmol/kg/ 6 godz**

Magnez

- **Całkowita zawartość: 900 - 1200 mmol**
- **Rozkład: Układ kostny: 500 - 600 mmol**
- **ICF: 500 - 580 mmol**
- **ECF: 12 - 20 mmol**
- **Filtracja/ resorpcja: 160/ 150 mmol**
- **Hipomagnezemia: 8-16 mmol MgSO₄ (w 50-100 ml 5% Glc) przez 10-15 min., następnie 40 mmol MgSO₄ w 500 ml 5% Glc (5 godzin)**

Wapń

- Całkowita zawartość: 25 000-27 000 mmol
- Rozkład w organizmie: **Układ kostny: 99%**
- **ICF: 0.0005 - 0.001 mmol**
- **ECF: 20 - 25 mmol**
- **Filtracja/ resorpcja : 240/ 238 mmol**
- **Hipokalcemia: - leczenie przyczynowe, ale:**
- **10 ml 10% glukoronianu lub chlorku Ca, a następnie 10 ml podawać POWOLI – aż do 80 ml/ dobę (4-8 godzin)**

ABB – podstawowe pojęcia

1/ pH – ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych; prawidłowe wartości: 7,35-7,45 (stężenie jonów wodoru we krwi jest bardzo małe, dlatego wygodniej posługiwać się wskaźnikiem, który obrazuje stan nie w skali dziesiętnej)

2/ kwas – substancja, która dysocjując uwalnia jon wodorowy (H^+)

3/ zasada - substancja, która ma zdolność wiązania jonów wodorowych

4/ kwaśność – $pH < 7,35$

5/ zasadowość – $pH > 7,45$

ABB – podstawowe pojęcia

- 6/ kwasica – patologiczny wzrost stężenia H^+ (czyli spadek pH) lub utrata zasad
- 7/ zasadowica (alkaloza) – patologiczny proces związany z gromadzeniem zasad lub utratą H^+ (wzrost pH)
- 8/ kompensacja – odpowiedź metaboliczna lub oddechowa prowadząca do przywrócenia prawidłowego pH
- 9/ bufony – substancje, które mogą wiązać lub oddawać jony wodorowe i zapobiegać przez to zmianom w ich stężeniu
- 10/ nadmiar zasad – ilość mEq/ l zasady lub kwasu, która przywróci pH do wartości prawidłowej przy stałym ($PaCO_2$)
- 11/ luka anionowa – aniony inne niż jony chlorkowe i węglanowe, potrzebne dla zrównoważenia sodu

Parametr	Zakres prawidłowych wartości
pH	7,35 - 7,45
pa CO₂ (ciśnienie parcjalne CO₂)	35 – 45 mmHg
HCO₃⁻ (stężenie jonów wodorowęglanowych)	24+/- 2
BE (nadmiar zasad)	+/- 5
paO₂ (ciśnienie parcjalne tlenu)	84 – 100 mmHg

Za równowagę kwasowo-zasadową organizmu odpowiedzialne są:

- układy buforowe organizmu, czyli substancje, które mogą wiązać lub oddawać jony wodorowe, neutralizując wahania jonów wodorowych; wyróżnia się bufor białkowy, fosforanowy, wodorowęglanowy
- nerki – wydzielają jony wodorowe i wodorowęglany,
- płuca – usuwają dwutlenek węgla (w wodzie CO_2 jest czynny jak kwas)

Kwasica metaboliczna

- **najczęstszy rodzaj zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej;**
- **przyczynami są np. zatrucia (metanol, glikol etylenowy, kwas salicynowy), niewyrównana cukrzyca, kwasica mleczanowa, choroby nerek, utrata zasad przez przewód pokarmowy),**
- **w badaniach laboratoryjnych: obniżenie pH < 7,35, stężenia dwuwęglanów < 25 mmol/ l oraz objawy kompensacji oddechowej przejawiające się obniżeniem prężności dwutlenku węgla,**
- **leczenie oprócz leczenia przyczynowego, polega na przetaczaniu roztworów węglanów sodu**

Kwasica oddechowa

- przyczyną są zaburzenia wentylacji płuc prowadzące do upośledzenia wydalania dwutlenku węgla, np. astma oskrzelowa, niedrożność drzewa oddechowego, choroby neurologiczne,
- w badaniach stwierdza się wzrost prężności dwutlenku węgla (> 45 mmHg),
- mechanizm kompensacyjny polega na wzmożeniu produkcji i zatrzymywania przez nerki wodorowęglanów,
- w leczeniu podstawowe znaczeniu ma poprawa wentylacji

Zasadowica (alkaloza) oddechowa

- spadek prężności dwutlenku węgla we krwi w wyniku zbyt szybkiej eliminacji CO₂ przez płuca, czyli na skutek hiperwentylacji,
- przyczyny: zaburzenia psychiczne, zatrucie np. alkoholem, niewydolność wątroby, przebywanie na dużych wysokościach,
- mechanizm kompensacyjny polega na zatrzymywaniu jonów wodorowych przez nerki,
- w leczeniu przydaje się ograniczenie oddechu i ogólne uspokojenie chorego.

Zasadowica metaboliczna

- stan dosyć często spotykany w oddziałach Intensywnej Terapii;
- często występuje w wyniku stosowania środków moczopędnych, uporczywych wymiotów, odsysania treści żołądkowej, przetaczania krwi konserwowanej,
- pH wzrasta powyżej 7,45, stężenie dwuwęglanów powyżej 25 mmol/l,
- mechanizm kompensacyjny polega na ograniczeniu wentylacji i wzroście ciśnienia dwutlenku węgla,
- leczenie polega na podawaniu soli fizjologicznej, stężonych roztworów NaCl i potasu.

Podstawy transfuzjologii

Koncentrat krwinek czerwonych (1)

- Przechowywać w temp. +1 do +6 st.
- Ht preparatu – 70-80%
- Przetoczenie KKCz w ilości 2ml/kg – podnosi Hb 10g/l a Ht o 3%
- Bezobjawowa niedokrwistość nie wymaga przetoczeń krwi, a wyrównanie łagodnej niedokrwistości nie przyspiesza gojenia rany ,

Koncentrat krwinek czerwonych (2)

- Jedynym wskazaniem do przetoczenia ME jest konieczność podniesienia zdolności przenoszenia tlenu,
- Jeżeli utrata sięga 25-30% objętości krwi krążącej, to konieczne jest przetoczenie; resuscytacja krystaloidowa wystarcza do utraty 25% objętości,
- Złamanie kości udowej - utrata > 1l krwi,
- Złamanie miednicy - utrata > 2 litry !!!
- Haemascos (krwawienie do jamy otrzewnej) - wstrząs nawet przed rozpoznaniem przyczyny

Osocze mrożone

Wskazania:

- **uzupełnienie deficytu czynników krzepnięcia: II, V, VII, IX, X, XI**
- **odwrócenie działania pochodnych dwukumarolu**
- **w sytuacji masywnych przetoczeń krwi 1-2j FFP/ 8-10 j KKCz lub 3j FFP/ 10 j masy płytkowej,**
- **dostarczenie antytrombiny III**
- **DIC**
- **czas protrombinowy >18 sek; kaolinowo-kef > 55sek, poziom czynników krzep < 25%; fibrynogen < 100 mg%**

Roztwory albumin – 5, 20, 25%

- **normoalbuminemia jest korzystna, bo zmniejsza ryzyko wystąpienia obrzęku płuc, obrzęku jelit, obrzęku tkanek obwodowych.**
- **Preparaty 5, 20, 25%**
- **Przetoczenie 100 ml 25% zwiększa objętość osocza o 450 ml, 500 ml 5% o 250 ml**

Masa płytkowa

Wskazania:

- - 10-20 tys płytek
- - DIC
- - Zaburzenia funkcji płytek
- - Małopłytkowość immunologiczna
- - Masywne przetoczenia
- Prawidłowa hemostaza przy poziomie 70-100 000
- Podanie 1 j powoduje wzrost ilości trombocytów o 5-10 tyś.
- Czas przetaczania max. 30 min

Masywne przetoczenie krwi

- **Przetoczenie przekraczające objętość krwi krążącej w ciągu 24 godzin (> 10 j)**
- **Zaburzenia:**
 - - podwyższenie poziomu potasu; alkalozą rozwijającą się pod wpływem przemiany cytrynianu sodu do wodorowęglanu sodowego,
 - - wzrost stężenia kwasu mlekowego i obniżenie pH
 - - obniżenie 2,3-DPG
 - - obniżenie ilości płytek (klinicznie istotne po przet. 15-20j)
 - - obniżenie potencjału krzepnięcia,
 - - obniżenie poziomu wapnia

Autotransfuzja – najlepsze rozwiązanie

- **nie wytwarzają się p-ciała**
- **-poprawia mikrokrazenie**
- **-nie wymaga próby zgodności**
- **-jeżeli może zachodzić potrzeba przetoczeń
śródoperacyjnych**
- **-Hb 11 g/dl; Ht min 33%**
- **-jednorazowo < 12% obj krwi krążącej**
- **-pobrania co 3-7 dni**
- **-ostatnie 72 godz przed zabiegiem**

Autotransfuzja

Przeciwwskazania:

- zwężenie aorty,
- świeży zawał,
- ciężka niewydolność wieńcowa,
- ciężkie postacie nadciśnienia,
- posocznica,
- niedokrwistość,
- < 14 rż,
- wczesna ciąża (do 14 tyg)

Odczyny poprzetoczeniowe

OSTRE (niezgodność AB0, biorą udział p-ciała IgM

- **wewnątrznaczyniowa hemoliza oraz pozanaczyniowa hemoliza (wątroba/śledziona – bo: niezgodność Rh, K, Fy; krwinki niszczone przez makrofagi, IgG)**
- **odczyn hemolityczny – gorączka, dreszcze, spadek CTK, duszność, krwawienia, bóle, wymioty, skąpomocz) – czasem rozwija się powoli**
- **odczyny gorączkowe (p-ciała p-krwinkom)**
- **odczyny alergiczne (p-ciała p-białkom osocza)-od razu (kaszel, wymioty, skurcz oskrzeli, wstrząs, biegunka, itp.) - 0,9% NaCl; adrenalina podskórnie**
- **przeciążenie krążenia, obrzęk płuc**
- **DIC, hemoliza nieimmunologiczna (uszkodzenie mechaniczne krwinek)**

Inne powikłania

- **Opóźnione odczyny (3-10 dni)**
- **Choroby zakaźne (WZW, HIV, CMV, malaria, toksoplazmoza)**
- **Reakcja graft vs host**

Co zrobić w sytuacji poprzetoczeniowej ?

- zatrzymać przetoczenie,
- przetaczać 0,9% NaCl,
- sprawdzić preparat, kartki, INNE preparaty
- zawiadomić stację krwiodawstwa, przesłać próbki