

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ.



ПРИЧИНЫ:

- Кислоты: уксусная, серная, азотная, концентрированная соляная.
- Щёлочи: нашатырный спирт, моющие, отбеливающие и дезинфицирующие вещества и др.
- Кристаллы перманганата калия.

СТЕПЕНЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАВИСИТ ОТ:

- концентрации едкого вещества,
- его количества,
- характера принятого вещества,
- сроков оказания первой помощи.


КЛАССИФИКАЦИЯ

- Выделяют 4 стадии патологоанатомических изменений:

I-ГИПЕРЕМИЯ И ОТЕК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ




II-НЕКРОЗ И ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ



III-ОБРАЗОВАНИЕ ГРАНУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ



IV-РУБЦЕВАНИЕ



КЛИНИЧЕСКИ ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ СТЕПЕНИ ОЖОГА ПИЩЕВОДА:

- I- Легкая. Гиперемия и отек слизистой оболочки. Отек спадает на 3-4 сутки, а эпителизация ожоговой поверхности заканчивается через 7-8 дней после травмы.
- II- Средняя. Глубокое повреждение слизистой оболочки. Характеризуется некрозом ее эпителиальной выстилки и образованием легко снимающихся негрубых фибринозных наложений. Заживление происходит в течение 1,5 – 3 недель путем полной эпителизации или образования нежных рубцов, не суживающих просвет пищевода.
- III- Тяжелая. Проявляется некрозом слизистой оболочки, подслизистого слоя, а порой и мышечной стенки пищевода с образованием грубых, долго не отторгающихся (до 2 недель и больше) фибринозных наложений. По мере их отторжения появляются язвы, на 3-4-ой неделе заполняющиеся грануляциями с последующим замещением рубцовой тканью, суживающей просвет пищевода.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КИСЛОТАМИ:



-
- Кислоты вызывают коагуляционный некроз, т. е. обезвоживание и коагуляцию тканей, в результате чего наступает их гибель по типу сухого некроза.
 - Всасывание кислот, а также продуктов тканевого распада обуславливает общетоксическое действие.
 - У большинства детей на коже груди, шеи, подбородка отмечаются ожоги I—II степени в форме «подтеков». Слизистые оболочки рта, зева, миндалин резко гиперемированы, отечны и кровоточат.

-
- Боли в горле, по ходу пищевода и в подложечной области.
 - Резко усилена саливация.
 - Дыхание и глотание затруднены.
 - Отек гортани вызывает резкое сужение голосовой щели и асфиксию. Голос становится хриплым, иногда наблюдается полная афония.
 - Мучительная рвота с кровью, кровавый понос.
 - Часто дети находятся в состоянии двигательного и психического возбуждения, резко выражен экзофтальм.
 - Пульс обычно учащен до 180—200 ударов в минуту,
 - Артериальное давление повышено.
 - Лейкоцитоз до 20—30 тыс., нейтрофилез со сдвигом лейкоцитарной формулы влево
 -

-
- Резкий ацидоз
 - Массивный гемолиз и гемоглобинурия вызывают закупорку почечных канальцев, приводя к так называемому гемоглобинурийному нефрозу с типичной клинической картиной острой почечной недостаточности.
 - Гемолиз сопровождается увеличением содержания в крови непрямого билирубина.
 - СОЭ замедлено.
 - Повышается вязкость крови, создаются благоприятные условия для внутрисосудистого тромбообразования и нарушения гемодинамики, ведущие к развитию тяжелых коллапсов.
 - Остаточный азот повышается до 50—70 мг%.

-
- При отравлении щавелевой кислотой снижается содержание ионизированного кальция в плазме крови и в тканях, так как при этом образуются труднорастворимые соли. В связи с этим очень быстро, сочетаясь с тяжелым коллапсом, возникают тонические и клонические судороги.
 - Поскольку кристаллы щавелевокислого кальция могут выпадать в просвете канальцев почек, у больного может возникнуть острая почечная недостаточность, проявляющаяся в виде олигурии, а в тяжелых случаях даже анурии.
 - В моче (низкий удельный вес) обнаруживаются белок, кристаллы оксалата кальция и отдельные цилиндры.

ЦВЕТ СТРУПА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОЖОГАХ:

- При ожоге соляной и серной кислотами струп имеет белый цвет, переходящий затем в серый или даже черный вследствие пропитывания его гематином;
- при ожоге азотной кислотой — струп желтого цвета, так как при взаимодействии этой кислоты с входящими в состав белка ароматическими аминокислотами образуются нитросоединения желтого цвета;
- при ожоге уксусной и щавелевой кислотами - белый цвет.
- Струп обычно плотный, не проникающий глубоко в ткани, в отличие от струпа при ожоге щелочами.

ПРОГНОЗ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КИСЛОТАМИ

- В первые двое суток смерть может наступить от асфиксии, шока, сердечно-сосудистой недостаточности.
- В последующие 2 недели после отравления могут наблюдаться такие тяжелые осложнения, как:
- острая почечная недостаточность, повторные коллапсы, профузные кровотечения (после отторжения струпов), геморрагические пневмонии, прободение желудка, которые могут привести больного к летальному исходу.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЩЕЛОЧАМИ

- некроз при отравлении щелочами колликвационный, струп не образуется, яд проникает вглубь тканей вплоть до полной его нейтрализации. Поэтому повреждение более глубокое и угроза перфорации намного выше;
- резорбтивное действие яда выражено в меньшей степени, гемолиз не характерен.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ПЕРМАНГАНАТОМ КАЛИЯ.



-
- Наиболее тяжело протекают отравления кристаллическим перманганатом калия.
 - Попадая в кровь, сильнейший окислитель вызывает метгемоглобинемию, гиперкалиемию, накапливаясь в органах, нарушает деятельность головного мозга, почек, печени и миокарда.

-
- Характерны болезненность при глотании, гиперсаливация, боль в подложечной области, рвота с прожилками или даже со сгустками крови, кровавые поносы.
 - Точечные ожоги от кристаллов перманганата калия можно увидеть на коже лица, шеи, рук и груди ребенка. Слизистые оболочки буро-фиолетовой окраски, отечные, с кровоточащими эрозиями.
 - При тяжелых ожогах развивается отек гортани, возникает резкое сужение голосовой щели, ведущее к асфиксии, что требует немедленной трахеотомии.
 - Двигательное возбуждение и судороги являются ранними проявлениями поражения головного мозга.

ДИАГНОСТИКА

- Эзофагоскопия позволяет определить протяженность поражения, проследить за динамикой процесса, своевременно выявить формирующиеся стриктуры.