

Хирургическое лечение ахалазии пищевода и кардиоспазма

Кафедра общей хирургии Волгоградского
Государственного медицинского университета

Распространенность нейромышечных заболеваний пищевода

Заболеваемость – 0,001 – 0,002


Являются причиной до 20% всех случаев дисфагии

Распределение больных
по полу:



■ женщины ■ мужчины

Распределение больных
по возрасту:



Осложнения ахалазии пищевода и кардиоспазма:

- Безоары
- Дивертикул
- Инородные тела
- Пищевод Баррета
- Плоскоклеточный рак
- Варикозное расширение вен
- Пищеводные свищи
- Перикардит
- Объемное образование шеи
- Пневмоперикард
- Аспирационные поражения легких
- Стридор, бронхообструкция
- Отслаивание подслизистого слоя пищевода

Причины нейромышечных заболеваний пищевода

Этиология

- Врожденный дефицит нейронов ауэрбаховского сплетения
- Уоллеровская дегенерация ауэрбаховского сплетения
- Неврогенная дискоординация моторики пищевода
- Рефлекторная дисфункция пищевода
- Инфекционно-токсические поражения нервных сплетений пищевода и НПС
- Стress, длительное эмоциональное напряжение

Патогенез

- Отсутствие или недостаточное расслабление НПС после акта глотания.
- Изменение тонуса и перистальтики вышележащих отделов пищевода. Появление непропульсивных перистальтических волн. Некоординированные сегментарные сокращения стенки пищевода.
- Механическое раскрытие НПС под влиянием гидростатического давления столба жидкости над ним.

Основные методы лечения ахалазии пищевода и кардиоспазма

Лекарственная терапия

- Атропин
- Местные анестетики
- Нитраты
- Ганглиоблокаторы
- Седативные средства
- Витамины группы В

Внутрисфинктерное введение ботокса

Баллонная кардиодиллятация

Хирургические методы (Более 60 видов вмешательств)

- Модификации операции Геллера
- Резекционные методы
- Эзофагофундостомии
- Пластика пищевода

Структура больных ахалазией пищевода и кардиоспазмом (311 чел.)

(торакальное отделение ОКБ №1 г. Волгоград 1976 – 2008 гг)


Распределение по полу




Распределение по возрасту



Распределение больных по стадии заболевания



Длительность анамнеза заболевания до обращения в клинику



Первая группа

155 пациентов (1976 – 1989гг)

- **Пневмокардиодилатация**
2 больных (53%).
в среднем 7 процедур/курс
отдаленные результаты
прослежены у 76 (92,6%)
больных.
- **Оперировано**
73 больных (47%)



Оценка эффективности лечения кардиоспазма.


Клиническая шкала Алабама:

Учитываются 3 основных симптома – дисфагия, эпизоды регургитации, загрудинная боль.

Результаты:

- **Хороший** - стойкое снижение выраженности 3-х симптомов
- **Удовлетворительный** – снижение выраженности симптомов с развитием рецидива в течении 3-х мес.
- **Неудовлетворительный** – отсутствие снижения выраженности симптомов


Результаты консервативного лечения ахалазии пищевода и кардиоспазма




Вторая группа

156 пациентов (1990 – 2008 гг)

- Пневмокардиодиллятация не применялась
- Консервативное лечение – 38 чел.
- Операция Геллера в модификации РНЦХ РАМН – 118 чел (II – IV ст).
- Экстирпация пищевода с одномоментной пластикой желудочноной трубкой – 4 чел.
- Отдаленные результаты изучены у 73 пациентов.




Результаты хирургического лечения ахалазии пищевода и кардиоспазма




Результаты различных способов лечения ахалазии пищевода и кардиоспазма

кардиодилляция



Операция




■ неудовлетв

■ хорошие и удовл.

При консервативном лечении



более 50%
пациентов
за 10 лет
переходят
в следующую
стадию




Выводы:

- Применение баллонной пневмокардиолягации показано при I стадии заболевания.
- Показаниями к эзофагокардиомиотомии являются: ближайший рецидив или неэффективность кардиодиллягации при I стадии, все случаи II – IV стадии заболевания.

Клинический пример

Больная П. 47 лет



Поступила из ЦРБ с ДЗ: «Доброкачественное новообразование средостения»

При обследовании в клинике ДЗ:
«Кардиоспазм IV ст. Мегаэзофагус»



Клинический пример

Больная П. 47 лет

