Иммедиат протез

Иммедиат-протезы представляют собой временную конструкцию, которая накладывается на челюсть сразу поле удаления зубов или при подготовке к протезированию постоянным протезом. Задача иммедиат-протезирования не позволять зубам смещаться, удерживать их на месте. Протезирование этими съемными протезами недолговечно и использовать долго не рекомендуется.

Иммедиат-протез выполняет несколько функций:

- 1. восстановление функции жевания, за счет восстановления зубного ряда
- 2. эстетическая функция-после удаления зуба пациент одевает иммедиат-протез и не испытывает дискомфорта от дефекта зубного ряда во время разговора, улыбки.



Временные съемные протезы (иммедиат-протезы) часто изготавливают в следующих клинических ситуациях:

- удаление одного или нескольких передних зубов в результате травмы
- удаление зубов при заболеваниях пародонта
- плановое удаление зубов и подготовка костной ткани к установке имплантатов

Показанием к изготовлению иммедиат-протеза при заболеваниях парадонта является:

- Удаление передних зубов
- Удаление зубов фиксирующих высоту прикуса
- Резекция альвеолярной дуги челюсти



Основные клинико-лабораторные этапы изготовления иммедиат-потезов при заболеваниях пародонта

- Получение слепков и изготовление по ним моделей
- Сопоставление моделей в положении центральной окклюзии и загипсовка в окклюдатор
- Моделировка восковой модели базиса протеза с постановкой зубов и кламмеров
- Замена воска на пластмассу
- Шлифовка, полировка

Доказано

• Если зубной протез наложен в день удаления зуба, то в парадонте возникает воспалительная реакция, но она постепенно стихает и через 7-10 дней состояние пародонта не отличается от нормального. Если же протез наложен через 10 дней после удаления, то воспалиельная реакция остается и после протезиования.



Существует несколько фаз привыкания:

- раздражения (обычно до суток);
- частичного торможения (1-5 дни, когда постепенно восстанавливается жевательная функция, речь);
- полного торможения (5-33 дни, когда вы уже начинаете испытывать дискомфорт без протеза).

 После наложения иммедиат-протеза больным следует рекомендовать отказаться от жесткой и сухой пищи на 3-4 дня. При этом полное заживление ран наступает через 3-5 дней

