


Синдром очагового поражения миокарда


Под очаговым поражением миокарда подразумевается локальное нарушение кровообращения в определенном участке сердечной мышцы с нарушением процессов деполяризации и реполяризации и появлением синдрома ишемии, повреждения и некроза

Нормальная ЭКГ



Ритм синусовый, ЧСС = 66 в мин, ЭОС не отклонена

Ишемия миокарда



ЭКГ во время приступа стенокардии. В отведениях aVL, V₂-V₆ горизонтальная депрессия ST до 2 мм, что свидетельствует о субэндокардиальной ишемии переднеперегородочной области левого желудочка

Признаки инфаркта миокарда

- 1) Очаговость
- 2) Дискордантность
- 3) Изменчивость

Локализация инфаркта миокарда



Отведения, в которых регистрируются патологические изменения	Локализация ИМ
V1-V2	перегородочная
V1-V4	передне-перегородочная
V3-V4	передняя
V1-V6, I, aVL	вся передняя стенка левого желудочка
V3-V6, I, aVL	передне-боковая
I, aVL, V6	боковая
I, aVL	верхнебоковая
II, III, aVF, V4-V6	нижнебоковая
II, III, aVF	нижняя
высокий R в V1-V2	задняя
подъем ST>1 мм в V3R, V4R	правый желудочек

ЭКГ-признаки ИМ на различных стадиях

	<p>Острая стадия – ST и Т слиты в одну волну (монофазный потенциал повреждения). Длится от нескольких часов до нескольких суток с начала инфаркта</p>
	<p>Подострая стадия – глубокий Q, малый R, начинает дифференцироваться отрицательный Т. Длится 1-3 недели от начала инфаркта</p>
	<p>Восстановительная стадия – глубокий Q, ST на изолинии, Т отрицателен (ишемический Т). Длительность – 2-6 недель от начала инфаркта</p>
	<p>Стадия рубцевания – глубокий и уширенный Q, отрицательный Т. Даные изменения могут оставаться постоянно</p>



Переднеперегородочный ИМ.







Задний ИМ в острой стадии

в II-III, aVF зарегистрированы патологические зубцы Q, подъем ST по типу монофазной кривой. Дискордантное смещение сегмента ST в I, aVL, V1-V4

Динамика заднего инфаркта миокарда

242






Фонокардиография (ФКГ)

Фонокардиография является методом графической регистрации звуковых колебаний, возникающих при работе сердца


Расположение на грудной клетке стандартных точек для записи фонокардиограммы



- 1 — над верхушкой сердца;**
- 2 — в области проекции митрального клапана;**
- 3 — в области проекции трикуспидального клапана;**
- 4 — над аортой;**
- 5 — над легочной артерией;**
- 0 — нулевая точка**

Нормальная ФКГ


- Величина интервала Q — I тон равна 0,02 — 0,06 с (реже — до 0,07 с)
- Начало II тона соответствует концу зубца Т ЭКГ и в норме может опережать это положение не более чем на 0,02 с или отставать от него не более чем на 0,04 с




Фонокардиограмма здорового человека 29 лет (верхушка сердца) I тон состоит из высокочастотных осцилляций большой амплитуды, возникает через 0,07 с после начала желудочкового комплекса ЭКГ. II тон появляется через 0,02 с после окончания зубца Т ЭКГ. Через 0,14 с после начала II тона в диапазоне низких и средних частот регистрируется III тон. Вершина волны. С яремной флебограммы совпадает с конечными осцилляциями



Фонокардиограмма больного Б., 27 лет (верхушка сердца). Выраженная недостаточность митрального клапана. Амплитуда I и II тонов увеличена. Непосредственно после I тона начинается нарастающий высокоамплитудный систолический шум, сливающийся со II тоном. Через 0,14 с после начала II тона регистрируется патологический III тон



Фонокардиограмма больной Б., 35 лет (верхушка сердца). Выраженный митральный стеноз. Амплитуда I тона увеличена. Интервал Q — I тон равен 0,10 с. Низкоамплитудный систолический шум. Интервал II тон — OS равен 0,08 с. Индекс Уэллса составляет 0,02. Пандиастолический шум с высокоамплитудными осцилляциями в протодиастоле и в пресистоле



Чреспищеводное
эхокардиографическое
исследование в поперечной
плоскости: позиция длинной
оси выносящего тракта левого
желудочка. LA — левое
предсердие, LV — левый
желудочек, RV — правый
желудочек, RA — правое
предсердие, LVOT —
выносящий тракт левого
желудочка.

Параметры нормальной ЭхоКГ

Внутренний диаметр аорты 2,0-3,6см

Аортальный клапан: структура однородная

Открытие створок аортального клапана 1,5-2,6см

Скорость кровотока в аорте 1,0-3,5м/с

Диаметр левого предсердия 1,9-3,5см

Толщина RVPW 0,45

Диаметр RV 2,8

Толщина IVS 0,6-1,0 (диастола) 0,9-1,4 (систола)

Диаметр LV до 5,5 (диастола) 2,2-4,0 (систола)

Толщина LVPW 0,7-1,1(диастола) до 1,6 (систола)

Конечный объем LV (мл) 188-140(диастола) 38-55(систола)

Фракция сокращения 25%

Фракция выброса 58-89%

Масса миокарда (г) 140-170

Скорость циркул. волокон 0,0-1,4

Ударный объем (мл) 123-40

Минутный объем (л/мин) 8,9-3,7

Скорость кровотока через митральный клапан 0,6-1,3м/с

Скорость кровотока через клапан легочной артерии 0,6-0,9м/с

Скорость кровотока через трехстворчатый клапан 0,3-0,7м/с