



# **ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.**



## ИППП-инфекции, передающиеся половым путем.

### Основные факты.


- ✓ Ежегодно происходит 449 миллионов новых случаев излечимых инфекций, передаваемых половым путем (сифилиса, гонореи, хламидиоза и трихомониаза).
- ✓ Некоторые инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), протекают без симптомов.
- ✓ Среди беременных женщин с нелеченым сифилисом на начальной стадии 21% беременностей заканчивается рождением мертвого плода, а 9% — смертью новорожденного.
- ✓ ИППП являются одной из важных причин бесплодия у мужчин и женщин.
- ✓ Лекарственная устойчивость, особенно в случае гонореи, является серьезной угрозой для глобальной борьбы с ИППП.
- ✓ ИППП могут в три и более раз повышать риск приобретения ВИЧ-инфекции.

Различают:

Бактериальные инфекции:

- ✓ Сифилис (*Treponema pallidum*)
- ✓ Гонорея (*Neisseria gonorrhoeae*)
- ✓ Хламидийные инфекции (*Chlamydia trachomatis*)
- ✓ Мягкий шанкр (*Haemophilus ducreyi*)
- ✓ Паховая гранулема (*Klebsiella granulomatis*)

# Сифилис.



Гонорея.



Мягкий шанкр.



## Распространенные вирусные инфекции:


- ✓ Вирус иммунодефицита человека (вызывает СПИД)
- ✓ Вирус простого герпеса типа 1 и 2 (вызывает герпес половых органов)
- ✓ Вирус папилломы человека (вызывает остроконечные кондиломы, а некоторые подтипы приводят к развитию рака шейки матки у женщин)
- ✓ Вирус гепатита В (вызывает гепатит, а хронические случаи могут приводить к развитию рака печени)
- ✓ Цитомегаловирус (вызывает воспаление целого ряда органов, включая  
мозг, глаза и кишечник).

# Генетальный герпес.





Гепатит В.



## Протозойные инфекции.

- ✓ Трихомониаз (основное место обитания трихомониаза в мужском организме — уретра, предстательная железа и семенные пузырьки, в женском — влагалище)


## Грибковые инфекции.

- ✓ Кандидоз



## Паразитарные заболевания.

- ✓ Фтириаз(паразитарное венерическое заболевание кожи вызываемое лобковой вошью.)
- ✓ Чесотка(вызываемое микроскопическим паразитом — чесоточным клещом или чесоточным зуднем)

# Трихомоноз.



Кандидоз.



Основными синдромами наиболее распространенных ИППП являются:

- выделения из мочеиспускательного канала;
- язвы на половых органах;
- припухлости в паху (бубоны в паховой области);
- припухлость мошонки;
- вагинальные выделения;
- боль внизу живота;
- неонатальные глазные инфекции (конъюнктивиты новорожденных).

Некоторые ИППП протекают бессимптомно. Например, подавляющее большинство женщин и значительная доля мужчин с хламидийной и/или гонококковой инфекциями не испытывают никаких симптомов.

## Пути передачи.

- ✓ Распространение от человека к человеку при сексуальных контактах(более 30 видов передаваемых половым путем бактерий, вирусов и паразитов).
- ✓ Некоторые инфекции, в частности ВИЧ и сифилис, могут также передаваться от матери ребенку во время беременности и родов.
- ✓ при переливании продуктов крови и пересадке тканей.



Группа венерических ИППП передается при незащищенном половом контакте (включая орально-генитальные формы). Поцелуи, орально-половой контакт и использование сексуальных игрушек, многократно повышает риск инфицирования при защищенном с помощью презерватива половом акте.

- ✓ заразиться вирусом папилломы человека возможно при тесном бытовом контакте
- ✓ влагалищная трихомонада может длительное время сохранять свои инфекционные свойства во влажной среде (мокрые полотенца, гладкие поверхности).
- ✓ Возбудитель чесотки или лобковая вошь может передаваться контактно-бытовым путем через предметы обихода.



## Основные синдромы:


- ✓ выделения из мочеиспускательного канала;
  - ✓ язвы на половых органах;
  - ✓ припухлости в паху (бубоны в паховой области);
  - ✓ припухлость мошонки;
  - ✓ вагинальные выделения;
  - ✓ боль внизу живота;
  - ✓ неонатальные глазные инфекции (конъюнктивиты новорожденных).
  - ✓ Некоторые ИППП протекают бессимптомно.
-



## Осложнения ИППП:

- ✓ Бесплодие
- ✓ Невынашивание
- ✓ Преждевременные роды
- ✓ Пороки развития плода
- ✓ Высокая заболеваемость новорожденных





## Отдаленные осложнения ИППП.

- ✓ Поражение жизненно-важных органов, приводящее к инвалидности.  
(миокардиты, артриты, поражение мозга и др.)
- ✓ Онкологические заболевания ( рак шейки матки, рак эндометрия, рак яичников у женщин, рак предстательной железы и мочевого пузыря у мужчин)
- ✓ Рост числа заболевших СПИДом.

Всемирной организацией здравоохранения в «Глобальной стратегии профилактики инфекций, передаваемых половым путем, и борьбы с ними на 2006—2011 годы» выделяется понятие «безопасного полового поведения», включающего в себя:

- Правильное и систематическое использование мужских и женских презервативов
- Правильное применение местных бактерицидных средств
- Периодическое обследование с помощью синдромной или лабораторной диагностики
- В случае диагностирования инфекции (или подозрения на её наличие) специализированное лечение
- Половое воздержание
- Уведомление половых партнеров
- Вакцинопрофилактика против онкогенных вирусов гепатита В и папилломовируса человека.

ИППП, чаще всего,  
является следствием  
раскованного  
полового поведения и  
образа жизни!!!

---



ЗАДУМАЙТЕСЬ О СВОЕМ БУДУЩЕМ И БУДУЩЕМ  
СВОИХ ДЕТЕЙ!!!

