


Глава 3

Клинические признаки серьезных заболеваний новорожденных



Летаргия




Втяжение грудной клетки



(Ref. p.74)

Раздувание крыльев носа



(Ref. p.74)

Вздутие живота – парез кишечника



(Ref. p.49)

Пурпурные (септические) пятна, вздутие живота



(Ref. p.149)

Вздутие живота : кишечная непроходимость



(Ref. p.235)

Желтуха, вздутие живота



(Ref. p.57)

Обследуйте на наличие локальных проявлений инфекций

- Гнойные выделения из уха
- Гнойнички на коже
- Гиперемия пупочного кольца и околопупочной области или гнойные выделения
- Отек и болезненность суставов, пониженная подвижность



Целлюлит/ остеомиелит



(Ref. p.256)

Септический артрит



(Ref. p.165, 258)

Кожные гнойнички: стафилококковая инфекция



Абсцесс груди





(Ref. p.256)




World Health
Organization

Лихорадка, гиперемия пупка и отек



(Ref. p.49)

КОНЪЮНКТИВИТ




(Ref. p.60)

Подозревайте менингит, если:

- Общие симптомы:
 - Раздражительность
 - Рвота после приема любой пищи
 - Летаргическое состояние
- Напряженный или взбухающий родничок
- Ригидность затылочных мышц (поздняя стадия)
- Пронзительный плач («мозговой» плач)
- Эпизоды апноэ
- Судороги



Выбухающий родничок



(Ref. P.50)




World Health
Organization

Тризм и повышенный мышечный тонус – столбняк новорожденного



(Ref. P.24)



World Health
Organization