



Колла

Коллапс (от лат. *collapsus* — упавший) — угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов.

Коллапс — также одна из форм острой сосудистой недостаточности, характеризующаяся снижением сосудистого тонуса, острым снижением объема циркулирующей крови, что приводит к гипоксии головного мозга угнетается функция



Причин ы:

- 1) острые инфекции (брюшной и сыпной тифы, пневмония)
- 2) острая кровопотеря
- 3) болезни эндокринной и нервной системы (опухоли)
- 4) интоксикации
- 5) спинномозговая анестезия
- 6) острые заболевания органов брюшной полости (перитонит и др.)
- 7) гипоксия
- 8) резкое изменение положения тела при вставании



Симптомы:

- Большею частью внезапно развиваются ощущения общей слабости, головокружение, ослабление зрения, шум в ушах.
- **Сознание сохранено, больной безучастен**
- Артериальное давление снижено, может быть 60/30 мм. рт. ст.
- Глухость тонов
- Пульс малый, слабого наполнения, обычно учащенный
- Аритмия
- Дыхание поверхностное, учащенное
- Бледность кожи
- Акроцианоз
- Тургор тканей снижен
- Температура тела снижена



Виды

1. **СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ** КОЛЛАПС
(КАРДИОГЕННЫЙ) — УМЕНЬШЕНИЕ
СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА

1. **ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИЙ** КОЛЛАПС —
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА КРОВИ

1. **ВАЗОДИЛЯТАЦИОННЫЙ** КОЛЛАПС —
РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ

1. **ОРТОСТАТИЧЕСКИЙ** КОЛЛАПС —
СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА
ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ПРИ РЕЗКОМ
ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА



Помощь

1. Больного согревают, укладывают с приподнятыми ногами
2. Этиологическая терапия (устранение основной причины)

- **Кровезаменители:** полиглюкин, реополиглюкин.
- **При обезвоживании:** солевые растворы (ацесоль, хлосоль, дисоль, трисоль, квартосоль 50 мл на 1 кг массы тела).
- **При кровотечении** применяют препараты крови – плазма альбумин, протеин, цельная кровь, эритроцитарная масса.
- **При ортостатическом коллапсе** применяют вазопрессоры: метазон, адреналин, допамин внутривенно.
- **Если кровотечение не язвенное** применяют гормоны – 0,01-0,02 мг преднизолона



Запрещённые действия:

**1. давать препараты с выраженным
сосудорасширяющим действием (нош-па,
валокордин, глицерин)**

1. ударять по щекам, пытаться привести в



Спасибо за

вниманию!