

# ***Компоненты и основные этапы общей анестезии. Классификация видов обезболивания.***

Выполнил(а): Браун А.В. 6/114 группа  
Проверил: Сыздықбаев М.К.

Астана 2015г.

# Анестезия

- 1. Полная потеря чувствительности (в узком смысле слова).
- 2. Комплекс мероприятий, направленных на защиту организма пациента от болевых воздействий и неблагоприятных реакций, возникающих во время хирургического вмешательства.
- Общая анестезия - это искусственно вызванная гипорефлексия с полным выключением сознания, болевой чувствительности и торможением широкого спектра соматических и вегетативных рефлексов, достигаемая с помощью фармакологических средств.

# **Классификация методов обезболивания**

- Местная анестезия
- Регионарная анестезия
- Общая анестезия

# **Общая анестезия**

**I. Ингаляционная анестезия** – анестетик поступает в организм пациента через дыхательные пути.

**1. Масочный способ** – анестетик подаётся в дыхательные пути больного через маску.

**2. Интубационный способ** заключается во введении анестезирующих газов или паров вместе с кислородом непосредственно через трахею и бронхи в легкие. Газонаркотическая смесь подается по интубационной трубке, введённой через голосовую щель в трахею или бронх:

- а) эндотрахеальный;
- б) эндобронхиальный.

**II. Неингаляционная анестезия** - анестетик вводится в организм пациента, минуя дыхательные пути.

**1. Сосудистый способ:**

- а) внутривенный;
- б) внутрикостный путь введения вещества.

**2. Внесосудистый способ:**

- а) пероральный;
- б) ректальный;
- в) внутримышечный путь введения вещества.

**III. Электроанестезия** – вид общей анестезии, заключающийся в воздействии электрического тока определенных параметров на структуры мозга. Этот вид обезболивания обязательно должен сочетаться с другими компонентами современного общего обезболивания.

**IV. Комбинированная многокомпонентная анестезия** достигается целенаправленным применением нескольких методов анестезии (ингаляционных и неингаляционных). Комбинированное применение препаратов позволяет существенно уменьшить дозы анестетиков, аналгетиков и достичь лучшего эффекта при меньшем токсическом воздействии и наименьшем воздействии на функции жизненно важных органов.

**V. Сочетанная анестезия (сочетание местной и компонентов общей анестезии).**

# Основные компоненты общей анестезии:

- 1. **Выключение сознания.**
- Используются ингаляционные анестетики (галотан, изофлюран, севофлюран, закись азота), а также неингаляционные анестетики (пропофол, мидазолам, диазепам, тиопентал натрия, кетамин).
- 2. **Обезболивание.** Применяются наркотические анальгетики (фентанил, суфентанил, ремифентанил), а также регионарные методы анестезии.
- 3. **Миорелаксация.** Используются миорелаксанты (дитилин, ардуан, тракриум).
- Также выделяют специальные компоненты анестезии, к примеру, использование аппарата искусственного кровообращения при операциях на сердце, гипотермия и другое.

## **Компоненты общей анестезии**

1. Гипнотический компонент (сон, наркоз) – достигается анестетиками, анксиолитиками, атрактиками и пр.
2. Аналгезия - достигается применением аналгетиков (опиоидов и НПВС, а также неопиоидных аналгетиков, например, Клонидин).
3. Нейровегетативная блокада – достигается применением нейролептиков (например, Дроперидол, реже Галоперидол);
4. Тотальная миоплегия – достигается применением миорелаксантов деполяризующих (например, Суксаметония хлорид) и недеполяризующих (например, Атракурия бензилат, Панкурония бромид; ) с использованием ИВЛ (респираторами различных моделей).
5. Остальные компоненты: поддержание адекватности газообмена (ИВЛ), кровообращения (например, инотропная и сосудистая поддержка, ЭКС) и метаболизма (предупреждение кислородного голодания; обеспечение адекватного водно-электролитного баланса; обеспечение энергетических потребностей организма; предупреждение нарушений терморегуляции).

Таблица 8.3. Компоненты общей анестезии


Компонент	Проявление	Чем достигается
<b>Торможение психического восприятия боли</b>	Сон	Аnestетики (ингаляционные и неингаляционные)
<b>Гипорефлексия</b> – блокада всех видов аfferентной импульсации, в том числе и болевой, а также предупреждение и торможение вегетативного компонента боли и различных патологических рефлексов. Включает в себя <b>центральную аналгезию</b> и <b>нейровегетативную блокаду</b>		
<b>Центральная аналгезия</b>	Блокада болевых аfferентных импульсов	Аналгетики (Фентанил, Морфин гидрохлорид)
<b>Нейровегетативная блокада</b>	Торможение вегетативных реакций	Нейролептики (Дроперидол)
<b>Мышечная релаксация</b>	Выключение двигательной активности	Мышечные релаксанты (Сукцинилхолин, Тубарин и др.)
<b>Управление гемодинамикой</b>	Управляемая гемодинамика	Контроль ОЦК, инфузионно-трансфузионаная терапия,

# Периоды (этапы) общей анестезии.

- 1. Период введения (вводная анестезия, индукция).
- 2. Период поддержания анестезии (базисная анестезия).
- 3. Период выведения (пробуждения).

# Вводная анестезия.

- Анестетики вводятся ингаляционно через лицевую маску (чаще у детей или при обструкции дыхательных путей) при помощи наркозного аппарата или внутривенно через периферический венозный катетер. Наркозный (наркозно-дыхательный) аппарат предназначен для проведения вентиляции легких, а также введения ингаляционных анестетиков. Доза анестетика определяется массой тела, возрастом и состоянием сердечно-сосудистой системы. Внутривенно препараты вводятся медленно, исключение составляют пациенты с риском регургитации (экстренная операция, беременность, ожирением и др.), когда анестетики вводят быстро.




- В период поддержания анестезии продолжается внутривенное, ингаляционное или комбинированное введение анестетиков. Для поддержания проходимости дыхательных путей используются интубационная (эндотрахеальная) трубка или ларингеальная маска. Процедура вставления эндотрахеальной трубки в дыхательные пути называется интубацией трахеи. Для её проведения необходимо наличие интубационных трубок различных размеров и ларингоскопа (оптический прибор, предназначенный для осуществления визуализации гортани; состоит из рукоятки и клинка).

- В **период выведения из наркоза** подача анестетиков больному прекращается, после чего происходит постепенное восстановление сознания. После пробуждения пациента (определяется по способности выполнять простые команды, к примеру, открывание рта), восстановления мышечного тонуса (определяется по способности приподнимать голову) и возвращения респираторных рефлексов (определяются по наличию реакции на интубационную трубку, кашлю) проводится экстубация трахеи (удаление интубационной трубки). Перед экстубацией газовая смесь заменяется 100% кислородом; при необходимости при помощи санационного катетера выполняется отсасывание слизи из глотки и трахеального дерева (через интубационную трубку). После экстубации нужно обязательно убедиться в способности пациента поддерживать адекватное дыхание и при необходимости применить тройной приём, ротоглоточный воздуховод, вспомогательная вентиляция легких. Также после экстубации пациенту дают кислород через лицевую маску.

**ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ БОЛЬНОМУ АНЕСТЕТИКОВ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПРЕДСТОЯЩИМ ОКОНЧАНИЕМ ОПЕРАЦИИ. ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ДЛЯ ДАННОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ, ЗАЩИТНЫХ РЕФЛЕКСОВ С ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, МЫШЕЧНОГО ТОНУСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ (W.E. HURFORD, M.T. BAILIN, J.K. DAVISON, K.L. HASPEL, C. ROSOW, 1998, В.В. ЛИХВАНЦЕВ, 1998, 2005).**

Главным в работе анестезиолога в период выведения из состояния общей анестезии является восстановление адекватного дыхания с обеспечением свободной проходимости дыхательных путей, защитных рефлексов с восстановлением адекватного сознания и мышечного тонуса.

**ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ ПАЦИЕНТА В ОПЕРАЦИОННОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕПЛО И ТИХО, БОЛЬНОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ УКРЫТ ОДЕЯЛОМ. НЕДОСТАТОЧНОЕ СОГРЕВАНИЕ БОЛЬНОГО ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДЛИНЯЕТ ПЕРИОД ПРОБУЖДЕНИЯ БОЛЬНОГО И МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЯДА ОСЛОЖНЕНИЙ**



**Ингаляционная общая анестезия** — распространенный вид общей анестезии. Она достигается введением в организм летучих или газообразных анестетиков. Собственно ингаляционным можно назвать только тот метод, когда больной вдыхает анестетик при сохраненном спонтанном дыхании. Если же ингаляционный анестетик вводят в легкие принудительно, то это инсуфляционный метод. В связи с отсутствием принципиальной разницы в механизме развития общей анестезии при этих методах их объединяют под общим названием «ингаляционная общая анестезия».

Спектр ингаляционных анестетиков в современной анестезиологии включает такие средства как Галотан, Метоксифлуран, энфлуран, Изофлуран, Десфлуран, Севофлуран, закись азота. Эфир и хлороформ из-за выраженной токсичности и огнеопасности сегодня являются историей анестезиологии.

# **Масочный способ**


Масочный способ применяют, главным образом, у больных без выраженных нарушений дыхания, сердечно-сосудистой системы и функций паренхиматозных органов. Он может использоваться при операциях, не требующих значительной релаксации мышц и создания положения, затрудняющего вентиляцию лёгких. Длительность операции не должна превышать 30-40 минут. Кроме того, масочные анестезии широко применяются у детей как в качестве индукции в наркоз, так и при кратковременных хирургических вмешательствах.



**Капельный и аппаратный способ введения**



**Рис. 8.9. Каркасная маска.**



**Рис. 8.10. Аппаратно-масочный способ.**

# **Неингаляционный наркоз**


Класс неингаляционных средств для общей анестезии по количеству объединяемых им групп фармакологических агентов значительно превосходит класс ингаляционных анестетиков: гипнотики, анальгетики, психотропные (транквилизаторы, нейролептики) средства.

В идеале эти средства должны обладать качествами, которые позволили бы внутривенной анестезии по своей управляемости и безопасности превзойти ингаляционную:

- быстрой наступления эффекта (в течение минут или даже менее);
- обеспечивать достаточную глубину анестезии;
- широтой терапевтического действия;
- минимальной токсичностью и безопасностью применения;
- легкостью введения (т.е. низкой вязкостью), безболезненностью инъекции и отсутствием повреждающего действия на эндотелий сосудов;
- возможностью использования для поддержания анестезии в режиме титрования;
- быстрым и полным восстановлением пациента после анестезии.

# *Используются препараты:*

- Кетамин
- Барбитураты
- Пропофол
- Оксибутират натрия
- Бензодиазепины



# **Комбинированные методы общей анестезии**

Под комбинированным фармакологическим воздействием понимают влияние на организм нескольких ЛС, введенных одновременно или в определенной очередности и временной последовательности.

Комбинации ЛС применяют с целью достижения наиболее выраженного лечебного эффекта, воздействия на различные органы и системы регуляции в организме, уменьшения отрицательных побочных эффектов применяемых препаратов, коррекции основного лечебного эффекта. Сказанное в полной мере можно отнести к комбинированной общей анестезии, когда анестезиолог, выбирая то или иное сочетание средств для проведения общей анестезии, решает несколько задач, обеспечивая:

- выключение сознания (гипнотический эффект);
- аналгезию;
- арефлексию;
- мышечную релаксацию (тогда, когда это необходимо).

Комбинация ингаляционных, неингаляционных анестетиков, наркотических аналгетиков и миорелаксантов является популярным сочетанием в анестезиологии. Рациональный выбор ЛС для общей анестезии позволяет минимизировать отрицательные стороны каждого из них, за счет уменьшения дозы и взаимного потенцирования.

- **СХЕМЫ:** *барбитураты, закись азота, Фторотан, наркотический аналгетик Промедол, Фентанил), релаксант.*

*Барбитураты, закись азота, Метоксифлюран.*

*Кетамин, Диазепам, Фентанил, закись азота.*


В последние годы все чаще стали применять современные методы комбинированной анестезии: *Пропофол, Фентанил (Ремифентанил), закись азота, релаксант.*

# Местная анестезия

- - может вызываться химическими и физическими факторами.  
К **химическим факторам** относится использование местноанестезирующих препаратов. В зависимости от способа введения местноанестезирующего препарата различают:
- 1. Поверхностную (терминальную, аппликационную),
- 2. Инфильтрационную
- 3. Регионарную анестезию.
- стволовая,
- плексусная,
- внутрикостная,
- внутривенная,
- внутриартериальная,
- ганглионарная (зпидуральная и субарахноидальная анестезия).
- К **физическим факторам** относится охлаждение области предполагаемой операции или повреждения льдом или хлорэтилом.

- **Преимущества местной анестезии:**
- а) безопасность;
- б) простота методики (не требуется участия других лиц, наличия сложной аппаратуры);
- в) дешевизна.
- **Недостатки:**
- а) невозможно управлять функциями организма при обширных травматических операциях, особенно на органах грудной полости;
- б) трудно произвести ревизию при операциях на органах брюшной полости, так как нет расслабления мускулатуры;
- в) не всегда можно добиться полного обезболивания (операции в области рубцово измененных тканей и др.);
- г) у больных с неустойчивой психикой нежелательно сохранение сознания во время операции.

- В клиническом течении всех видов местной анестезии выделяются следующие **стадии**:
- 1) введение анестезирующего вещества;
- 2) выжидание (действие анестезирующего вещества на нервные элементы тканей);
- 3) полное обезболивание;
- 4) восстановление чувствительности.



## • ПОВЕРХНОСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- Поверхностная, или терминальная, анестезия возможна только при операциях и манипуляциях на слизистых оболочках, которые смазывают или орошают раствором анестетика. Поэтому этот метод в основном применяется в офтальмологии, отоларингологии и урологии.
- Для анестезии используют 0,25—3% растворы дикаина, 5% раствор ксикаина, 10% раствор новокаина. Для поверхностной анестезии кожи применяют метод замораживания хлорэтилом.
- В хирургической клинике поверхностная анестезия наиболее часто применяется при бронхологических исследованиях (бронхоскопия, бронхография, бронхоспирометрия) и лечебных процедурах (эндотрахеальные вливания лекарственных веществ), а также эзофагоскопии, гастроскопии и дуоденоскопии.

## • ИНФИЛЬРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ

- Всеобщее распространение получил метод инфильтрационной анестезии по А. В. Вишневскому. В основе его лежит послойная тугая инфильтрация тканей с учетом распространения раствора новокaina по фасциальным футлярам — «тугой ползучий инфильтрат».
- Используются слабые растворы новокaina — 0,25 и 0,5% растворы до 1 и более литра на операцию, причем большая часть раствора вытекает при разрезе, что предупреждает интоксикацию.

Инфильтрационная анестезия по методу А. В. Вишневского включает следующие этапы:

- внутрикожная анестезия по линии разреза с помощью тонкой иглы с образованием «лимонной корочки»;
- тугая инфильтрация подкожной клетчатки;
- после разреза кожи и подкожной клетчатки введение новокaina под апоневроз;
- после рассечения апоневроза инфильтрация мышц;
- после вскрытия брюшной полости инфильтрация париетальной брюшины.
- При анестезии по А. В. Вишневскому «операция идет при постоянной смене ножа и шприца. Наряду с полным обезболиванием, тугой ползучий инфильтрат обеспечивает и гидравлическую препаровку тканей.

# Регионарная анестезия

- Достоинства регионарных методов анестезии
  - 1. Надёжная интраоперационная анестезия за счёт фармакологического контроля боли на спинальном или периферическом уровне.
  - 2. Эффективная вегетативная блокада с минимальным влиянием на гомеостаз, эндокринно-метаболическая стабильность, предотвращение патологических рефлексов из операционного поля.
  - 3. Возможность использования управляемой седации различной степени, а не выключение сознания, что обязательно при проведении общей анестезии.
  - 4. Сокращение восстановительного периода после анестезии, повышение комфортности послеоперационного периода (отсутствие тошноты, рвоты, снижение потребности в наркотиках, раннее восстановление ментальной функции и двигательной активности).
  - 5. Снижение частоты послеоперационных лёгочных осложнений, более быстрое восстановление функции желудочно-кишечного тракта по сравнению с тем, что происходит после комбинированной общей анестезии.
  - 6. Уменьшение риска возникновения тромбоза глубоких вен голени (ТГВГ) и тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА).
  - 7. Сохранение контакта с пациентом во время операции.
  - 8. После ортопедических и травматологических вмешательств, выполняемых в условиях регионарной анестезии, оптимизированы условия для иммобилизации повреждённой конечности.
  - 9. Ещё более значимым представляется преимущество регионарной анестезии в акушерстве: роженица психологически присутствует при родах в условиях полной аналгезии, отсутствует депрессия плода, возможен ранний контакт матери и новорожденного.
  - 10. Регионарная анестезия исключает риск развития злокачественной гипертермии, триггером которой являются релаксанты и ингаляционные анестетики.
  - 11. Регионарная анестезия обладает меньшим потенциалом индукции системной воспалительной реакции и иммунодепрессивным эффектом по сравнению общей анестезией.
  - 12. Экологическая целесообразность применения регионарной анестезии – снижение «загрязнения» операционных.
  - 13. При использовании регионарной анестезии отмечено статистически достоверное укорочение сроков пребывания больных в ОИТ и длительности госпитального лечения.
  - В целом следует отметить, что широкое применение регионарной анестезии позволяет на рациональной основе ограничить «всепоказанность» комбинированного эндотрахеального наркоза и избежать тем самым нежелательных последствий этого метода.

# Основные методы регионарной анестезии


- **Периферические блокады:**

- Проводниковая анестезия
- Стволовая анестезия
- Анестезия сплетений
- Внутрикостная\*
- Регионарная внутривенная\*

- **Центральные сегментарные блокады:**

- Субарахноидальная (спинальная, субдуральная)
- Эпидуральная (перидуральная)
- каудальная;
- люмбальная;
- торакальная

\*внутрикостная и внутривенная регионарные анестезии практически не применяются и представляют в настоящее время лишь исторический интерес.

- 
- Для регионарной анестезии действует принцип: чем проксимальнее, тем эффективнее, чем дистальнее, тем безопаснее  
(Гилева В.М., 1995).

- **Местные анестетики**, используемые для регионарной анестезии .
- **Лидокаин (лигнокайн, ксилокайн)** - является своего рода стандартом, с которым сравнивают остальные анестетики. Лидокаин обладает относительно непродолжительным обезболивающим эффектом, средней силой действия и токсичностью. Он широко применяется для периферических блоков и ЭА.
- **Бупивакайн (маркаин, анекаин, карбостезин)** является мощным анестетиком длительного действия. Бупивакайн используют для всех видов регионарной анестезии - периферических и центральных сегментарных блоков. **При выполнении СА маркаин, используемый в виде изо- и гипербарического растворов обладает минимальной локальной токсичностью и на сегодняшний день является препаратом выбора.**
- **Ультракаин (артикаин)** - является препаратом с коротким, как у лидокаина, латентным периодом, достаточно продолжительным действием, сравнимым с бупивакаином. Так же как и бупивакайн, ультракаин может быть применён для всех видов регионарной анестезии.
- **Ропивакайн (наропин)** - применяют для проводниковой (блокада стволов и сплетений) и эпидуральной анестезии. **Сочетание большой анестезирующей активности, низкой системной токсичности и способности вызывать дифференцированную блокаду делают ропивакайн препаратом выбора в акушерской практике и для продленной эпидуральной анестезии в хирургии.**

# **Эпидуральная анестезия.**

- Преимущества:

1. Большая длительность анестезии.

Например: одномоментное введение 2% р – ра лидокаина в эпидуральное пространство обеспечивает длительность анестезии в среднем 90 мин.

2. Возможность проведения послеоперационной аналгезии.

По эпидуральному катетеру можно вводить для послеоперационной аналгезии опиоиды и местные анестетики.

3. Меньшая выраженность гипотензивной реакции.

Это преимущество более отчетливо проявляется, если была выполнена катетеризация эпидурального пространства.

- Недостатки.

1. Опасность внутрисосудистого введения.

2. Опасность субарахноидального введения.

3. Удлинение времени между индукцией и началом операции.

4. Технические трудности. Просвет эпидурального пространства составляет приблизительно 5 мм, и требуются хорошие мануальные навыки для его идентификации. Пункция твердой мозговой оболочки (встречается в 1 – 3% случаев) приводит к сильным постпункционным головным болям. Частота неадекватной анестезии, по данным разных авторов, составляет 3 – 17 %.

5. **Токсическое влияние анестетика на плод.** Используются сравнительно высокие дозы местного анестетика. Поэтому тонкие физиологические исследования всегда выявляют определенную степень угнетения плода, что ухудшает его адаптацию. Справедливости ради, следует заметить, что при правильно проведенной анестезии клинические признаки угнетения плода выявляются редко.

# **Спинальная анестезия.**

- Достоинства.
  1. При спинальной анестезии проявления системной токсичности препарата встречаются чрезвычайно редко.
  2. Более простое выполнение. Появление спинномозговой жидкости – идеальный ориентир для идентификации положения иглы.
  3. Хорошее качество анестезии. Спинальная анестезия, по сравнению с эпидуральной, дает более глубокую моторную и сенсорную блокаду, что облегчает работу хирурга.
  4. Быстрое начало. После введения анестетика, вмешательство может быть начато через 3 – 4 минуты.
  5. При использовании стандартных дозировок анестетика, спинальная анестезия, по сравнению с эпидуральной, имеет меньшую индивидуальную вариабельность распространенности зоны анестезии.
  6. Спинальная анестезия значительно дешевле эпидуральной и общей анестезии.
- Недостатки.
  1. Гипотензия. Несмотря на профилактические мероприятия регистрируется в 20 – 60% случаев. Ликвидируется введением раствора эфедрина. Продленная спинальная анестезия устраняет указанный недостаток, но высокая стоимость набора, и сложность установки катетера, делают эти методику малодоступной. Из-за большей частоты неврологических осложнений (по сравнению с одномоментной), широкое применение продленной спинальной анестезии в последние годы было приостановлено в ряде развитых стран.
  2. Ограниченнная длительность. Как уже говорилось, длительность анестезии после однократного введения лидокаина составляет 60 – 70 минут, что иногда действительно недостаточно и требует дополнительных методов обезболивания. Бупивакаин действует более 2 часов. Этого времени вполне достаточно для вмешательства.
  3. Постпункционная головная боль. При использовании игл малого диаметра (от 22 калибра и выше - 0,6 – 0,3 мм), частота возникновения постпункционной головной боли сопоставима с частотой аналогичного осложнения при эпидуральной анестезии, и составляет приблизительно 1 – 2%.

# *Список использованной литературы*

- Сумин С.А., Руденко М.В., Бородинов И. М. Анестезиология и реаниматология. 2009г. Москва.
- <http://studentmedic.ru>
- <http://onarkoze.ru>