

ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ

В амбулаторной стоматологии часто встречаются тяжелые токсико-аллергических реакций (**ОТАР**), которые развиваются у лиц молодого, трудоспособного возраста

Смертность от этих осложнений в амбулаторной практике составляет **20—70%**

Наиболее частой причиной возникновения **ОТАР** является применение **лекарственных** препаратов для санации **полости рта** (лечение и удаление зубов, заболеваний слизистой оболочки полости рта)

Риск развития **аллергии** на лекарство составляет **1-3%**

возникновение аллергических реакций зависит от вида препарата, его **химической структуры**, особенностей **биотрансформации**, при которой возникают высокореактивные и аллергенные **метаболиты**. Аллергенность метаболитов связана с их способностью образовывать **иммуногенные** и **аллергенные комплексы** с **Б**, **гликолипопротеидами** и другими молекулами в организме

имм **КОМПЛ** **Ы** нием
определен **ипа**. Гены, ответственные за аллергию, определяют **IL-4** и других цитокинов, участвующих в аллергических процессах. У больных **снижен** уровень **супрессорных** клеток иммунной реактивности и имеется **высокий уровень IgE** в сыворотке крови. Прием **лекарственных препаратов из разных групп**

Длительное применение лекарств обуславливает усиленную стимулирующую **С** новыми дозами иммуногена. Это ведет к увеличению синтеза **АТ** и возрастанию **клеточной сенсibiliзации** и может служить причиной **перехода** иммунной реакции в **аллергическую**

- **вирусные инфекции** и другие заболевания

Большинство лекарственных средств являются веществами, чуждыми организму, **ксенобиотиками**, от которых организм стремится избавиться тем или иным способом

На **уровне** участвующее в **пластическом** или **энергетическом** обмене) вещество, с **расходом** попавшее во внутреннюю среду организма **множественной лекарственной устойчивости**

На **уровне целостного организма** **защита** от **ксенобиотиков** осуществляется за счет их **метаболического** изменения, **превращения** в **водорастворимую** форму и выведения

Очень **небольшое** **число** лекарств может **сенсibilизировать** организм непосредственно, быть **иммуногенным** в нативном виде

Это прежде всего различные **белковые** и **полипептидные** препараты

В лекарственных препаратах имеются **консерванты**, **стабилизаторы** и **примеси**, которые могут индуцировать аллергию

В большинстве случаев вводимые **ксенобиотики** при попадании в организм сами по себе не способны связаться с белковой молекулой организма-хозяина. Они являются **прогаптенами** и превращаются в **гаптены** (только в процессе метаболических изменений), которые способны превратиться в **полноценный АГ** соединившись в комплекс **гаптен-носитель+белок** организма-хозяина

Главным местом, где осуществляется **метаболизм ксенобиотиков**, является печень. На первом этапе при помощи фермента, относящегося к системе цитохромов **P 450**, происходит **включение** в молекулу **ксенобиотика** функциональных групп или их демаскирование

Эта фаза метаболизма может происходить и внепеченочно

В возникновении патологических реакций внепеченочному окислению принадлежит **важная роль**

Фагоциты могут метаболизировать **ксенобиотики** в коже, легких, КМ и пр. Многие из них (**МФ**, клетки Лангерганса) являются и **АПК**, поэтому вероятность активации соответствующих **T-лф** значительно возрастает

Вторая фаза метаболизма ксенобиотиков заключается в **конъюгации** метаболитов первой фазы. При этом образуются **водорастворимые** соединения, которые легко удаляются из организма. Они редко способны вызывать сенсibilизацию. Однако наличие **генетического полиморфизма** в этом звене способно оказывать влияние на протекание первой фазы метаболизма и тем самым способствовать возникновению аллергии

Соединение **гаптена** с соответствующими **белками** **организма** делает их **иммуногенными** несколькими путями:

ИО формируется на **гаптен**, **независимо** от того **белка-носителя**, с которым он связан

иногда **гаптен** может даже **непосредственно** соединяться с молекулой **МНС** и в таком виде представляться **ТКР**

обнажение **скрытых** **АГ** **детерминант**, появляющихся вследствие **конформационных** изменений **белковой** **молекулы** после ее соединения с **гаптенем**

Для развития **ИО** недостаточно сигнала, поступающего после взаимодействия **ТКР** с комплексом **МНС-пептид**

необходимы дополнительные активационные сигналы от **ко-рецепторов** на **АПК** через взаимодействия **CD40-CD40L, CD28-CD80/86**

от рецепторов для **ИЛ-1, 6, ФНО α**

ИЛ продуцируются **АПК, кератиноцитами, ЭЦ** и другими клетками в ответ на воздействие различных **бактериальных и вирусных** продуктов, **повреждение** тканей **раздражающими** химическими веществами, ультрафиолетовое облучение и прочие причины, несущие угрозу организму

Указанные **сопутствующие факторы** могут способствовать возникновению **сенсibilизации** организма к вводимому лекарственному средству

Тип **ИО**, **ГИО** или **КИО**, во многом определяется химическими и физико-химическими **свойствами ксенобиотика**, **местом** его поступления, путями **деградации**, а также **сопутствующими факторами**

От этого зависит в контексте какого класса молекул **МНС** будет презентироваться новый **АГ**

жирорастворимые ксенобиотики проникают сквозь клеточную мембрану, метаболизируются и активные метаболиты соединяются с **клеточными белками**.

Образовавшийся **комплекс** лизируется в протеосомах и экспрессируется на клеточной поверхности с **МНС I класса**, который распознается **CD8+ Т-лф**, индуцирующими **цитотоксическую** реакцию

если комплекс **гаптен-белок** образуется вне клетки, то он поглощается **АПК** и расщепляется до пептидов в лизосомах, после чего пептиды представляются с **МНС II класса**, распознаются **CD 4+ Лф** и индуцируют **Th** ответ

В зависимости от **цитокинового** сопровождения и сопутствующих "сигналов опасности", исходящих от окружающих тканей, активируется один из субтипов **Th**:

цитокины, продуцируемые при активации **Th2** (**ИЛ-4, 5, 10** и **13**), способствуют выработки **АТ IgE** типа, что ведет к развитию аллергической реакции **немедленного** типа

Th1 вырабатывают **ИЛ-2, ФНО α , Иф γ** , формирующие **КИО**, и реакции **замедленного** типа

часто индуцируются **оба** типа **Th**, так что аллергическая реакция оказывается **смешанной**

Лекарства-гаптены могут **являются** **иммуномодуляторами**. Препарат проявляет свои аллергенные свойства, не только образуя иммуногенный конъюгат (**гаптен**), но и нарушая **иммунорегуляцию**. Уменьшая продукты одних антиклонов клеток увеличивают, гиперпродукцию других, что в итоге приводит к **аллергическим** реакциям

Мишенью иммуномодулирующего действия лекарств могут быть:

I. **Рецепторы** клеток иммунной системы:

- **Fas**-молекула. Подавление апоптоза приводит к пролиферации **аллергенспецифических** или **аутореактивных** клонов **Лф** и к развитию **аллергии** или **аутоиммунных** реакций
- **CD3, CD4, CD8, CD28** и другие рецепторы **Th1** и **Th2** типа
- **TCR**
- **BCR, Ig** и адгезивные молекулы (**IgM, IgD, CD40, CD1d**)
- **МФ** – усиливают их активность и повреждают **гаптен-несущие клетки**

- **НК** - модулируют активность НК, изменяя спектр продуцируемых цитокинов

II. **Цитокины** и их **рецепторы**: ИЛ-1 – ИЛ-17, ИФ, ФР и др.

III. **Внутриклеточные** регуляторные **ферменты**: протеиназы, эндонуклеазы, киназы, каспазы, тирозинкиназы, АЦ и др.

IV. **Сигнальные регуляторные Б** SIRP (**S**ignal **R**egulatory **P**roteins), выполняющие роль негативных корецепторов

V. **Клеточный геном** и механизмы его регуляции

Действие лекарств на эти структуры может быть **блокирующим** (для рецепторов), **комплекс-образующим** (цитокины, ферменты и др.) или **активирующим**

К препаратам **подавляющим синтез медиаторов**, относятся **КС**:

тормозят образование **5-НТ** и **5-ОТ** и активацию системы **кининов**

стимулируют **β 2**-адренорецепторы, что обеспечивает стабилизацию клеточных мембран

снижают активность **КОМТ**, способствуя этим увеличению уровня эндогенных катехоламинов

блокируют рецепторы для ключевого **С3-компонента** системы комплемента на поверхности **МФ**, ослабляя таким путем цитотоксические реакции (**II тип**)

угнетают **ФЛ А2** клеточных мембран, **ограничивая** высвобождение **арахидоновой кислоты** и образование ее метаболитов (тромбоксанов) - медиаторов аллергии немедленного типа

препятствуют взаимодействию **рецепторов клетки с IgE**, этим предотвращается каскад реакций, приводящих к освобождению медиаторов аллергии


уменьшают активность **АТФазы** и **ГЦ**, снижая этим **α**-адренергическую стимуляцию и потенциально **увеличивая** активность **β2**-адренорецепторов

подавляют активность **гиалуронидазы**, тем самым уменьшая проницаемость сосудов и отек тканей


ГЛЮКОРТИКОИДЫ



Торможение
пролиферации



Торможение
выработки



Торможение
фагоцитоза

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Пищевую аллергию относят к одному из видов **побочных реакций** на пищу, в основе которых лежат **иммунологические механизмы**

Распространенность пищевой аллергии у детей **1 года** жизни составляет **6-8%**, снижаясь к **подростковому**

Побочная реакция на пищу — совокупность любых **клинических** симптомов, возникающих в связи с употреблением **пищевых** продуктов

развития **сенсibilизацией**, оказывает огромное влияние на формирование и последующее развитие всех аллергических заболеваний у детей

может вызвать подавление ответа на **пищевые АГ** через образование **ингибирующих** цитокинов (**ТФР- β** , **ИЛ-4**, **ИЛ-10**). Индуцированные **регуляторные** Т-клетки

основной механизм, характеризующийся **снижением пролиферации Т-клеток** в ответ на презентацию **АГ АПК**, поскольку в пищеварительном тракте могут отсутствовать **костимулирующие** факторы для реализации **ИО**

- **Т-клетки** **энергис**
- **индукцией регуляторных Т-клеток**

Пищевая аллергия формируется на **АЛ**, содержащиеся в пищевых продуктах. Ими являются **белки** (гликопротеиды с молекулярной массой от 18000 до 40 000 дальтон), реже – **полипептиды**, **гаптены**, которые соединяются с белками пищи

При пищевой аллергии роль **АЛ** выполняют пищевые вещества или продукты их расщепления, взаимодействующие с **АТ**. Любой пищевой продукт может быть **АЛ**

Факторы, участвующие в развитии пищевой аллергии:

- **генетическая** предрасположенность к развитию аллергических заболеваний у носителей **АГ HLA B8** и **DW3**
- поступление **АТ** в организм во **внутриутробном** периоде и через женское молоко
- **продолжительность** **естественного** **вскармливания**
- природа **АЛ**, его дозы, частоты введения
- **возраст** ребенка при первом контакте с **АЛ**

важнейшим условием развития пищевой аллергии является нарушение **пищеварительного барьера**. Нарушения органов пищеварения, сопровождающиеся **снижением** **полостного**, **мембранного** и **внутриклеточного** пищеварения, приводят к **скоплению** большого количества не гидролизованных **пищевых** **субстанций**, к **повреждению** **слизистой** кишечника, **угнетению** синтеза **IgA** и **повышенной** проницаемости **эпителия** кишечника, что способствует **проникновению** **АГ** в кровотоки. В развитии патологического процесса могут принимать участие **IgE-опосредованные** и **ИК** реакции, а также **ГЗТ**

По механизмам развития:

- **IgE-зависимая** пищевая аллергия
- **IgE-независимая** пищевая аллергия
(Т-клеточно-опосредованная, **ИК**
IgG-IgA-опосредованная)

Развитие **IgE-опосредованных** аллергических реакций на пищевые **АЛ** связано с изменением соотношения **Th1/Th2** в сторону преобладания **Th2**, синтеза этими клетками **ИЛ-4, ИЛ-13** и последующей **гиперпродукции** антигенспецифических **IgE**

IgE-ЗАВИСИМАЯ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Когда пищевые **АЛ** проникают в слизистые оболочки и **связываются** с **IgE-АТ** на **ТК** или **Б**, эти клетки выделяют медиаторы, **вызывающие** симптомы **ГНТ**: вазодилатацию, спазм гладкой мускулатуры, секрецию слизи

аллергенспецифические IgE-АТ связываются с **высокоаффинными** рецепторами **FcεRI** на **ТК** и **Б** и с **низкоаффинными** рецепторами **FcεRII (CD23)** на **МФ**, **МЦ**, **Лф**, **Э** и **Тр**

каждое попаданием **пищевое АЛ** стимулирует **моноклеары** к секреции **5-НТ-рилизинг-фактора**, который усиливает выработку **5-НТ Б** и **ТК**

В первые 4-8 ч Н и Э инфильтрируют место реакции и **активируются**, выделяя другие медиаторы (эозинофильный катионный протеин, пероксидазу, ФАТ и др.)

В последующие 24-48 ч развивается **поздняя** стадия аллергического **воспаления**

По типу сенсibilизации:

- 1 тип** возникает вследствие **пероральной сенсibilизации** пищевыми **АЛ**, **устойчивыми** к воздействию секретов пищеварительного тракта (характерен для **детей**)
- 2 тип** возникает вследствие сенсibilизации к **аэроаллергенам** у **взрослых** с аллергией к пыльце растений при употреблении **продуктов растительного** происхождения (так называемый **пыльцево-пищевой синдром**)

ИНСЕКТНАЯ АЛЛЕРГИЯ



Инсектная аллергия – комплекс аллергических реакций, полученных человеком вследствие **укусов** насекомых. Причиной инсектной аллергии может стать и **вдыхание** частиц тел насекомых или продуктов их жизнедеятельности. Они опосредуются **АТ IgE и IgG**

На **ужаления перепончатокрылыми** насекомыми (осы, пчелы, шершни, шмели, муравьи) развиваются **аллергические реакции**

Яд перепончатокрылых насекомых содержит **меллитин, апамин, фосфолипазы, гиалуронидазу, кинины, 5-НТ, 5-ОТ** и другие биогенные амины, способные вызывать **расширение** сосудов и **повышение** их проницаемости, **боль**

Пептиды и фосфолипазы обладают **токсическими** свойствами

Ферменты и высокомолекулярные пептиды могут обуславливать развитие **аллергических реакций**

Биологическое воздействие яда на организм
интегративный эффект четырех видов токсического
действия:

геморрагического

гемолитического

нейротоксического


гистаминоподобного

Аллергические реакции на укусы

перепончатые
специфические
немедленные

Редко аллергические
случае реакции
феномена
инфильтрация
сыворотки
васкулита

Все реакции
СИСТЕМНЫЕ



при **местной** аллергической реакции отек и покраснение в месте укуса. Наблюдается сильный зуд

СИСТЕМНЫЕ аллергические реакции
выявляются у **0,8-5%** пациентов:

при **легкой степени** наблюдаются генерализованная сыпь, зуд, недомогание, беспокойство

при присоединении ангионевротического отека, головокружения или боли в сердце, животе, диспептических явлений реакция расценивается как **среднетяжелая**

при **тяжелой** степени поражения отмечаются диспноэ, дисфагия, охриплость голоса, отек гортани, бронхоспазм, чувство надвигающейся опасности

Анафилактический шок

развивается спустя несколько секунд или минут после ужаления: наблюдаются удушье, тошнота, рвота, падение АД, коллапс, цианоз, потеря сознания, недержание мочи и кала

Аллергические реакции на укусы кровососущих насекомых

К кровососущим насекомым относятся представители отряда двукрылых: комары, мокрецы, мошки, москиты, слепни. Хищный образ жизни ведут самки

Слюна кровососущих содержит токсические, анестезирующие и противосвертывающие вещества

В клинической картине аллергических реакций на укусы преобладают местные изменения. Их характер приближается к *иммунокомплексному* или *замедленному* типу. Возникает на высокомолекулярный белок F

Реакция **реагинового** типа встречается реже. Возникает вслед за укусом в виде нарастающего обширного плотного отека, сопровождается сильным зудом

Общие реакции, как правило, **не тяжелые**, проявляются генерализованной уртикарной сыпью (иногда сливной), отеками типа Квинке, бронхоспазмом. Общие аллергические реакции чаще наблюдаются от укусов **комаров** и **клопов**