

Лекарственные препараты, влияющие на дыхательную систему.

ПЛАН:

1. Классификация препаратов при кашле.
2. Противокашлевые препараты, определение.
3. Классификация противокашлевых препаратов.
4. Противокашлевые центрального действия.
5. Противокашлевые периферического действия.

- **Препараты при кашле:**
- 1. Противокашлевые препараты
- 2. Отхаркивающие препараты
- 3. Муколитики

2.

Противокашлевые препараты

- при кашле непродуктивном или способствующем ретроградному движению секрета вглубь легких (хронический бронхит, эмфизема, муковисцидоз, а также при рефлекторном кашле).

3. Классификация противокашлевых препаратов:

- 1. Препараты центрального действия:
 - наркотические (препараты кодеина, дексстрометорфана);
 - ненаркотические (бутамират, окседадин).
- 2. Препараты периферического действия (либексин и др).

4. Противокашлевые центрального действия.

4.1 Комбинированные препараты кодеина

Основное фармакологическое действие - угнетение кашлевого центра, что позволяет быстро купировать приступы кашля.

**Нельзя употреблять одновременно
препараты, направленные на
разжижение мокроты и увеличение
её объема и противокашлевых.**

Показания к применению:

симптоматическое лечение сухого кашля любой этиологии при бронхолегочных заболеваниях.

Побочные действия:

аллергия (кожный зуд, крапивница), тошнота, рвота, запоры, головная боль, сонливость.

При длительном применении - развитие лекарственной зависимости к кодеину.

Противопоказания:
дыхательная недостаточность;
бронхиальная астма;
беременность и кормление
грудью;
детский возраст до 2 лет;
прием алкоголя.

Коделак

- кодеин + натрия гидрокарбонат +
солодки корни + термопсиса трава
- Форма выпуска: таблетки №10
(по 1 табл. 3 раза).



Коделак фито

- Элексир 100, 125 мл.
- кодеина фосфата, термопсиса экстракт, чабреца экстракт жидкий, солодки экстракт
- обладает противокашлевым, отхаркивающим и противовоспалительным, болеутоляющим действиями.



Терпинкод

- Кодеин + Натрия гидрокарбонат + Терпингидрат
- Форма выпуска: таблетки №10 (по 1 табл. 3 раза)



Комбинированные препараты дектрометорфана

Показания:

- **Острые и хронические заболевания органов дыхания, сопровождающиеся сухим раздражающим кашлем.**

Побочные действия:

- **Сонливость, тошнота, головокружение, зуд, крапивница.**

- **Противопоказания:**
- **Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата; бронхиальная астма; беременность, период лактации.**
С осторожностью — нарушения функции печени.

Гликодин

- + терпингидрат + левоментол
- Форма выпуска: сироп 100 мл (по 5-15 мл 3-4 раза в день)
- *Детям с 1 года*



Туссин Плюс

- Состав: гвайфенезин + декстрометорфан
- Форма выпуска: сироп 100 мл (по 5-15 мл 3-4 раза в день)
- *Детям с 6 лет*



totalrating.ru

4.2

Ненаркотические противокашлевые препараты.

Отличие от наркотических препаратов:

- не вызывают лекарственной зависимости, привыкания**
- не угнетают дыхание**
- не влияют на ЖКТ**

Бронхолитин

- **Состав:** глауцин + эфедрина гидрохлорид
- **Форма выпуска:** сироп 125 мл (по 1 ст. л. 3 раза)
- **Побочные действия:** повышение АД, головокружение, тошнота, возбуждение ЦНС, бессонница
- **Противопоказания:** гипертония, ИБС, бессонница, **дети до 3 лет**



Окселадин

Синонимы: Пакселадин, Тусупрекс



- **Форма выпуска:** таблетки 0,01 и 0,02 (по 1 табл. 3 раза); капсулы 0,04; сироп 125 мл
- **Противопоказания:** беременные, кормящие, дети до 2 лет.

Бутамират

Син.: Синекод

- **Форма выпуска: табл., драже; сироп, капли 10 мл (10 капель на прием)**
- **Побочные действия:** головокружение, зуд, диспепсия
- **Противопоказания:** беременные I триместр, дети до 2 месяцев.



Стоптуссин

Бутамират + Гвайфенезин



Форма выпуска: капли для приема внутрь, таблетки (после еды)

**Противопоказания: миастения;
дети до 12 лет — для таблеток,
дети до 6 мес — для капель;
I триместр беременности;
период лактации.**

5. Противокашлевые препараты периферического действия

**Препараты периферического действия
влияют на афферентный или на
эфферентный этапы кашлевого
рефлекса, или на оба звена.**

**Назначение показано при
большинстве заболеваний верхнего
отдела дыхательных путей (ОРВИ,
синуситы, фарингиты) и нижних
дыхательных путей (бронхиты,
бронхиолиты, пневмонии).**

Либексин

- Ф.в.: табл. 0,1 № 20 (по 1 табл. 3 раза)
- **Непродуктивный кашель любого происхождения**
- С осторожностью: детский возраст, при беременности и кормлении грудью.
- Побочные действия: аллергические реакции, диспепсия, утомляемость.

Фалимант

- драже 0,25 № 20. (держать в полости рта до полного рассасывания) не более 10 драже.
- **Воспалительные заболевания:**
- дыхательных путей (фарингит, ларингит).
- полости рта (гингивит, стоматит).
- рефлекторный кашель непродуктивный.
- при снятии слепков и примерке зубных протезов.
- *при беременности и кормлении грудью: не рекомендуется.*

- К препаратам афферентного действия относят местноанестезирующие средства (бензокаин, циклайн, тетракаин); обволакивающие ЛРС (сборы, сиропы, таблетки для рассасывания (эвкалипт, лакрицы, мед и др.).

Ситуационная задача:

- К вам обратился мужчина с просьбой порекомендовать препарат при сухом, раздражающем кашле, першении в горле. Ваши действия.

Ситуационная задача:

- К вам обратилась молодая мама с просьбой порекомендовать ее 2 летнему ребенку препарат от кашля. Ваши действия.

Домашнее задание:

- Работа со справочной литературой, периодическими изданиями, электронными ресурсами.
- Составление кроссвордов, нозологических карт.