

**ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ
АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚАЗАҚ – ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ**



**HOCA AHMET YESEVI
ULUSLARARASI
TÜRK – KAZAK
ÜNİVERSİTESİ**

Факультет: Медицина

СӨЖ

Тақырыбы: Өлім және оның белгілері. Танатогенез. Өлімнен кейінгі өзгерістер.

Қабылдаған: Досжанов С.

Орындаған: Мейірбек.М

Тобы: Жм- 203(F)

Түркістан-2016



ЖОСПАР:

- **1.Кіріспе.**
- **2.Негізгі бөлім.**
- **Өлім туралы түсінік. Өлім белгілері және өлімнен кейінгі өзгерістер.**
- **Танатогенез.**
- **Өлімнің түрлерінің даму сатылары.**
- **Өлім үрдістері.**
- **Үрдістердің ерекшеліктері және белгілері.**
- **3.Қорытынды.**
- **Адам өмірінің ұзақтығы, өлім тудыратын патологиялық аурулардың себептері.**

◎ **Өлім** организмдегі тіршіліктің
толық тоқтауы

◎ Өлу заңдылықтарын, оның
себептерін және өлімнен
кейінгі өзгерістерді
зерттейтін ілімді
танатология деп атайды.

Адам өлімін бүкіл организмнің өлімі деп қарау керек. Бірақ, әр түрлі зерттеулер арқылы кейбір ағзалардың, тіндердің өз тіршілігін организм өлгеннен кейін де біраз уақытқа дейін сақтай алатындығы анықталған. Осыған байланысты өлген адам ағзаларын, тіндерін трансплантация үшін пайдалану мүмкіншілігі туды. Қазіргі кезде бүйректерді, жүректі өлген адамнан ауру адамға кешіріп отырғызу практикада кең қолданыс алған.



ТАНАТОГЕНЕЗ ИНСУЛЬТА





Өлім түрлері

```
graph TD; A[Өлім түрлері] --> B[Табиғи (физиологиялық)]; A --> C[Патологиялық];
```

**Табиғи
(физиологиялық)**

Патологиялық

◎ ***Табиғи өлім*** адам әбден
қартайып, ағза
қызметтерінің бірте-
бірте әлсіреп барып,
тоқтауымен , тозуымен
байланысты.

Патологиялық өлімді

патологоанатомдар тексереді. Ауру асқынып кеткенде, мысалы, миға қан құйылғанда, жүрек инфарктында, өкпе артериясының тромбоэмболиясында адам кенеттен, кейде бірнеше минуттар ішінде де өліп кетуі мүмкін.

Өлу кезеңдері:

- **Жанталас алды (преагония);**
- **Ақтық үзіліс;**
- **Жанталас (агония);**
- **Клиникалық өлім;**
- **Биологиялық өлім.**

ЖАНТАЛАС АЛДЫ (ПРЕАГОНИЯ)

- кезінде жүрек соғуы мен тыныс алу жиі-леп әлсірейді, артынан сирейді, артериялық қысым қатты төмендейді, санасезім, рефлексстер үдемелі түрде азаяды, үзілісті тыныс дамиды.

АҚТЫҚ ҮЗІЛІС

- ⦿ - Кезінде тыныс алу және жүрек соғуы тоқтайды,
- ⦿ Рефлексстер жоғалады, көз қарашығы кеңейеді.

ЖАНТАЛАС КЕЗЕҢІНДЕ:

**бірнеше тыныстық қозғалыстар (гаспинг тынысы - ақтық дем) пайда болады;
Жүрек соғуы біршама оңалады;
АҚ сәл (20-50 мм с.б. дейін) көтеріледі;
Артынан жүрек соғуы сирейді,
АҚ күрт төмендейді;
Тырыспа-селкілдек дамиды.**

КЛИНИКАЛЫҚ ӨЛІМ кезінде:

- Тыныс алу, жүрек соғуы болмайды;
- Анаэробтық гликолиз сақталған;
- Ми қыртысының бүлінісі әлі қайтымды;
- Кенеттен өлген адамды тірілтіп алуға болады.

БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨЛІМНІҢ АЙҒАҚТЫ БЕЛГІЛЕРІ:

- ДЕНЕНІҢ МҰЗДАУЫ;
- ДЕНЕНІҢ СІРЕСІП ҚАЛУЫ;
- ӨЛІКТІК ДАҚТАР пайда болуы.

● **Өлімнің әрбір сатысының ұзақтығы әр түрлі, мысалы, агония бірнеше минуттан бірнеше сағатқа немесе тәулікке созылуы мүмкін. Клиникалық өлім әдетте 5-6 минуттан соң биологиялық өлімге өтеді. Бұл кезде орталық нерв жүйесінде, кейінірек басқа ағзаларда қайтымсыз өзгерістер дамиды. Осы кезден бастап қана организмді мәйіт деп атауға болады.**

РЕАНИМАЦИЯ - ОРГАНИЗМДІ ТІРІЛТУ

РЕАНИМАЦИЯНЫҢ ҰСТАНЫМДАРЫ:

1. Жүрек жұмысын қалпына келтіру
 - Жүрекке тікелей немесе кеуде сыртынан ысқымақ (массаж) жасау;
 - Дефибрилляция- жүрек етінің жыпылығын жою





Рис. 50.2. Дефибриллятор «Cardio — Aid 100» (фирма «Artema Мес», Швеция, Дания).

Биологиялық өлімнен кейін біршама уақыттан соң өлімнің морфологиялық белгілері және өлімнен кейінгі өзгерістер дамиды. Бұл өзгерістерді анық білу және зерттеу, кейбір жағдайда кездесетін жалған өлімді анықтауда аса қажет. Сол үшін мәйітті клиникада кемінде екі сағат сақтап, өлімнің алғашқы белгілері байқалғанда ғана патологиялық анатомия бөлімдеріне көшіреді.

Өлімнің алғашқы бөлімдері:



◎ Мәйіттің сууы өлгеннен соң организмдегі зат алмасу үрдісінің тоқтауына байланысты. Дене жылуы бірте-бірте азайып, айналадағы температурадан 0,5-1 С төменірек дәрежеге дейін түседі. Орташа есеппен мәйіт температурасы сағатына 1С төмендейтіні анықталған. Бірақ кейбір ауруларда (сіріспе, сепсис, бөртпелі сүзек) мәйіт температурасы бірнеше сағатқа дейін бұрынғыдан да жоғары болуы мүмкін.

- Мәйіттің сіресіп қалуы дене бұлшықеттерінің қатайып, тартылып қалуына байланысты. Бұл өзгерістердің негізінде биохимиялық үрдістер жатады. Тірі организмдегі бұлшықеттердің белгілі бір тонуста тұруы аденозинүшфосфат қышқылының бұлшықеттермен байланысты болуымен түсіндіріледі.



- *Өлгеннен соң АҮФ-тың бір бөлігі бұлшықеттерден бөлініп шығып, оладың 2-4 сағат бойында босап қалуына себеп болады. АҮФ-тың бірте-бірте жойылуына байланысты және сол жерде сүт қышқылының, кальциидің жиналып қалуы себепті бұлшықеттер қайтадан тартылып, сіресіп қалады.*



- Мәйіттің кебуі- өлгеннен кейін денедегі сұйықтықтардың құрғап және буланып кетуінің нәтижесі. Бұл үрдіс өлгеннен соң бірнеше сағаттан соң басталып, терінің шырышты қабықтардың кеуіп қалуына алып келеді. Көздің мөлдір қабығы күңгірттеніп, ақшыл қабығы өзінің реңін жоғалтып, сарғыш-сұр түсті болады. Еріннің шырышты қабығы, терінің жұқа жерлері қатып, бүрісіп, қоңыр-қызыл түс алады.



- **Мәйіттің дақтары өлгеннен соң 2-4 сағаттан кейін пайда болады. Олар мәйіттің төменгі бөліктерінде көкала-қызыл немесе қоңыр-күлгін түсте көрінеді. Қолмен басқанда олардың реңі ақтандақтанып барып аз ғана уақыттан соң өз реңіне қайта кіреді. Бұл белгі мәйіт дақтарын тірі кезіндегі қанталаулардан ажыратуға жәрдем береді.**




**Мәйіттің өз салмағы түсіп
тұрған жерлерде
мәйіт дақтары болмайды.
Жалпы мәйіт дақтарының
орны аурудың өлер кезде қалай
жатқандығына байланысты.**

**Бірінші тәуліктің екінші
жартысында қандағы
эритроциттер гемолизге ұшырап,
плазма қан тамырларынан
шыға бастайды. Осы
плазманың айналадағы
тіндерге сіңу үрдісін
имбибиция деп атайды.**

Признаки смерти :

- 1. Помутнение и высыхание роговицы глаза.
- 2. При сдавливании глаза с боков пальцами зрачок сужается и напоминает кошачий глаз.
- 3. Похолодание тела и появление трупных пятен.
- 4. Трупное окоченение.



ҚАНЫҢ ҚАЙТА БӨЛІНУІ

Өлгеннен соң артерия қан тамырларының қысқаруы нәтижесінде қан көк тамырларына өтеді және өзінің салмағына байланысты дененің төменде жайғасқан бөліктерінде жинала бастайды. Жүректегі және ірі көк тамырларындағы қан ұйып қалады. Егер жанталас дәуірі ұзаққа созылған болса, қан ұйындылары ақшыл-сары түске кіріп, оның құрамы негізінен фибрин жіпшелерінен тұрады, ал ауру тез қайтыс болғанда ұйынды құрамында барлық қан элементтері болғаны үшін оның түсі қызыл болады. Кейбір жағдайларда, мысалы, ауру тұншығып өлгенде (асфиксия) қан тіпті ұйымай сұйық күйде қалады. Осы ұйындылардың түсі өлу механизмін (танатогенезді) анықтаушы морфологиялық белгілердің бірі болып есептеледі.



Зорлық-зомбылық
нәтижесіндегі өлімді **сот**
медицинасы зерттейді.

Әр түрлі аурулар салдарынан
өлу себептерін негізінен
патологоанатомдар
тексереді.

*Өлімнің кейбір белгілеріне
мынадай үрдістер кіреді:*

*Аутол
из*

Шіру

○ **Аутолиз үрдісі**
гидролиздеуші
ферменттер
белсенділігінің
күшеюімен байланысты.
Сол үшін аутолиз
ферменттер көп болған
ағзалардан басталады.
Ұйқы безінде,
бүйрекүсті безінде
бауырда аутолиз үрдісі
басқа ағзаларға
қарағанда күштірек
көрінеді. Асқазан-ішек
жолында өзін-өзі
қорыту құрамында
пепсин, трипсин және
басқа ферменттер бар
асқазан-ішек сөлінің
әсерінде өтеді.



Мәйіттің шіруі осы аутолиз үрдістерінің күшеюімен және оған шіріту бактерияларының әсерінің қосылуымен түсіндіріледі.

Шіру үрдісінің жылдамдығы қоршаған ортаның температурасына байланысты.

Өлгеннен соң шіріту бактериялар тез көбейіп, өздерінен гидролиздеуші ферменттер бөліп шығарады, нәтижеде органикалық заттардың бәрі ыдырай бастайды.

*Тінде
жағымсыз иіс пайда болып,
олар сарғыш-жасыл түске кіреді. Бұл
өзгерістер
тінде күкірт сутегі және басқа
газдардың
пайда болуына байланысты. Күкіртті
сутек гемолизге ұшыраған
эритроциттермен
қосылып темір сульфатын түзелі.
Газ түзуші бактериялар өте көбейіп
кеткенде
газ бүкіл денеге тарап, мәйіт
эмфиземасы пайда болады.*

*Адам өмірінің ұзақтығы
ғалымдардың болжауы
бойынша 160-180 жас, бірақ
көптеген себептерге
байланысты бұл жасқа
жеткелеген адамдар ғана
жетіп отыр.*

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

- **Ж.Ахметов «Паталогиялық анатомия-1»
А.Білім, 2008ж.**
- **Ө.Нұрмұхамбетұлы «Патофизиология»
А., 2007ж.**
- **У.Сайпіл, К.Өмірзақова «Заттар
алмасуы» А., Ғылым. 2004ж.**

**www.google.kz www.google.kz ,
www.rambler.ru, www.google.ru**

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!