

МЕДИКАМЕНТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕКСА



ЛЕГАЛЬНЫЕ

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ

**МЕДИКАМЕНТЫ,
УЛУЧШАЮЩИЕ СЕКС**

ЭРЕКТИЛЬНЫЕ

АНАЛЬГЕТИКИ/АНЕСТЕТИКИ

ПОППЕРСЫ

АНАБОЛИКИ

ДРУГИЕ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

БРЕНДЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

**ВИАГРА,
СИАЛИС,
ЛЕВИТРА**

**ГЕНЕРИКИ
(дженерики)**

ИХ АНАЛОГИ

**ДЖЕНАГРА, ЭРЕКТИЛ,
СУПЕРВИГА,
ПОТЕНЦИАЛЕ**

ВИАГРА Pfizer



- *Силденафила цитрат 100 мг*
 - Оригинальная Viagra Pfizer, производится в США.
 - В фирменной упаковке и с инструкцией на английском языке.



- Действие основано на увеличении притока крови к половому члену.
 - Оно начинается через 30 минут после приема и продолжается по крайней мере 4 часа.
 - Большинство пациентов могут принимать Виагру ежедневно.



ГЕНЕРИКИ ВИАГРЫ



ЛЕВИТРА от Bayer



- *Варденафил 20 мг*
- Левитра - это фирменное название Варденафила
- Действие Левитры подобно Виагре - она тоже увеличивает поток крови к половому члену, помогая достичь эрекции и поддержать ее.
- Начальная доза составляет 10 мг. Принимается за 25—60 минут до сексуального контакта.
- Продолжительность действия Варденафила составляет 4—5 часов.
- Максимальная рекомендованная частота приема препарата — 1 раз в сутки .

ГЕНЕРИКИ ЛЕВИТРЫ





СИАЛИС Eli Lilly

- *Тадалафил 20 мг*
- Оригинальный Cialis Eli Lilly, производства США. Препарат поставляется в фирменной упаковке и инструкцией на английском языке .
- Единственный препарат, который не только действует быстро (эффект наступает в течение 30 минут), но и остается эффективным целых 36 часов, таким образом позволяя выбрать момент, который является правильным для Вас и для вашего партнера.
- Можно принять Сиалис утром и быть готовым на протяжении всего дня, вечером и даже на следующий день.

СИАЛИС - БРЕНД



СИАЛИС - ГЕНЕРИК



НАБОРЫ-ПРОБНИКИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА
ПРЕПАРАТА И ЕГО ДОЗИРОВКИ



- **«ЛОВЕЛАС 21 ВЕКА»:**
 - ДЖЕНЕРИК ВИАГРА СОФТ, 3 ТАБЛЕТКИ ПО 100 МГ,
 - ДЖЕНЕРИК СИАЛИС СОФТ, 3 ТАБЛЕТКИ ПО 20 МГ.



- **«КАЗАНОВА»**
 - ДЖЕНЕРИК ВИАГРА, 2 ТАБЛЕТКИ ПО 100 МГ,
 - ДЖЕНЕРИК СИАЛИС, 2 ТАБЛЕТКИ ПО 20 МГ,
 - ДЖЕНЕРИК ЛЕВИТРА, 2 ТАБЛЕТКИ ПО 20 МГ.

ВИАГРА ГЕЛЬ “НЕДЕЛЬКА”



ВЫПУЩЕНА В ВИДЕ ГЕЛЯ. В ТАКОЙ ФОРМЕ ОНА УСВАИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ И НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ УЖЕ ЧЕРЕЗ 15 - 20 МИНУТ.

УДОБНО ПРИНИМАТЬ, НЕ НУЖНО ЗАПИВАТЬ ВОДОЙ ИЛИ ЖДАТЬ РАССАСЫВАНИЯ ТАБЛЕТКИ, МОЖНО ПРИНЯТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ТЕМИ ЖЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ И СОДЕРЖИТ ТО ЖЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО - СИЛДЕНАФИЛ, КАК И В ОБЫЧНЫХ ТАБЛЕТКАХ.

В УПАКОВКЕ 7 ПАКЕТИКОВ, КАЖДЫЙ СО СВОИМ ВКУСОМ: ВИШНЯ, АПЕЛЬСИН, ЛИМОН, МАНГО, МЯТА, КЛУБНИКА, АНАНАС



ВИАГРА ГЕЛЬ



СИАЛИС ГЕЛЬ

- В упаковке максимальные дозировки препаратов, рассчитанные на больных людей, и если нужна половинка, то все оставшееся пропадет, если Вы не дома

ДАПОКСЕТИН



- 60 мг

- ГЕНЕРИК НОВЕЙШЕГО ПРЕПАРАТА КОМПАНИИ JANSSEN-CILAG - PRILIGY

- Первый препарат, специально предназначен для лечения преждевременной эякуляции.

- Увеличивает длительность полового акта в 3-4 раза.

- Принимают за 1-3 часа до полового акта.

Super P-force



- СИЛДЕНАФИЛА ЦИТРАТ 100 МГ + ДАПОКСЕТИН 60 МГ
- КАЖДАЯ ТАБЛЕТКА СОДЕРЖИТ ОДНОВРЕМЕННО ДВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВА: СИЛДЕНАФИЛА ЦИТРАТ (УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИТОК КРОВИ К ГЕНЕТАЛИЯМ) И ДАПОКСЕТИН, (ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЮ).
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ДЛЯ ПРЕДОВРАЩЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ, ТАК И ПРОСТО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭРЕКЦИИ И ПРОДЛЕНИЯ ОРГАЗМА.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



- Левитра, Виагра или Сиалис увеличивают количество крови, поступающей в половой член, таким образом, препараты помогают мужчине вызвать естественную эрекцию. Активное вещество *варденафил (силденафил или тадалафил, соответственно)*

действует только тогда, когда мужчина испытывает естественное сексуальное возбуждение. Когда половой акт закончен, пенис естественным образом возвращается в расслабленное состояние.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ

- **ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО НА ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭРЕКЦИИ, В ЭТОМ ИХ БЕССПОРНАЯ НОВИЗНА И СЕКРЕТ ОГРОМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ.**
- **НЕ ВЛИЯЮТ НА ЛИБИДО И РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ.**

ПРАВИЛА ПРИЕМА

МОГУТ УСИЛИВАТЬ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ НИТРАТАМИ И ДОНАТОРАМИ ОКИСИ АЗОТА (ИМИ ЛЕЧАТ СТЕНОКАРДИЮ). ПОЭТОМУ ИХ СОЧЕТАТЬ НЕЛЬЗЯ, Т.К. ЭТО ПРИВОДИТ К РЕЗКОМУ, ПОНИЖЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ЛЕТАЛЬНО

НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ В СОЧЕТАНИИ С АНАЛОГАМИ (т.е. друг с другом)

НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ С АНТИРЕТРОВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ БЕЗ СОВЕТА С ВРАЧАМИ (НАПРИМЕР, НЕСОМВМЕСТИМЫ С ИНГИБИТОРАМИ ПРОТЕАЗ ВИЧ, ТАКИМИ КАК ИНДИНАВИР ИЛИ РИТОНАВИР)

ПРАВИЛА ПРИЕМА

ПРИЕМ ПИЩИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА, НО ПРИ ПРИЕМЕ НАТОЩАК ДЕЙСТВИЕ НАСТУПАЕТ БЫСТРЕЕ, А ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ОЧЕНЬ ЖИРНОЙ ПИЩИ - МЕДЛЕННЕЕ.

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В БОЛЬШИХ ДОЗАХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УВЕЛИЧЕНИЮ РИСКА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ. ЕСТЬ ТАКЖЕ ДАННЫЕ ОБ ИНАКТИВАЦИИ АЛКОГОЛЕМ ВИАГРЫ.

НЕ СТОИТ ПИТЬ ГРЕЙПФРУТОВЫЙ СОК, Т.К. ОН ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗРУШЕНИЮ ЭТИХ ПРЕПАРТОВ В ОРГАНИЗМЕ(НАПРИМЕР СИЛДЕНАФИЛА), ЧТО ПРИВОДЯТ К ЕГО НАКОПЛЕНИЮ, А ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО К ПЕРЕДОЗИРОВКЕ.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ РЕДКО, НОСЯТ ОДИНАКОВЫЙ ХАРАКТЕР, УМЕРЕННО ВЫРАЖЕНЫ И НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫ. К НИМ ОТНОСЯТСЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ПРИЛИВЫ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ДИСПЕПСИЯ, ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА, НАРУШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ ЗРЕНИЯ.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ



**ПРЕХОДЯЩЕЕ
ИЗМЕНЕНИЕ
ЦВЕТООЩУЩЕНИЯ С
ПРЕОБЛАДАНИЕМ
СИНИХ ЦВЕТОВ.**

**В ЭТОЙ СВЯЗИ РУКОВОДСТВОМ ОДНОЙ ИЗ
АМЕРИКАНСКИХ АВИАКОМПАНИЙ,
«ВИАГРА» ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ ПРИЕМА
ЗА ЧАС ДО ВЫЛЕТОВ.**

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ



**ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКАХ
ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ
ПРИАПИЗМА
(СТОЙКАЯ БОЛЕЗНЕННАЯ
ЭРЕКЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
ДЛИТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ).
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО
МОГУТ ПРОИЗОЙТИ
НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КАВЕРНОЗНОЙ ТКАНИ ПЕНИСА,
ЧТО ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ
НЕОБРАТИМУЮ ИМПОТЕНЦИЮ**

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- **АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ В ПРОШЛОМ НА ВИАГРУ ИЛИ ЛЮБОЙ КОМПОНЕНТ ПРЕПАРАТА (ЗУД, СЫПЬ, ОТЕК ЛИЦА ИЛИ ГУБ, ОДЫШКА).**
 - **СЕРПОВИДНО-КЛЕТОЧНАЯ АНЕМИЯ, ЛЕЙКЕМИЯ, МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА**
 - **ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА;**
- **РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЛАЗ, НАЗЫВАЕМОЕ ПИГМЕНТНЫМ РЕТИНИТОМ,**
 - **ЯЗВА ЖЕЛУДКА**
- **ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ (НАПРИМЕР, ГЕМОФИЛИЯ).**

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- **ПЕРЕНЕСЕННЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА;**
 - **ПЕРЕНЕСЕННЫЙ ТРОМБОЗ АРТЕРИЙ;**
 - **НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (СТЕНОКАРДИЯ);**
 - **НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ГИПОТОНИЯ;**
 - **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ;**
 - **ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА;**
 - **СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;**
 - **НАРУШЕННОЕ МОЗГОВОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ;**
 - **ИНФАРКТ;**
 - **ИНСУЛЬТ.**

КЕТОНАЛ

ОТНОСИТСЯ К АНАЛЬГЕТИКАМ – УСТРАНЯЕТ БОЛЬ, В ОТЛИЧИЕ ОТ АНЕСТЕТИКОВ, КОТОРЫЕ УСТРАНЯЮТ ЛЮБУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, В Т.Ч. ТАКТИЛЬНУЮ



ЛИДОКАИН

ОТНОСИТСЯ К АНЕСТЕТИКАМ – УСТРАНЯЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



ЙОХИМБИНА ГИДРОХЛОРИД

- РЕГУЛЯТОР ПОТЕНЦИИ
- ОТНОСИТСЯ К АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМ
- АЛКАЛОИД ИЗ КОРЫ ЗАПАДНО-АФРИКАНСКОГО ДЕРЕВА *CORYNANTHE YOHIMBE* И КОРНЕЙ *RAUWOLFIA SERPENTINA*.
- КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК БЕЗ ЗАПАХА.



- ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ТАКИЕ ЖЕ, КАК У ВИАГРЫ И К.

ДЕЙСТВИЕ ЙОХИМБИНА


УЛУЧШАЕТ ЭРЕКТИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ (ВЕРОЯТНО
ВСЛЕДСТВИЕ УСИЛЕНИЯ ПРИТОКА КРОВИ К
ПОЛОВОМУ ЧЛЕНУ И УМЕНЬШЕНИЯ ЕЕ ОТТОКА).
ПОВЫШАЕТ НАСТРОЕНИЕ, МОЖЕТ УСИЛИВАТЬ
ТРЕВОЖНОСТЬ.

ОКАЗЫВАЕТ АНТИДИУРЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
(ВОЗМОЖНО, ЗА СЧЕТ СТИМУЛЯЦИИ
ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ГОРМОНА ЗАДНЕЙ ДОЛИ
ГИПОФИЗА).

НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПСИХОГЕННОЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИМПОТЕНЦИИ - ПО 5–10 МГ
1–3 РАЗА В СУТКИ В ТЕЧЕНИЕ 3–10 НЕД (НЕ
БОЛЕЕ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ КУРС
ПОВТОРЯЮТ.

ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ ПРОСТУДЫ И ГРИППА

СОГРЕВАЮТ, СОДЕРЖИТ АНАЛОГИ ЭФЕДРИНА, И АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ






ТЕСТОСТЕРОН

АНДРОГЕН.

- СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИЮ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ, А ТАКЖЕ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У МУЖЧИН (ГОЛОС, ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ).
- УЧАСТВУЕТ В ФОРМИРОВАНИИ КОНСТИТУЦИИ ТЕЛА И ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ У МУЖЧИН,
 - АКТИВИЗИРУЕТ ЛИБИДО И ПОТЕНЦИЮ, СТИМУЛИРУЕТ СПЕРМАТОГЕНЕЗ.





ТЕСТОСТЕРОН

**ОКАЗЫВАЕТ АНАБОЛИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ, ЧТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ
В СТИМУЛЯЦИИ СИНТЕЗА БЕЛКА,
УМЕНЬШЕНИИ ОТЛОЖЕНИЯ ЖИРА,
ЗАДЕРЖКЕ В ОРГАНИЗМЕ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СИНТЕЗА БЕЛКА
КАЛИЯ, ФОСФОРА, СЕРЫ, УСИЛЕНИИ
ФИКСАЦИИ КАЛЬЦИЯ В КОСТЯХ
И УВЕЛИЧЕНИИ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ.**

**ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ПРИАПИЗМ, ПОВЫШЕННОЕ
ПОЛОВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ, УСИЛЕНИЕ ЛИБИДО
И ЧАСТАЯ ЭРЕКЦИЯ**

**У МАЛЬЧИКОВ — ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОЛОВОЕ
СОЗРЕВАНИЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ РАЗМЕРОВ
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ
ЗАКРЫТИЕ ЭПИФИЗОВ КОСТЕЙ**

ТЕСТОСТЕРОН - ОСЛОЖНЕНИЯ




- ТРОМБОФЛЕБИТ,
- ХОЛЕСТАТИЧЕСКОЙ
ЖЕЛТУХА,

- ПРИАПИЗМ (СМ. ВЫШЕ)

- ОТЕКИ, ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИЯ,
ТОШНОТА, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ,

ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ТАК ЖЕ:



**ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, ЛЕКАРСТВА
ПОКУПАЙТЕ В АПТЕКЕ, ЗНАЙТЕ МЕРУ,
А ЛУЧШЕ НЕ ПРИНИМАЙТЕ ИХ СОВСЕМ**

**БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!**



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**