МЕДИКАМЕНТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕКСА


ЛЕГАЛЬНЫЕ
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ
МЕДИКАМЕНТЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ СЕКС
ЭРЕКТИЛЬНЫЕ
АНАЛЬГЕТИКИ/АНЕСТЕТИКИ
ПОППЕРСЫ
АНАБОЛИКИ
ДРУГИЕ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

БРЕНДЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

ВИАГРА,
СИАЛИС,
ЛЕВИТРА

ГЕНЕРИКИ (дженерики)

ИХ АНАЛОГИ

ДЖЕНАГРА, ЭРЕКТИЛ,
СУПЕРВИГА,
ПОТЕНЦИАЛЕ



ВИАГРА Pfizer

- *Силденафила цитрат 100 мг*
- **Оригинальная Viagra Pfizer, произведится в США.**
- **В фирменной упаковке и с инструкцией на английском языке.**
- **Действие основано на увеличении притока крови к половому члену.**
- **Оно начинается через 30 минут после приема и продолжается по крайней мере 4 часа.**
- **Большинство пациентов могут принимать Виагру ежедневно.**

ГЕНЕРИКИ ВИАГРЫ

ЛЕВИТРА от Bayer

- *Варденафил 20 мг*
- Левитра - это фирменное название Варденафила
- Действие Левитры подобно Виагре - она тоже увеличивает поток крови к половому члену, помогая достичь эрекции и поддержать ее.

- Начальная доза составляет 10 мг. Принимается за 25—60 минут до сексуального контакта.
- Продолжительность действия Варденафила составляет 4—5 часов.
- Максимальная рекомендованная частота приема препарата — 1 раз в сутки .

ГЕНЕРИКИ ЛЕВИТРЫ

СИАЛИС Eli Lilly

- *Тадалафил 20 мг*
- **Оригинальный Cialis Eli Lilly, производства США. Препарат поставляется в фирменной упаковке и инструкцией на английском языке .**
- **Единственный препарат, который не только действует быстро (эффект наступает в течение 30 минут), но и остается эффективным целых 36 часов, таким образом позволяя выбрать момент, который является правильным для Вас и для вашего партнера.**
- **Можно принять Сиалис утром и быть готовым на протяжении всего дня, вечером и даже на следующий день.**

СИАЛИС - БРЕНД

СИАЛИС - ГЕНЕРИК

НАБОРЫ-ПРОБНИКИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА ПРЕПАРАТА И ЕГО ДОЗИРОВКИ

- **«ЛОВЕЛАС 21 ВЕКА»:**
  - ДЖЕНЕРИК ВИАГРА СОФТ, 3 ТАБЛЕТКИ ПО 100 МГ,
  - ДЖЕНЕРИК СИАЛИС СОФТ, 3 ТАБЛЕТКИ ПО 20 МГ.

- **«КАЗАНОВА»**
  - ДЖЕНЕРИК ВИАГРА, 2 ТАБЛЕТКИ ПО 100 МГ,
  - ДЖЕНЕРИК СИАЛИС, 2 ТАБЛЕТКИ ПО 20 МГ,
  - ДЖЕНЕРИК ЛЕВИТРА, 2 ТАБЛЕТКИ ПО 20 МГ.

ВИАГРА ГЕЛЬ “НЕДЕЛЬКА”

ВЫПУЩЕНА В ВИДЕ ГЕЛЯ. В ТАКОЙ ФОРМЕ ОНА УСВАИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ И НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ УЖЕ ЧЕРЕЗ 15 - 20 МИНУТ.

УДОБНО ПРИНИМАТЬ, НЕ НУЖНО ЗАПИВАТЬ ВОДОЙ ИЛИ ЖДАТЬ РАССАСЫВАНИЯ ТАБЛЕТКИ, МОЖНО ПРИНЯТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ ТЕМИ ЖЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ И СОДЕРЖИТ ТО ЖЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО - СИЛДЕНАФИЛ, КАК И В ОБЫЧНЫХ ТАБЛЕТКАХ.

В УПАКОВКЕ 7 ПАКЕТИКОВ, КАЖДЫЙ СО СВОИМ ВКУСОМ: ВИШНЯ, АПЕЛЬСИН, ЛИМОН, МАНГО, МЯТА, КЛУБНИКА, АНАНАС

ВИАГРА ГЕЛЬ

СИАЛИС ГЕЛЬ

- **В упаковке максимальные дозировки препаратов, рассчитанные на больных людей, и если нужна половинка, то все оставшееся пропадет, если Вы не дома**

ДАПОКСЕТИН

- 60 мг

- ГЕНЕРИК НОВЕЙШЕГО ПРЕПАРАТА КОМПАНИИ JANSSEN-CILAG - PRILIGY

- Первый препарат, специально предназначен для лечения преждевременной эякуляции.

- Увеличивает длительность полового акта в 3-4 раза.

- Принимают за 1-3 часа до полового акта.

Super P-force

- СИЛДЕНАФИЛА ЦИТРАТ 100 МГ + ДАПОКСЕТИН 60 МГ
- КАЖДАЯ ТАБЛЕТКА СОДЕРЖИТ ОДНОВРЕМЕННО ДВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВА: СИЛДЕНАФИЛА ЦИТРАТ (УВЕЛИЧИВАЕТ ПРИТОК КРОВИ К ГЕНЕТАЛИЯМ) И ДАПОКСЕТИН, (ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЮ.
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ДЛЯ ПРЕДОВРАЩЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ, ТАК И ПРОСТО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭРЕКЦИИ И ПРОДЛЕНИЯ ОРГАЗМА.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

- **Левитра, Виагра или Сиалис увеличивают количество крови, поступающей в половой член, таким образом, препараты помогают мужчине вызвать естественную эрекцию. Активное вещество *варденафил* (*силденафил* или *тадалафил,* соответственно) действует только тогда, когда мужчина испытывает естественное сексуальное возбуждение. Когда половой акт закончен, пенис естественным образом возвращается в расслабленное состояние.**

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ

- **ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО НА ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭРЕКЦИИ, В ЭТОМ ИХ БЕССПОРНАЯ НОВИЗНА И СЕКРЕТ ОГРОМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ.**

- **НЕ ВЛИЯЮТ НА ЛИБИДО И РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ.**

ПРАВИЛА ПРИЕМА

МОГУТ УСИЛИВАТЬ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ НИТРАТАМИ И ДОНАТОРАМИ ОКИСИ АЗОТА (ИМИ ЛЕЧАТ СТЕНОКАРДИЮ). ПОЭТОМУ ИХ СОЧЕТАТЬ НЕЛЬЗЯ,Т.К. ЭТО ПРИВОДИТ К РЕЗКОМУ, ПОНИЖЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ЛЕТАЛЬНО

НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ В СОЧЕТАНИИ С АНАЛОГАМИ (т.е. друг с другом)

НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ С АНТИРЕТРОВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ БЕЗ СОВЕТА С ВРАЧАМИ (НАПРИМЕР, НЕСОМВМЕСТИМЫ С ИНГИБИТОРАМИ ПРОТЕАЗ ВИЧ, ТАКИМИ КАК ИНДИНАВИР ИЛИ РИТОНАВИР)

ПРАВИЛА ПРИЕМА

ПРИЕМ ПИЩИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА, НО ПРИ ПРИЕМЕ НАТОЩАК ДЕЙСТВИЕ НАСТУПАЕТ БЫСТРЕЕ, А ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ОЧЕНЬ ЖИРНОЙ ПИЩИ - МЕДЛЕННЕЕ.

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В БОЛЬШИХ ДОЗАХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УВЕЛИЧЕНИЮ РИСКА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ. ЕСТЬ ТАКЖЕ ДАННЫЕ ОБ ИНАКТИВАЦИИ АЛКОГОЛЕМ ВИАГРЫ.

НЕ СТОИТ ПИТЬ ГРЕЙПФРУТОВЫЙ СОК, Т.К. ОН ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗРУШЕНИЮ ЭТИХ ПРЕПАРТОВ В ОРГАНИЗМЕ(НАПРИМЕР СИЛДЕНАФИЛА), ЧТО ПРИВОДЯТ К ЕГО НАКОПЛЕНИЮ, А ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО К ПЕРЕДОЗИРОВКЕ.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ РЕДКО, НОСЯТ ОДИНАКОВЫЙ ХАРАКТЕР, УМЕРЕННО ВЫРАЖЕНЫ И НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫ. К НИМ ОТНОСЯТСЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ПРИЛИВЫ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ДИСПЕПСИЯ, ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА, НАРУШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ ЗРЕНИЯ.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПРЕХОДЯЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТООЩУЩЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ СИНИХ ЦВЕТОВ.

В ЭТОЙ СВЯЗИ РУКОВОДСТВОМ ОДНОЙ ИЗ АМЕРИКАНСКИХ АВИАКОМПАНИЙ, «ВИАГРА» ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ ПРИЕМА ЗА ЧАС ДО ВЫЛЕТОВ.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКАХ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ПРИАПИЗМА (СТОЙКАЯ БОЛЕЗНЕННАЯ ЭРЕКЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ). В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО МОГУТ ПРОИЗОЙТИ НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАВЕРНОЗНОЙ ТКАНИ ПЕНИСА, ЧТО ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕОБРАТИМУЮ ИМПОТЕНЦИЮ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ В ПРОШЛОМ НА ВИАГРУ ИЛИ ЛЮБОЙ КОМПОНЕНТ ПРЕПАРАТА (ЗУД, СЫПЬ, ОТЕК ЛИЦА ИЛИ ГУБ, ОДЫШКА).
- СЕРПОВИДНО-КЛЕТОЧНАЯ АНЕМИЯ, ЛЕЙКЕМИЯ, МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА
- ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА;
- РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЛАЗ, НАЗЫВАЕМОЕ ПИГМЕНТНЫМ РЕТИНИТОМ,
- ЯЗВА ЖЕЛУДКА
- ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ (НАПРИМЕР, ГЕМОФИЛИЯ).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ПЕРЕНЕСЕННЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА;
- ПЕРЕНЕСЕННЫЙ ТРОМБОЗ АРТЕРИЙ;
- НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (СТЕНОКАРДИЯ);
- НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ГИПОТОНИЯ;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ;
- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА;
- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;
- НАРУШЕННОЕ МОЗГОВОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ;
- ИНФАРКТ;
- ИНСУЛЬТ.

КЕТОНАЛ

ОТНОСИТСЯ К АНАЛЬГЕТИКАМ – УСТРАНЯЕТ БОЛЬ, В ОТЛИЧИЕ ОТ АНЕСТЕТИКОВ, КОТОРЫЕ УСТРАНЯЮТ ЛЮБУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, В Т.Ч. ТАКТИЛЬНУЮ

ЛИДОКАИН

ОТНОСИТСЯ К АНЕСТЕТИКАМ – УСТРАНЯЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



ЙОХИМБИНА ГИДРОХЛОРИД

- РЕГУЛЯТОР ПОТЕНЦИИ
- ОТНОСИТСЯ К АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМ
- АЛКАЛОИД ИЗ КОРЫ ЗАПАДНО-АФРИКАНСКОГО ДЕРЕВА CORYNANTHE YOHIMBE И КОРНЕЙ RAUWOLFIA SERPENTINA.
- КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК БЕЗ ЗАПАХА.

- ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРОТИВОПКАЗАНИЯ ТАКИЕ ЖЕ, КАК У ВИАГРЫ И К.

ДЕЙТСВИЕ ЙОХИМБИНА

УЛУЧШАЕТ ЭРЕКТИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ (ВЕРОЯТНО ВСЛЕДСТВИЕ УСИЛЕНИЯ ПРИТОКА КРОВИ К ПОЛОВОМУ ЧЛЕНУ И УМЕНЬШЕНИЯ ЕЕ ОТТОКА). ПОВЫШАЕТ НАСТРОЕНИЕ, МОЖЕТ УСИЛИВАТЬ ТРЕВОЖНОСТЬ.

ОКАЗЫВАЕТ АНТИДИУРЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (ВОЗМОЖНО, ЗА СЧЕТ СТИМУЛЯЦИИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ГОРМОНА ЗАДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА).

НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПСИХОГЕННОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИМПОТЕНЦИИ - ПО 5–10 МГ 1–3 РАЗА В СУТКИ В ТЕЧЕНИЕ 3–10 НЕД (НЕ БОЛЕЕ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ КУРС ПОВТОРЯЮТ.

ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ ПРОСТУДЫ И ГРИППА

СОГРЕВАЮТ, СОДЕРЖИТ АНАЛОГИ ЭФЕДРИНА, И АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ



ТЕСТОСТЕРОН

АНДРОГЕН.

- **СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИЮ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ, А ТАКЖЕ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У МУЖЧИН (ГОЛОС, ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ).**
- **УЧАСТВУЕТ В ФОРМИРОВАНИИ КОНСТИТУЦИИ ТЕЛА И ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ У МУЖЧИН,**
- **АКТИВИЗИРУЕТ ЛИБИДО И ПОТЕНЦИЮ, СТИМУЛИРУЕТ СПЕРМАТОГЕНЕЗ.**

ТЕСТОСТЕРОН

ОКАЗЫВАЕТ АНАБОЛИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЧТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В СТИМУЛЯЦИИ СИНТЕЗА БЕЛКА, УМЕНЬШЕНИИ ОТЛОЖЕНИЯ ЖИРА, ЗАДЕРЖКЕ В ОРГАНИЗМЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СИНТЕЗА БЕЛКА КАЛИЯ, ФОСФОРА, СЕРЫ, УСИЛЕНИИ ФИКСАЦИИ КАЛЬЦИЯ В КОСТЯХ И УВЕЛИЧЕНИИ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ПРИАПИЗМ, ПОВЫШЕННОЕ ПОЛОВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ, УСИЛЕНИЕ ЛИБИДО И ЧАСТАЯ ЭРЕКЦИЯ

У МАЛЬЧИКОВ — ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ РАЗМЕРОВ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ЭПИФИЗОВ КОСТЕЙ

ТЕСТОСТЕРОН - ОСЛОЖНЕНИЯ

- ТРОМБОФЛЕБИТ,
- ХОЛЕСТАТИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХА,

- ПРИАПИЗМ (СМ. ВЫШЕ)

- ОТЕКИ, ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИЯ, ТОШНОТА, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ,

ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ТАК ЖЕ:

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!