

Медицинский Университет Астана  
Кафедра акушерства и гинекологии

**“Методы диагностики  
гормонопродуцирующих опухолей  
яичников у девочек с нарушением  
менструального цикла и полового  
развитие .”**

Выполнили: Әбдәзімова Ә.Т  
Орынбаева Б

# План:

- Физиология и патология периода полового созревания
- Аномалии развития женских половых органов
- Профилактика заболеваний репродуктивных органов и репродуктивной системы в детском и ювенильном возрасте

# Период детства.

## Период гормонального покоя, или "нейтральный", до 6-7 лет.

- Продукция гормонов незначительна. Половые различия у детей по внешнему виду крайне незначительны. Гипоталамо-гипофизарная система в детстве незрелая, что проявляется высокой чувствительностью аденогипофиза и гипоталамуса к малым количествам эстрадиола.
- В этом периоде фолликулы не функционируют, вступают в стадию покоя, т.е. к моменту рождения деление половых клеток полностью блокируются.



Период полового созревания(пубертатный),  
по времени занимает 10-11 лет:  
с (7) 8 до 17 (18) лет

- происходит созревание репродуктивной системы.
- заканчивается физическое развитие, происходит скачок роста, идет окостенение зон роста трубчатых костей, формируется телосложение по женскому типу.
- период полового созревания происходит в строго определенной последовательности.

# Препубертатный период (8-9 лет)

- К 8-ми годам жизни(к окончанию периода детства) сформированы все 5 уровней гипоталамо-гипофизарно-яичниковой(ГТЯ) системы, активность которой регулируется по принципу отрицательной обратной связи.
- В гипоталамусе имеет место незначительное образование ГнРГ, ациклические выбросы ЛГ, ФСГ.
- Секреция эстрогенов низкая, созревание фолликулов происходит редко и бессимптомно.



происходит скачок роста,



появляются первые признаки феминизации (округляются бедра),



формируется женский таз (8-9 лет).

# I фаза пубертатного периода 10-13 лет

- Секреция ГнРГ приобретает ритмический характер, усиливается синтез гонадотропинов (ЛГ, ФСГ), что стимулирует синтез эстрогенов в яичниках.
- увеличиваются молочные железы – телархе
- начинается оволосение лобка (10-12 лет) - пубархе
- Первая менструация – менархе - завершает первую фазу пубертатного периода (13 лет)

## II фаза пубертатного периода – 14-17 (18 лет)


- Устанавливается циклический характер выделения ГнРГ (цирхоральный, часовой). В ответ увеличивается выработка ЛГ и ФСГ, что приводит к усилению синтеза эстрогенов в яичниках. Формируется механизм положительной обратной связи.
- Молочные железы и половое оволосение завершают свое развитие. Последним заканчивается оволосение подмышечных впадин (14-18 лет).
- Окончательно формируется женский таз.
- Первые менструальные циклы нередко ановуляторные
- Менструальный цикл приобретает овуляторный характер к окончанию пубертатного периода.

# Развитие матки


- Размеры матки в 1 год жизни уменьшаются. Длина ее - 2,5 см, масса 2,5 г только к 6 годам вес матки такой же, как у новорожденной, изменяются соотношения шейки и тела матки - к концу первого года 2:1, а к 8 лет 1,4:1, к 3-4 годам матка спускается в малый таз.
- Рост матки начинается с 8 лет, но особенно в 10-11 лет
- В 12-13 лет появляется угол между шейкой матки и телом матки, матка занимает физиологическое положение в малом тазу, соотношение шейки матки к телу матки – 1:3




# Развитие матки



Новорождённая




4 года




Период полового  
созревания



Взрослая  
нерожавшая  
матка



Взрослая рожавшая



Взрослая (постменопауза)

# Классификация нарушений полового развития:

- **Преждевременное половое развитие (ППР):**

- 1. Изосексуальное (по женскому типу)

- Истинное (центральное, конституциональное)

- Ложное (периферическое: феминизирующие опухоли яичников, фолликулярные опухоли яичников)

- 2. Гетеросексуальное (по мужскому типу):

- Простая вирилизирующая форма АГС

- Вирилизирующие опухоли яичников или надпочечников

- **Задержка полового развития**

- Конституциональная

- Церебральная

- **Отсутствие полового развития**

- Дисгенезия гонад (отсутствие функционально-активной ткани гонад)

- **Пороки развития половых органов**

- Пороки развития влагалища и матки

# Преждевременное половое развитие

- **Изосексуальный тип** - появление вторичных половых признаков (ВПП) и менструаций у девочек в возрасте до 8 лет, в котором различают 2 формы (истинная и ложная).
- **Истинное ППР (центральная форма)** В процесс вовлекаются гипофизотропные структуры гипоталамуса, в которых начинается преждевременная секреция рилизинг-гормонов, стимулирующая образование и выделение гонадотропинов гипофизом. Это в свою очередь вызывает созревание фолликулов, усиление секреции эстрогенов в яичниках.
- Церебральная патология у девочек с ППР может иметь **органический** (частота не более 5-6%) и **функциональный** характер.

# Истинное ППР


Имеет 2 формы:

- **Полная** — у девочки до 8 лет имеются все вторичные признаки и менструации.
- Последовательность появления и развития ВПП и наступления менархе не отличается от таковых при физиологическом половом созревании
- Темп развития ВПП значительно ускорен
- Физическое развитие ускорено, при этом темп окостенения эпифизарных зон роста трубчатых костей опережает темп роста (специфическое телосложение – рост 150-155 см, относительно короткие руки и ноги при длинном туловище)
- Костный возраст (биологический) резко опережает календарный, менархе наступает после появления на рентгенограмме гороховидной кости у головки первой пястной кости

- **Неполная** – наличие хотя бы одного из вторичных половых признаков при отсутствии менструации (изолированное развитие полового оволосения-адренархе; преждевременное развитие молочных желез – телархе).
- Ускоренное физическое развитие
- Скорость роста трубчатых костей и скорость окостенения их эпифизов совпадают (в репродуктивном периоде рост и телосложение не отличается от здоровых женщин )
- Темп полового развития удлиннен
- Менархе наступает в 10-11 лет

# Изосексуальное ППР

-Маленький  
рост  
150-155 см  
-ВПШ  
выражены



10 лет

# Ложное ППР (периферическая форма)

- гипоталамус и гипофиз остаются незрелыми и не выделяют рилизинг-гормоны и гонадотропные гормоны (поэтому эта форма называется ложной);
- обусловлено секрецией половых гормонов опухолевой тканью яичников;
- ППР вызывают гранулезоклеточные и гранулезотеклоклеточные опухоли яичников, а также тератобластомы и хорионэпителиомы.
- Первый симптом - менструалоподобные выделения ациклического характера при слабо развитых вторичных половых признаках.
- Отмечается утолщение девственной плевы, слизистой оболочки влагалища, скопление цервикальной слизи в наружном зеве шейки матки, появляется угол между телом и шейкой матки. В то же время длина, масса тела, костный возраст не превышают нормативы календарного возраста.





# Диагностика

- Анамнез
- Объективный осмотр
- Обследование:
- УЗИ органов малого таза
- лапароскопия при сомнительных данных УЗИ
- неврологическое обследование с применением ЭЭГ, КТ и МРТ головного мозга
- определение гонадотропинов в плазме крови
- ТФД
- Определение костного возраста (рентгенография костей рук и черепа)

## Лечение ППР

- Лечение основной патологии, вызвавшей ППР
- Торможение процесса ППР (агонисты гонадотропин релизинг-гормона)

# Гетеросексуальный тип -

- появление признаков полового созревания противоположного (мужского) пола у девочек в первом десятилетии жизни
- обусловлено **адреногенитальным синдромом** -гиперплазией надпочечников и врожденной нехваткой ферментных систем, участвующих в синтезе стероидных гормонов надпочечников (С21- гидроксилазы) или **вирилизирующей опухолью яичников или надпочечников.**

# Клиника

- **Врожденная форма АГС – ложный женский гермафродитизм**
- **В возрасте 3-5 лет развивается ППР по мужскому типу: вирильный гипертрихоз, в 8-10 лет – стержневые волосы на верхней губе и подбородке, «бакенбарды».**
- **Гиперандрогения способствует:**
  - **развитию мышечной и костной ткани по мужскому типу**
  - **К 10-12 годам длина тела достигает 150-155 см, дети уже не растут более, так как происходит окостенение зон роста костей**
  - **Внешний вид таких детей как «маленькие Геркулесы».**

# Врожденная форма АГС



# Диагностика

- Рентгенография или томография надпочечников
- Повышено содержание 17-КС в моче, тестостерона, 17-ОНП, ДЭА-С в крови
- Проба с глюкокортикоидами – уменьшение 17-КС в моче, тестостерона, 17-ОНП, ДЭА-С в крови

# Лечение

- Глюкокортикоиды пожизненно, доза в зависимости от возраста под контролем содержания 17-КС в моче и ДЭА-С и 17 - ОНП в крови.
- При грубой вирилизации наружных половых органов производят оперативное лечение (удаление пенисообразного клитора, рассечение уrogenитального синуса и

# Вирилизирующие опухоли яичников или надпочечников

- Интенсивность развития вирильной симптоматики зависит от скорости роста опухоли
- Проба с глюкокортикоидами отрицательная
- Одностороннее увеличение надпочечника при КТ, МРТ

**Лечение** - оперативное

# Задержка полового развития -

- недоразвитие вторичных половых признаков, их отсутствие или редкие нерегулярные менструации в возрасте 16 лет и старше.
- **Конституциональная форма задержки полового развития:**
  - Генетически обусловлена
  - Пубертатный период сдвинут по времени на более поздние сроки: развитие молочных желез, полового оволосения и менархе начинается в возрасте старше 16 лет
  - Костный (биологический) возраст отстает от календарного на 2-4 года
  - Лечение не требуется
- **Церебральная форма:**
  - нарушение функции гипоталамо-гипофизарной системы функционального, генетического или органического характера.

# Клиника

- недостаточное развитие ВПП
- евнухоидное телосложение – удлинение рук и ног, относительно короткое туловище, уменьшение поперечных размеров таза
- хронологический возраст опережает биологический (костный)
- гипоплазия половых органов (выраженный половой инфантилизм)
- яичники сформированы правильно, но нормального процесса фолликулогенеза и овуляции в них не происходит.



# Диагностика

- анамнез
- осмотр – особенность телосложения, половых органов, развитие ВПП
- ЭЭГ, КТ и МРТ головного мозга
- Рентгенография черепа и турецкого седла
- Определение цветовых полей зрения и глазного дна
- УЗИ органов малого таза
- лапароскопия с биопсией гонад
- гормональные исследования

## Лечение

- совместно с невропатологом, психиатром – нормализация функции диэнцефальной области
- заместительная терапия препаратами половых гормонов в циклическом режиме, гонадотропными препаратами
- диета полноценная
- витаминотерапия ( гр. В, С, Е).

# Отсутствие полового развития -

- отсутствие менархе, ВПП в возрасте 16 лет и старше.

## **Этиология:**

- Дисгенезия гонад - порок развития, при котором отсутствует функционально активная гормонопродуцирующая ткань яичников, вместо яичников соединительнотканые тяжи
- у девочек, которым по каким-либо показаниям было произведено удаление яичников в возрасте до 8-10 лет.


# Типичная форма дисгенезии гонад (синдром Шерешевского-Тернера)

- аменорея
- низкий рост ( выще 150 см)
- укорочение нижней части
- низкое расположение ушных раковин
- низкая граница роста волос
- короткая шея
- пороки развития внутренних половых органов
- ВПП – отсутствуют или слабо выражены
- гипоплазия больших и малых половых губ, матки, узкое влагалище, яичники не определяются
- кариотип 45 XO
- **Лечение:** Заместительная гормональная терапия

# Синдром Шерешевского – Тернера (45 XO)


низкий рост  
(выше 150 см)

короткая шея



низкое  
расположение  
ушных раковин

укорочение  
нижней части




# Пороки развития половых органов (влагалища и матки)

- **Атрезия гимена** - отсутствие естественного отверстия в девственной плеве. Проявляется в период полового созревания, когда выявляется отсутствие менструаций. Менструальная кровь, скапливаясь во влагалище, растягивает его стенки.

**Клиника**- циклически повторяющиеся боли, чувство тяжести внизу живота, иногда затруднения при мочеиспускании.

**Лечение**- хирургическое (крестообразное иссечение гимена).

# Атрезия девственной плевы




**Синдром Майера -Рокитанского-Кюстнера (полная аплазия матки и влагалища) -**


характеризуется отсутствием менструаций, в дальнейшем – невозможность половой жизни.

**Лечение:** хирургическая коррекция (создание искусственного влагалища).


# Формы непроходимости влагалища и шейки матки



**Атрезия гимен**



**Аплазия нижней и средней  
1/3 влагалища**



**Аплазия шейки матки и влагалища**



# Двуорогая матка (*uterus bicornis bicollis*)-

- общее влагалище и раздвоение шейки и тела матки; (*uterus bicornis unicollis*)- только раздвоение тела матки.
- **Удвоение матки и влагалища (*uterus didelphus*)**-наличие двух совершенно самостоятельных половин органов (2 матки, 2 шейки и 2 влагалища). Наблюдается крайне редко. Может протекать бессимптомно. Менструальная, половая и даже детородная функция остаются нормальными. Т.к. данный вид пороков нередко сопровождается задержкой развития матки и яичников, то наблюдаются нарушения менструальной функции, повторные самопроизвольные выкидыши, слабость родовой деятельности, кровотечения в послеродовом и послеродовом периодах.
- **Седловидная матка (*uterus arcuatus*)** – двуорогость матки выражена незначительно, только в области дна седловидное углубление. Не требует никакого лечения.
- **Внутриматочная перегородка (*septa*)** – наличие фиброзно-мышечной перегородки в полости матки.

# Диагностика

- Осмотр при помощи зеркал
- Бимануальное исследование
- УЗИ малого таза
- ГСГ
- Лапароскопия
- Гистероскопия

**Лечение** – пластические операции по показаниям.




Рис. 10. Аномалии развития матки:

*a* — uterus didelphus; *б* — uterus duplex et vagina duplex; *в* — uterus bicornis bicollis; *г* — uterus bicornis unicollis; *д* — uterus arcuatus; *е* — uterus septus duplex; *ж* — uterus subseptus; *з* — uterus unicornis;  
*и, к, л, м* — uterus bicornis rudimentarius



**Спасибо за  
внимание!**