

# Многоформная экссудативная эритема

# Многоформная экссудативная эритема

- Многоформная экссудативная эритема — острое заболевание кожи и слизистых с полиморфными высыпаниями и склонностью к рецидивам преимущественно в осенний и весенний периоды. Возникает в основном у молодых людей и лиц среднего возраста. Она может быть связана с сенсibilизацией организма к различным лекарственным препаратам или развиваться на фоне некоторых инфекционных заболеваний.

# Клинические формы МЭЭ.

## Инфекционно-аллергическая форма

- ▣ патогенез связан с бактериальной сенсibilизацией.
- ▣ источники бактериальной сенсibilизации - очаги хронической инфекции в организме.
- ▣ провоцирующие рецидив факторы - переохлаждение, стресс, вирусные инфекции.

## Токсико-аллергическая форма

- ▣ патогенез связан с повышенной чувствительностью к лекарственным препаратам.
- ▣ в анамнезе прием медикаментов (сульфаниламиды, амидопирин, тетрациклин и т.д.)

# Многоформная экссудативная эритема

- ▣ Инфекционно-аллергическая форма
  - ▣ Сезонность (осень, весна)
  - ▣ Провоцирующие факторы-стресс, переохлаждение, вирусные инфекции
  - ▣ Возраст -молодой и средний
  - ▣ Пол -чаще мужчины
  - ▣ Наличие очагов хронической инфекции в организме
  - ▣ Бактериальная сенсibilизация (стафилококк, стрептококк и т.д.)
- ▣ Токсико-аллергическая форма
  - ▣ причина - контакт с лекарственным препаратом
  - ▣ Наличие повышенной чувствительности к медикаменту
  - ▣ Частота рецидива зависит от частоты контакта с лекарственным препаратом

# Многоформная экссудативная эритема

## Полиморфизм высыпаний

- ▣ пятна -эритема
- ▣ папулы
- ▣ волдыри
- ▣ пузыри
- ▣ пузырьки
- ▣ корки (геморрагические)


## Локализация в полости рта

- ▣ губы
- ▣ дно полости рта
- ▣ щеки
- ▣ небо

На коже-”кокарды”


тыльные поверхности  
кистей, стоп,  
предплечье, голени













ЭКС  
а - э  
плен  
б - э  
кров  
в - с  
фиб  
пове

в










# Результаты дополнительных методов обследования

- ▣ Симптом Никольского –отрицательный (расслоение эпидермиса с образованием пузырей: кожа становится похожей на папиросную бумагу)
- ▣ В мазках-отпечатках -картина неспецифического воспаления
- ▣ Кожно-аллергические пробы с бактериальными аллергенами - при инфекционно-аллергической МЭЭ - положительные
- ▣ Тест дегрануляции базофилов по Шелли, РБТЛ, реакция лейкоцитолиза -при токсико-аллергической форме МЭЭ -положительные



**Рис. 162. Патогистология многоформной экссудативной эритемы. Субэпителиальное отслоение (1), отек (2) и периваскулярные инфильтраты в собственной слизистой оболочке (3). Микрофото. Окраска гематоксилин-эозином. Об. 10, ок. 4.**



# Дифференциальная диагностика МЭЭ

- ▣ Пузырчатка
- ▣ Пемфигоид
- ▣ Острый герпетический стоматит
- ▣ Вторичный сифилис

# СИНДРОМ-СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА

Острый слизисто-кожно-глазной синдром -тяжелейшая форма  
МЭЭ

- тяжелое общее состояние
- поражение кожи, слизистой рта, слизистой оболочки половых органов
- конъюнктивит, кератит
- ринит
- бронхопневмонии, миокардиты, менингоэнцефалиты.

# Лечение

# МЭЭ

## Этиопатогенетическое

- Санация очагов бактериальной сенсibilизации в организме при инфекционно-аллергической форме.
- отмена лекарственного препарата при токсико-аллергической форме .
- в ремиссии при инфекционно-аллергической форме специфическая десенсибилизация бактериальными аллергенами, неспецифическая десенсибилизация - гистаглобин 2 мл п/к 2-3 раза в неделю курс 8-10 инъекций



# Лечение МЭЭ



## Симптоматическое

- ▣ Противовоспалительные - антибиотики широкого спектра действия, кортикостероиды
- ▣ Дезинтоксикация
- ▣ Иммуотропные препараты

## Местное лечение

- ▣ Обезболивание
- ▣ антисептическая обработка
- ▣ обработка протеолитическими ферментами при наличии налета
- ▣ мази с антибиотиками и кортикостероидами
- ▣ кератопластики

