

ГКУ «КОПНБ»  
Центр медицинской и социальной реабилитации



**НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОСНОВЫ ИХ  
ПРОФИЛАКТИКИ**

Подготовила главная медсестра ЦМиСР  
Намазова Фериде Узеировна

г. Курган, 2017г.

# Особенности невротического развития у детей и подростков



**«НЕВРОЗЫ ВОЗНИКАЮТ  
НА ПЕРВОТЕ ОТЧЕТО  
ДОМА»**

**З.ФРЕЙД**

# F90-F99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте



## **F90** **Гиперкинетические** **расстройства**

**F90.0 нарушение активности и внимания**

**F90.1 Гиперкинетическое расстройство поведения**

**F90.8 Другие гиперкинетические расстройства**

**F90.9 Гиперкинетическое расстройство неуточненное**

# F90-F99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте



## **F91** **Расстройства** **поведения**



F91

**...ограничивающ  
иеся рамками**

семьи

F91.1

**...несоциализиро  
ванное**

F91.2

**...социализирова  
нное**

F91.3

**Вызывающее,  
оппозиционное**

**F91.8 Другие ...**

F91.9

**Неуточненные ...**

# Ф90-Ф99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

## **Ф92** **Смешанные** **расстройства** **поведения и эмоций**



Ф92.0 Депрессивное  
расстройство  
поведения

Ф92.8 Другое  
смешанное  
расстройство  
поведения и эмоций

Ф92.9 Смешанное  
расстройство  
поведения и эмоций  
неуточненное

# F90-F99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

## F93 Расстройства поведения



F93.0 Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой

F93.1 Фобическое тревожное расстройство в детском возрасте

F93.2 Социальное тревожное расстройство в детском возрасте

F93.3 Расстройство вследствие сублингвого соперничества

F93.8 Другие эмоциональные расстройства в детском возрасте

F93.9 Эмоциональное расстройство в детском возрасте неуточненно

# F90-F99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте



## **F94** **Расстройства** **социального** **функционирования,** **начало которых** **характерно для детского** **и подросткового возраста**



**F94.0 Элективный мутизм**

**F94.1 Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте**

**F94.2 Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу**

**F94.8 Другое расстройство социального функционирования в детском возрасте**

**F94.9 Расстройство социального функционирования в детском возрасте неуточненное**

# Ф90-Ф99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте



## **Ф95** **Тики**



**Ф95.0 Транзиторные тики**

**Ф95.1 Хронические моторные тики или вокализмы**

**Ф95.2 Синдром Жиль Де Ла Туретта**

**Ф95.8 Другие тики**

**Ф95.9 Тики неуточненные**



# F90-F99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

## F98

Другие поведенческие и эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте



F98.0  
Энурез неорганической природы

F98.1  
Энкопрез неорганической природы

F98.2  
Расстройство приема пищи в детском и подростковом

F98.3  
Поедание несъедобного (пика) в поведенческом

F98.4  
Стереотипное поведение

F98.5  
Другие формы заикания

F98.9  
Расстройство речи

F98.9  
Расстройство поведения с началом, обычно

F98.9  
приходящи

# Ф90-Ф99 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

## **Ф99** **Неуточненное** **психическое** **расстройство**

Ф99.1 Психотическое расстройство без дополнительных уточнений

Ф99.2 Непсихотическое расстройство без дополнительных уточнений

Ф99.9 Психотическое расстройство без дополнительных уточнений



# Особенности детской психиатрии.



## **Психопатологические симптомы, наблюдающиеся преимущественно в детском возрасте.**

- 1) Периоды индивидуального развития определяют этапы переходов от одного состояния организма к другому, качественно более высокому.
- 1) Изменение функционального состояния мозга отражается на особенностях развития нервно-психической патологии в разные возрастные периоды ребенка и подростка.
- 1) Выделяют критические периоды или возрастные кризисы, которые называются так вследствие чрезвычайной ранимости нервной системы и повышенного риска возникновения нарушения ее функции.

# Уровни реагирования нервно-психической сферы детей и подростков.

1) Соматовегетативный 0-3 г.

1) Психомоторный 4-7 лет

1) Аффективный 5-10 лет

1) Эмоционально-идеаторный 11-17 лет



В.В. Ковалев 1985 г.

«Каждый возраст «одевает»  
заболевание в свои одежды»



## **Соматовегетативный уровень 0-3 г.**

Наиболее зрелая вегетативная функция, поэтому все нарушения будут выражаться соматовегетативными проявлениями (проблемы мышления, памяти еще не сформированы).

### **Синдром невропатии.**

1. Нарушение сна
2. Расстройства пищеварения
3. Расстройства мочеиспускания и дефекации
4. Аллергическая предрасположенность
5. Нарушение терморегуляции

## **Психомоторный уровень 4-7 лет**

Заканчивается дифференцировка двигательных анализаторов, поэтому формируются системные неврозы: тики, заикание, энурез; гиперактивность, синдром нарушения внимания СДВГ.



## **Аффективный уровень 5-10 лет**

Появляется оценка происходящего, дает эмоциональную самооценку и оценку окружающего. Капризы, плач, депрессивные симптомы, реакции протеста, реакции отказа, синдром уходов и бродяжничества, невроз страха.

## **Эмоционально – идеаторный 11-17 лет**

Реакции пубертатного возраста: эмансипации, сверхценные увлечения, дисморфофобия. Формируются обсессивно-компульсивные расстройства, депрессивный невроз, неврастения, ипохондрический невроз.

# Неврозы детского возраста делят на :



Общие неврозы:	МКБ-10
Неврастения (астенический невроз)	Неврастения F48.0
Истерический невроз	Конверсионные расстройства F44.0
Невроз навязчивых состояний	Обсессивно-компульсивные расстройства F42.0
Депрессивный невроз	Соматоформные расстройства F45.0
Невроз страха	Фобические и тревожные расстройства F40.0
Ипохондрический невроз	Ипохондрический синдром F45.2



**Невроз** – это психогенное нервно-психическое расстройство функционального характера в следствии неразрешаемых или неразрешенных внутри- и межличностных конфликтов, проявляющихся симптомами невротического, непсихотического регистра.

### **Триада Ясперса**

- 1) Совпадение начала заболевания с воздействием психотравмы.
- 2) Отражение психотравмы в структуре переживаний.
- 3) Выздоровление по мере дезактуализации травмы.



# Триада симптомов для постановки диагноза: Невроз

## Неврастения

- 1)
  - Астения
- 2)
  - Вегетативные нарушения
- 3)
  - Нарушения сна

## Тревожно - фобические расстройства

- 1)
  - Фобии
- 2)
  - Вегетативные нарушения
- 3)
  - Нарушения сна

## Обсессивно - компульсивные расстройства

- 1)
  - Обсессии (навязчивости)
- 2)
  - Вегетативные нарушения
- 3)
  - Нарушения сна

# Своевременность профилактики и терапии неврозов в соответствии с характером психогенных заболеваний:



- 1) Непатологические психологические стрессовые реакции
- 2) Непсихотические невротические состояния:
  - Невротические реакции (длительность не больше 1 месяца)
  - Невротическое состояние (невроз)
    - Длительность: острое – до 1 г.
    - затяжное – от 2-5 лет
  - Невротическое патологическое состояние личности
    - Длительность: более 5 лет.
- 3) Психотические психогенные состояния:
  - Острые реактивные психозы
  - Реактивная депрессия
  - Реактивный параноид

**Системные неврозы:**

**МКБ-10**

Невротическое заикание

Заикание (запинание)  
F98.5

Невротические тики

Транзиторные тики  
F95.0

Невротический энурез

Энурез неорганической природы  
F98.0

Невротический энкопрез

Энкопрез неорганической природы  
F98.1



● **У детей нередко возникают системные неврозы:**

- **невротическое заикание** - нарушение ритма, темпа и плавности речи, связанное с судорогами мышц, участвующих в речевом акте. У мальчиков оно возникает чаще, чем у девочек.

- **мутизм** (лат. mutus - молчание) – это расстройство преимущественно школьного возраста (у взрослых – редко), т.к. формирующаяся речь ребенка – самая молодая функция психики, поэтому чаще ломается под влиянием самых разнообразных вредных факторов.

- **невротические тики** – разнообразные автоматизированные привычные элементарные движения (мигание, облизывание губ, подергивание головой, плечами, различные движения конечностями, туловищем), а также покашливания, «хмыканье», «хрюкающие» звуки (так называемые респираторные тики), которые возникают в результате фиксации того или иного защитного действия. Чаще всего наблюдаются в возрасте от 7 до 12 лет. Тики могут приобретать навязчивый характер, тогда они относятся к проявлению невроза навязчивых состояний;



- **нервная анорексия** – отказ от еды;
- **невротическое расстройство сна** – нарушение засыпания, глубины сна с ночными пробуждениями, ночными страхами, а также снохождение (сомнамбулизм) и сноговорение.
- **невротический энурез** – неосознанное недержание мочи , преимущественно во время ночного сна;
- **невротический энкопрез** – непроизвольное выделение испражнений, возникающее при отсутствии нарушений и заболеваний нижнего отдела кишечника. Как правило, ребенок не испытывает позыва к дефекации, вначале не замечает наличия испражнений и лишь спустя некоторое время ощущает неприятный запах. Чаще всего встречается в возрасте 7–9 лет, у мальчиков чаще.



Официальный сайт ГКУ «Курганская областная  
психоневрологическая больница»

<http://psychokurgan.ru>

Раздел : «Жизнь хороша»

-методические рекомендации:

«НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОСНОВЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ»