

оперативное акушерство

щипцы и вакуум

ПОКАЗАНИЯ

- абсолютных показаний нет
- есть стандартные и специальные
- решение принимается индивидуально
- частота от 0,1 до 25%
- оптимальная частота 8,5%

стандартные показания

- со стороны матери
 - затянувшийся второй период
 - сокращение второго периода
 - слабые схватки, уставшая роженица
 - слабость потуг при эпидуральном обезболивании родов

стандартные показания

- со стороны плода
 - дистресс
- если сомневаешься в выборе
влагалищное/абдоминальное пособие –
выбирай последнее

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- отсутствие порядочного показания
- неполное открытие
- явное несоответствие размеров головки плода и таза
- головка на входе
- отсутствие навыков

ЩИПЦЫ – уровень (1)

- **ВЫХОДНЫЕ**
 - головка на тазовом дне
 - ведущая точка видна
 - стреловидный шов в прямом размере

ЩИПЦЫ – уровень (2)

- **НИЗКИЕ**
 - головка на уровне +2 или ниже
 - стреловидный шов прямо, косо или поперечно

ЩИПЦЫ – уровень (3)

- **ПОЛОСТНЫЕ**
 - ведущая точка между 0 и +2
 - когда ведущий пункт на 0, большой сегмент во входе

- **ВЫСОКИЕ/ВХОДНЫЕ не ставить!**

оценка соответствия (1)

- несоответствия нет
 - опухоли нет или минимальная
 - конфигурации нет или минимальная
 - надвигания нет
 - головка в подходящей плоскости

оценка соответствия (2)

- умеренное несоответствие
 - умеренная опухоль
 - умеренная конфигурация
 - надвигания нет
 - ГОЛОВКА ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКО

оценка соответствия (3)

- **выраженное несоответствие**
 - большая опухоль
 - сильная конфигурация
 - надвигание
 - ГОЛОВКА ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКО

УСЛОВИЯ

- головка в подходящей плоскости (желательно не выше +1)
- полное открытие
- излившиеся воды
- кооперативная женщина
- анестезиолог и педиатр под рукой

техника (1)

- уточни положение головки (при необходимости УЗИ)
- продолжай мониторинг плода
- опорожни пузырь

техника (2)

- выбери хорошие щипцы
- представь щипцы
- вложи левую потом правую ложку
- сомкни
- сделай пробную тракцию

техника (3)

- тракции делай по оси родового канала
- тракции делай во время потуг
- не тяни вверх слишком рано
- при необходимости сделай эпизиотомию
- после рождения подбородка убери щипцы

осторожно! (1)

- под рукой должен быть человек владеющий реанимацией
- уточни положение головки и после наложения щипцов
- не тяни слишком сильно
- знай, когда остановиться

осторожно! (2)

- до пособия составь план “В”
- полостные щипцы накладывай в операционной (КС)
- лучше нежно, но чаще, чем дико один раз
- полостные щипцы для старого врача

ОПАСНОСТИ

- травматизация матери и ребенка
- опасность дистонии плечиков

документация (1)

- **детальный ход родов**
 - результат исследования (влагалищный статус)
 - подробное описание положения головки
 - подробный диагноз и показания
- **согласие женщины**
- **использованная анестезия**
- **использованный инструмент**

документация (2)

- название операции
- список участников
- подробное описание пособия
- подробное описание новорожденного
- Личная печать и подпись