ЛЕКЦИЯ ПО ВОЕННОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

НАРУШЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ

- 1. Замедленная консолидация перелома
- 2. Ложные суставы:
- а) тугие; б) болтающиеся
- 3. Неартроз
- 4. Дефект на протяжении кости

ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

ОБЩИЕ

МЕСТНЫЕ

эндокринопатии

нарушения обмена веществ

авитаминозы

световое голодание

синдром взаимного отягощения неполноценная иммобилизация

многократные репозиции

диастаз между отломками

анатомофизиологические особенности



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ

- По этиологии
- По характеру повреждения
- По клинико-рентгенологической картине

- По степени остеогенной активности
- По локализации
- По наличию гнойных осложнений

- Врожденный; патологический; травматический
- Неогнестрельного происхождения; огнестрельного происхождения
- Формирующийся ложный сустав
- Тугой (щелевидный, фиброзный)
- Некротический
- Ложный сустав костного регенерата
- Истинный (неартроз)
- С дефектом костного вещества
- Гипертрофический, гипотофический, атрофический
- Плечевая кость, кости предплечья, бедренная кость, большеберцовая кость, и т. д.
- Неосложненный; инфицированный; осложненный гнойной инфекцией

























Методы лечения ложных суставов

- 1. функционально-стабильный остеосинтез с применением металлических конструкций
- 2. сочетанное использование костной пластики и металлических конструкций
- 3. компрессионно-дистракционный остеосинтез

КОСТНАЯ ПЛАСТИКА

- <u>Аутотрансплантация</u> пересадка костной ткани, взятой у того же больного, из одного места в другое
- <u>Аллотрансплантат</u> это ткань, полученная от индивидуума того же вида, т. е. взята у одного человека и пересажена другому
- <u>Ксенотрансплантат</u> ткань, заготовленная от другого вида, взята у животного и пересажена человеку

КОНТРАКТУРЫ СУСТАВОВ

Контрактура - ограничение нормальной пассивной

- В зависимости от ограничения тех или иных движений различают контрактуры сгибательные, разгибательные, приводящие, отводящие, супинационные, пронационные и комбинированные.
- По преимущественному участию отдельных тканей в образовании контрактуры, последние делятся на артрогенные, миогенные, десмогенные и нейрогенные (рефлекторные и антагонистические).

ПОДВИЖНОСТИ В СУСТАВЕ
В зависимости от ограничения • Контрактуры суставов могут тех или иных движений быть врожденными и различают контрактуры приобретенными

Для полной характеристики посттравматических контрактур учитывается: этиология (открытый, огнестрельный, неогнестрельный перелом); степень нарушения функций (значительная, незначительная); фаза развития (нестойкая, стойкая); характер ограничения движений (сгибательная, приводящая, разгибательная).

СТАДИИ КОНТРАКТУР

- а) предконтрактурная;
- б) фазу нестойких контрактур;
- в) фазу стойких контрактур.

ПРОФИЛАКТИКА КОНТРАКТУР

СУЩНОСТЬ:

- устранение болевых ощущений, связанных с ранением;
- своевременное и правильное выполнение иммобилизации (как транспортной, так и лечебной);
- раннее активное сокращение мышц поврежденной конечности, и ранние движения всей конечностью или её отдельными сегментами.

<u>МЕРОПРИЯТИЯ:</u>

- 1. Эффективную борьбу с болью и инфекционными осложнениями.
- 2. Радикальную хирургическую обработку.
- 3. Раннюю репозицию костных фрагментов и иммобилизацию конечности по возможности в физиологическом положении.
- 4. Борьбу с развивающимся посттравматическим отеком путем придания конечности возвышенного положения.
- 5. Применение комплекса реабилитационных мероприятий, включающих лечебную гимнастику, трудотерапию, тепловые физиотерапевтические процедуры и массаж.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР

- Сила, устраняющая контрактуру, должна действовать постоянно и быть малой по величине. Эти воздействия должны чередоваться с возвращением сегментов в первоначальное положение.
- Необходимо сознательное участие больного в проведения всех лечебных мероприятий.
- Комплексное применение всех современных средств реабилитации, включающих лечебную гимнастику, физические методы лечения, массаж и трудотерапию, направленных на восстановление функции и опороспособности конечности.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУР

- физио-механотерапия, лечебная гимнастика и трудотерапия
- метод этапных гипсовых повязок
- вытяжение

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУР

Показано при:

- безуспешности консервативного лечения;
- необходимости устранения тормозящего влияния тканей, препятствующих или замедляющих действие коррегирущих манипуляций;
- необходимости статико-динамической реконструктивной перестройки конечности.

хирургические методы лечения контрактур

- редрессация
- этапная редрессация
- отделение рубца от кости
- рассечение фасции (фасциотомия)
- тенотомия
- пересадки сухожилий
- артропластика
- артрориз
- артродез
- применение компрессионно-дистракционных аппаратов









- <u>АНКИЛОЗ</u> полная неподвижность сустава, вызванная фиброзной или костной спайкой сочленяющихся костей.
- При наличии костной спайки говорят о костном анкилозе сустава, фиброзной о фиброзном анкилозе.

КЛАССИФИКАЦИЯ АНКИЛОЗОВ

- 1. Врожденные анкилозы и синостозы
- 2. Травматические и инфекционные анкилозы, возникающие:
 - а) вследствие травм, огнестрельных ранений до операций;
 - б) после инфекции, возникающей в ранее здоровом суставе;
 - в) после туберкулеза сустава;
 - г) вследствие доброкачественных опухолей (остеома, хондроматоз)
- 3. Системные анкилозы:
 - а) после артрозов;
 - б) после артритов.
- 4. Анкилозы после вынужденной длительной бездеятельности сустава;
 - а) после ожога;
 - б) вследствие общих заболеваний (оссифицирующий миозит);
 - в) после длительной лечебной иммобилизации.

УКОРОЧЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

- Укорочения и деформации костей бывают врожденные (менее 0,3%) и приобретенные.
- Основной причиной приобретенных укорочений являются погрешности, допускаемые во время лечения пострадавших с переломами костей, особенно при наличии осложнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ИЛИЗАРОВА

- исправление деформаций и стабилизация суставов при необходимости могут сочетаться с одновременным удлинением сегмента;
- малая травматичность операции разрез 0,5 1,0 см, частичная кортикотомия;
- оптимальный темп дистракции 1,0 мм за 4 приема;
- отсутствие повторных вмешательств (удаление погружных конструкций и т.д.);
- практически неограниченное удлинение;
- возможность полной нагрузки через 1,5 3 месяца после снятия аппарата;
- низкая частота осложнений (у 28,8% больных). Для примера, при использовании стержневых аппаратов Вагнера, Андерсона, Жюде и др. осложнения встречаются у 53,92% больных.

