



ОСТРЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ

Ивано-Франковський національний медичний
університет
Кафедра анестезиології і інтенсивної терапії

... проблема острых экзогенных отравлений ставит перед органами охраны здоровья ряд сложных задач, связанных с необходимостью широкого информирования врачей о токсичных свойствах разных химических препаратов и новых эффективных методах лечения "химических" болезней.

Е.О.Лужников

ОТРАВЛЕНИЕ

- это патологический процесс, который возникает в результате влияния на организм ядовитых веществ окружающей среды (химические соединения, токсины растительного и животного происхождения).

Все эти вещества наз. ксенобиотиками и характерные тем, что они не принимают участия в энергетическом обмене и не используются организмом с пластической целью

ЯД

- это инородное химическое соединение, которое нарушает течение нормальных биохимических процессов в организме

в результате чего возникают расстройства физиологических функций разной степени выраженности от наименьших проявлений интоксикации к летальным последствиям

TOXIC(Tox-древнегреческий-Лук)

ANTI- ~~Didonai~~- давать (**Antidot**) ~~Dromos~~-круг

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТРЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ОТРАВЛЕНИЙ

В мире на протяжении ~~последних~~^(сегодня) десятилетий сложилась так называемая "токсическая ситуация", которая вызвана тем, что количество химических веществ, которые окружают человека в течение его жизни, постоянно увеличивается и по расчетам американских ученых уже достигла 6 млн. Это связано с достижениями химии, парфюмерии, химического производства, косметологии, бытовой химии.

Из этого чрезвычайно широкого "химического окружения" человека, он постоянно имеет контакт с около 60 000 химическими соединениями в виде пищевых добавок, лекарственных средств, пестицидов, инсектицидов, средств бытовой химии, веществ для присмотра за одеждой, автомобилем, мебелью, косметических и парфюмерных изделий и тому подобных.

Подсчитано, что из указанного разнообразия химических веществ, чаще всего вызывают ОЭО около 500

Классификация ксенобиотиков по токсичности: 1. Сильнодействующие или чрезвычайно токсичные

-
ЛД50 < 50 мг/кг массы тела

2. Высокотоксичные - ЛД50 = 50-200 мг/кг массы

3. Средней токсичности - ЛД50 = 200мг-1 г/кг массы

4. Малотоксичные - ЛД50 > 1 г/кг массы тела

ЧАСТОТА ОТРАВЛЕНИЙ :

В США - свыше 1 млн. случаев в год, из которых
около

56 000 умирают

2. В странах Европы - в год госпитализируется в
среднем 1 чел. на 1 тыс. населения, что в 2 раза
больше, чем с инфарктом миокарда

3. В Ив.-Франк. обл. - ежегодно госпитализируются
около 1000 отравленных

ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЙ :

1. Случайно или в быту - 2/3 всех случаев
2. Суицид - 25%
3. Профессиональные - 10%
4. В результате чрезвычайных положений и катастроф - 2-3%

Причины, которые способствуют увеличению острых экзогенных отравлений, :

1. Неконтролируемая продажа разнообразных лекарств (снотворных, седативных, сильнодействующих - автоматы, реклама и др.)
2. Самолечение в связи с подорожанием медицины
3. Создание запасов лекарств в домашних условиях (доступные для всех членов семьи аптечки)
4. Распространение алкоголизма, наркомании и токсикомании
5. Использование токсичных доз препаратов для прерывания нежелательной беременности

Летальность от острых отравлений:

Общая - 1 - 7 %, в том числе :

а) алкоголь и его суррогаты - 62,2 %

б) токсичные газы (СО, сероводород и др.) - 15,4 %

в) коррозийные яды (кислоты, луга) - 6,3 %

г) медикаменты - 4 %

д) ФОВ - 3,1 %

Пути поступления ядов в организм:

1. Оральный - через ЖКТ (85%)
2. Ингаляционный - через органы дыхания (11%)
3. Перкутанный - через кожу и слизистые (3%)
4. Инъекционный - п/к, в/м, в/в (1%)
5. Через прямую кишку, половые органы и др. (0,1%)

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДОВ

- 1. Сердечные (нарушение ритма, миокардит)** -
гликозиды, хинин, β-адреноблокаторы, блокаторы Ca каналов, клофелин, соли бария и калия, трициклические антидепрессанты, белладонна
- 2. Неврологические (психоз, судороги)** - опиаты, снотворные, седативные, ФОС, СО, алкоголь и его суррогаты
- 3. Печёночные (гепатопатия, гепатаргия)** -
хлорированные углеводороды, ядовитые грибы, фенолы, альдегиды
- 4. Кровяные (гемолиз, метНв, НвСО)** - аммиак, нитраты, нитриты, анилиновые производные
- 5. Легочные (отек, фиброз)** - нитрогена оксиды, фосген
- 6. Почекные (нефропатия, ОПН)** - этиленгликоль, соли тяжёлых металлов.
- 7. Желудочно-кишечные (гастроэнтерит)** - коррозийные яды, тяжелые металлы, арсен

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ОБУСЛАВЛИВАЮТ ТОКСИЧНОСТЬ ЯДОВ

- 1. Концентрационный (количественный)** - зависимость прямо пропорциональна количеству яда и его концентрации в биологических средах
- 2. Временной** - зависимость прямо пропорциональна скорости поступления яда в организм и обратно-пропорциональна скорости его обезвреживания или выведения
- 3. Пространственный** - определяется путем поступления яда и степенью кровоснабжения разных органов и тканей (при пероральном отравлении поражаются преимущественно ЖКТ и печень, при ингаляционном - легкие)

Пути очистки организма от яда:

Биотрансформация преимущественно в печени

Элиминация через почки, ЖКТ, кожу, легкие

"ЛЕТАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ" -
это синтез в организме в процессе биотрансформации
веществ, которое имеет высшую токсичность по сравнению с
исходным продуктом (ФОС - параоксоны, метанол -
муравьинная кислота и формальдегиды, этиленгликоль -
щавелевая кислота)

КЛИНИЧЕСКИЕ СТАДИИ ОСТРЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ОТРАВЛЕНИЙ :

- 1. Токсикогенная - период взаимодействия
токсического вещества с организмом человека,
прогресс клинической картины (средняя
длительность от нескольких часов до 3-х суток)*
- 2. Соматогенная - клиническая картина
последствий отравления (длительность не
определенна и зависит от глубины поражения)*

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ОТРАВЛЕНИЙ:

- 1. Прекращение дальнейшего поступления токсичного вещества в организм**
- 2. Самое быстрое выведение яда из организма**
- 3. Использование антидотов (противоядий)**
- 4. Усиление естественных путей детоксикации и применение искусственных (экстракорпоральных) методов очистки организма от ядовитых веществ**
- 5. Симптоматическая посиндромная терапия**


Удаление яда с ЖКТ:

1. Промывание желудка (особенности):

- а) лучше зондовым методом, а у больных в безсознательном состоянии и у отравленных разъедающими (едкими) ядами - обязательно !!!)
- б) количество жидкости для промывания не < 10 л
- в) характер жидкости для промывания – антидот или химический нейтрализатор
- г) заканчивают промывание введением в желудок антидотов, сорбентов
- д) необходимы повторные промывания на протяжении суток

2. Удаление токсических веществ с кишечника:

- а) вызывающие диарею – солевые (Na_2SO_4 , MgSO_4) или масляные (касторовое, вазелиновое масла)
- б) очистительные или высокие сифонные клизмы
- в) кишечный диализ по Амбурже – введение в 12-ти перстную кишку гипертонического диализного раствора в объеме до 10-12 л за сутки



Select gauge size for patient's
vasculature & intended therapy

УСИЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПУТЕЙ ДЕТОКСИКАЦИИ

1. Форсированный щелочной осмотический диурез:

а) Цель - увеличить количество суточной мочи, уменьшить концентрацию токсичных веществ, перевести яды в диссоциированную форму

б) Методика проведения :

Водная нагрузка - в течение 1 часа в/в 500 мл 5% раствора глюкозы 300 мл 4-5% раствора натрия гидрокарбоната 700 мл 5% раствора глюкозы

Введение мочегонных - в течение 15 мин в/в 1 - 1,5 г/кг маннитола в виде 15-20% раствора на 10% растворе глюкозы 1-2 мг/кг лазикса 240 мг эуфиллина. При снижении диуретического эффекта все повторяется 3-4 раза на сутки

Контроль за количеством мочи - мочевой катетер

Заместительная терапия - в/в растворы лактасола, Рингера Рингера-Локка, 0,9% натрия хлорида, дисоль, трисоль, квартасоль и др. в общем количестве и со скоростью выделенной мочи под контролем ЦВД и электролитов крови

2. Усиление детоксикационной функции печени :

- Непрямое электрохимическое окисление крови - в/в натрия гипохлорида для замещения цитохрома Р-450
- Гептрапал, гепастерил - в/в 1-2 флакона на сутки
- Гепатопротекторы, стабилизаторы клеточных мембран, антиоксиданты - глюкокортикоиды ингибиторы протеолитических ферментов, эссенциальные фосфолипиды (берлитион, эсенциале, липостабил), силумарины, витамины, хофитол, орницептил, глутаргин , реамберин, гепадиф, тиотриазолин
- Стерилизация кишечника и энтеросорбция - яблочная кислота, лактулоза, антибиотики, аргининхлорид, смекта, белосорб, силард, полисорб, гепа-мерц (L - орнитин-L
- Дополнительная оксигенация печени - ГБО
энтеральное введение кислорода, кислородные пенки и др.


Детоксикационная ИВЛ

Используется в качестве метода детоксикации при отравлении токсичными веществами, которые выводятся через легкие, - это преимущественно токсичные газы (CO, NH₃, H₂S, метан, шахтный газ, бутан, пропан и тому подобное). ИВЛ проводится через интубационную трубку в режиме умеренной гипервентиляции (рCO₂ = 34-36 мм рт.ст.)


Операция заместительного переливания крови (ОЗК)

Проводится в объеме от 0,5 до 1 ОЦК: катетеризуют 2 вены, из которых одна, - центральная. Из нее выпускают кровь в мерную посуду, а в другую с такой же скоростью проводят заместительную трансфузию кристаллоидных и коллоидных растворов. В случае, когда заменяют больше 30% ОЦК, к ним добавляют эритроцитарную массу . Вся операция сопровождается мониторингом ЧСС, ЦВД и АО

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ



а – гемосорбция; б – обменное
переливание крови; в – МПТМОКВВ;
г – плазмаферез, д - плазмосорбция



1 – промывание желудка; 2 – ИВЛ; 3 – перитонеальный диализ; 4 – оксигенация крови; 5 – гемо- и ультра- фильтрация; 6 – гемодиализ; 7 – сорбция

ВИДЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ

МЕМБРАННАЯ:


1. Гемодиализ
2. Ультрафильтрация
3. Гемофильтрация
4. Гемодиафильтрация
5. Плазмофильтрация
6. Перitoneальный
диализ

ГРАВИТАЦИОННАЯ:


1. Плазмоферез:
 - а) дискретный
 - б) аппаратный
2. Лейкоцитоферез
3. Тромбоцитоферез
4. Еритроцитоферез

СХЕМА ГЕМОДИАЛИЗА, ГЕМО- И УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ

Гемодіаліз



Ультрафільтрація



ВИДЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ

СОРБЦИОННАЯ:


1. Гемосорбция
2. Плазмосорбция
3. Лимфосорбция
4. Ксеноперфузия:
 - а) спленоперфузия
 - б) гепатоперфузия
5. Иммуносорбция

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ:


1. Обменное переливание крови
2. ШВЛ
3. Лимфодренаж
4. Гемоксигенация:
 - а) малопоточная
 - б) высокопоточная

СХЕМА ГЕМООКСИГЕНАЦИИ И ПЛАЗМОФЕРЕЗА

Гемооксигенация



Плазмаферез



АНТИДОТНАЯ ТЕРАПИЯ

Классификация антидотов (Международная программа из химической безопасности ВОЗ, 1993) :

1. Химические токсикотропные - вступают с ядом в физико-химические связи в ЖКТ или в гуморальной среде организма :

неспецифические - энтеросорбенты, активированный уголь, белая глина, KMgO4, NaHCO3

специфические - унитиол, мекаптид - соли тяжелых металлов, протамин - гепарин)

2. Иммунологические - связывают яды реакцией антиген-антитело (антитоксичные сыворотки - яды насекомых и змей, антидигоциновая сыворотка, антидигоцин - сердечные гликозиды)

- 3. Биохимические (токсикокинетические) - изменяют метаболизм ядов или направление биохимических реакций, в которых они участвуют (реактиваторы ХЭ - ФОС, липоевая кислота - аманитины, метиленовый синий - метНв, этанол - метанол, этиленгликоль, налоксон - опиаты, цитохромы - СО, нитраты и натрия тиосульфат - цианиды, ацетилцистеин - хлорированные углеводороды)**
- 4. Фармакологические (симптоматические) - имеют противоположное фармакологическое действие на одни и те же функциональные системы организма (атропин - прозерин, АХ, глюкагон - инсулин, прозерин - пахикарпин, калия хлорид - сердечные гликозиды)**

ТАБЛИЦА ПРОТИВОЯДИЙ

Яды	Антидоты
Алкалоиды	<p><u>Калия перманганат (марганцовокислый калий).</u> Используется в виде водного раствора 1:10000 для промывания желудка. Раствор готовится путем разведения 1 г (на кончике ножа) в 100 мл воды и до 10 л. При приготовлении раствора нужно следить за тщательностью растворения, во избежание прижигающего действия на слизистые оболочки кристаллов, которые не растворились. Молоко используется в разведении водой 1:1 для промывания желудка или вводится в зонд 1-1,5 стакана молока, а потом проводится промывание.</p> <p>Белок 10 куриных яиц дают выпить или вводят через зонд в желудок, потом обязательно проводят промывание желудка.</p>
Амитриптилин	Физостигмин (эзерин, прозерин) вводится внутривенно медленно 0,5 - 2 мг. Если есть необходимость, вводится повторно еще дважды в той же дозе с интервалом в 20 мин.

Атропин	<u>Физостигмин</u> (смотри «Амитриптилин»).
Бромиды	<u>Натрия хлорид (кухонна соль)</u> : 1 чайная ложка на 1000 мл воды для промывания желудка, а потом по 100 мл этого раствора внутрь каждый час, пока не исчезнут признаки отравления.
Дистиляты нефти	<u>Парафиновое масло</u> внутрь 200—300 мл до и по 100—200 мл после промывания желудка.
Метиловый спирт	<u>Этиловый спирт</u> вводить внутрь по 100 мл 30% раствора каждые 4 часа 1—3 дня или в/в сначала 0,6 г/кг на 10% глюкозе, а потом в дозе 110,0 мг/кг/год.
Етилен-гликоль	<u>Этиловый спирт</u> (смотри отравление метиловым спиртом)
Морфин и его группа	<u>Налоксон гидрохлорид (нарканти, интренон)</u> вводится в соотношении 1 мг наркозона на 3—4 мг морфия или по 0,4—2,0 мг в/в (в/м) по мере необходимости

Скополамин	<u>Физостигмин</u> (смотр. "Амитриптилин").
Снотворные	<u>Натрия гидрокарбонат</u> . 5% раствор для в/в 200—400 мл и больше до получения щелочной реакции мочи (по лакмусовой бумаге).
Стрихнин	<u>Настойка йода</u> в дозе 15 капель на 0,5 стакана воды внутрь или через зонд в желудок з последующим промыванием водой.
Хинин	<u>Настойка йода</u> (смот. "Стрихнин").
Изониазид	<u>Пиридоксин</u> (вит B ₆) – в/в в дозе, которая соответствует количеству принятого изониазида, не больше 5,0 г за первый час, остальную дозу капельно 2-х часа
Железо	<u>Дефероксамин-мезилат (десферал)</u> — внутрь или через зонд после промывания желудка 50—100 мл 10% раствора, в/м или в/в по 10 мл 10% раствора трижды за первые сутки и по 5 мл 2 раза в сутки на протяжении нескольких дней.

ФОВ

Атропин вводится в/в медленно 1-4 мл 0,1% раствора, потом по 1-5 мл каждые 10-15 хв к появлению признаков атропинизации (сухость во рту, высыхание и потепление кожи, мидриаз, умеренная тахикардия). Общая доза может достигать 80 -100 мг на сутки и зависит от тяжести отравления. Реактиваторы холинэстеразы : дипироксим (ТМВ-4) по 1- 2 мл 15% раствора (15-30 мг) в/в или в/м, повторно, но не больше 1,0 г на сутки; изонитрозин по 2-3 мл 40% раствора (800-1200 мг) в/в, в/м в общей суточной дозе не больше 4 г.

Йод

Крохмал в дозе 1/3 стакана (80 г) на 1 л воды для промывания желудка до исчезновения синего цвета воды или натрия тиосульфата по 1-2 ст. ложки 10% раствора внутрь каждые 5-10 мин

Медь	<u>Этилендиаминтетраацетат (ЭДТА)</u> в/в по 10 мл 10% раствора на 250 мл 5% глюкозы 2—3 раза на день. <u>Д-пенициламин</u> — внутрь по 2—4 капсулы или 1—3 таблетки каждые 6 час.
Мышьяк	<u>Димеркаптопропанол (димекаптол)</u> по 2,5 – 5,0 мг в/м каждые 4-6 час.
Никель	<u>Этилендиаминтетраацетат</u> – ЭДТА (см. "Медь").
Ртуть	<u>Димеркаптопропанол</u> (см. "Мышьяк"), <u>Д-пенициламин</u> (см. "Медь").
Селен	<u>Бромбензол</u> в дозе до 1 г на промывание желудка
Серебро	<u>Настойка йода</u> (см. "Стрихнин").
Свинец	<u>Этилендиаминтетраацетат</u> (см. "Медь"). <u>Д-пенициламин</u> (см. "Медь"). <u>Сукцимер (ДМС)</u> – по 10 мг/кг внутрь 3 раза в сутки 5 дней

Метгемоглобинпроизводители	<u>Метиленовый синий (хромосмон)</u> - 1-2 мг/кг (0,1-0,2 мл/кг 1% раствора) в/в 5 мин., повторять каждый час по мере необходимости. <u>Аскорбиновая кислота</u> – 1,0 г в сутки.
Ацетаминофен (парацетамол)	<u>N-ацетилцистеин (пралидоксим)</u> – 140 мг/кг внутрь, потом по 70 мг/кг каждые 4 часа, всего 17 доз (аналоги – мукомист, флуимуцил, экзомюк).
СО	<u>Кислород</u> – ингаляции 100% кислорода или ГБО
Цианиды	<u>Амилнитрит</u> – дают вдыхать с ампулы на вате или в ноздрю вводят гранулу 15-30 сек, повторяют 2-3 хв. В\в вводить 10 мл 2% раствора <u>натрия нитрита</u>, 50 мл <u>хромосмана</u> и 50 мл 25% раствора <u>натрия тиосульфата</u>. Через 2 часа введение лекарств повторяют в половинных дозах.
Бензодиазепины	<u>Флумазенил</u> – 0,2 мг (2,0 мл) в/в за 30 сек, потом 0,3 мг через 1 мин., потом по 0,5 мг

Непрямые антикоагулянты	<u>Вит. К (викасол) – по 10 мг в/в, в/м или п/к трижды в сутки и <u>свежезамороженную плазму или криопреципитат</u></u>
Бледная поганка	<u>Бензилпеницилин натриевая соль – в/в 250 мг/кг/сутки первые 3 суток, дальше доза понижается к общепринятой</u>
Дигоксин	<u>Антидигоксин: количество флаконов = (доза дигоксина, мг x 4 / 3. Разводят в 0,9% NaCl и вводят в/в 15-30 мин., при необходимости дозу повторяют</u>
Ингибиторы ХЭ (прозерин)	<u>Атропин по 1-5 мг в/в, в/м, п/к каждые 15 мин. до остановки бронхореи, гиперсаливации и умеренной тахикардии</u>
Гепарин	<u>Протамина сульфат: в/в медленно вводят 5 мл 1% раствора или в/м 1 мл 5% раствора (1 мг протамина нейтрализирует 1 мг или 130 МО гепарина)</u>

ОТРАВЛЕНИЕ СНОТВОРНЫМИ (барбитуратами)

Различают барбитураты длительного (фенобарбитал), среднего (барбитал) и короткого (нембутал) действия.

Летальная концентрация = 10 разовым терапевтическим дозам каждого из препаратов или их смеси.

Патогенез: барбитураты вызывают блокаду окислительного фосфорилирования в митохондриях, синтез АТФ, транспорт ионов сквозь клеточные мембранные, а следовательно - нарушение энергетических процессов в клетках преимущественно ЦНС, их гипоксию и функциональную несостоятельность вплоть до коматозного состояния. Значительно подавляется активность центров дыхания и сосудо-двигательного, что приводит к дополнительным дыхательной и циркуляторной гипоксиям.

КЛИНИКА

Стадии отравления (за Reed):

0 - сомноленция, кашлевой рефлекс не подавлен

I - потеря сознания, есть реакция на болевые раздражители, кашлевой рефлекс не подавлен

II - потеря сознания, болевая реакция только на сильные раздражители, кашлевой рефлекс подавленный, МОД снижен (гиповентиляция)

III - потеря сознания, реакция на болевые раздражители и кашлевой рефлекс отсутствующие, выраженная гиповентиляция

IV - такая, как III, дополнительно значительные нарушения дыхания вплоть до его остановки, широкие зрачки без фотореакций, тяжелая гипотензия, анурия

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

- 1. Зондовое промывания желудка, провокационная диарея солевым слабительным, энтеросорбенты.**
- 2. Поддержание свободной проходимости дыхательных путей, при потребности ИВЛ, стабилизация сердечной деятельности.**
- 3. Аналептики в терапевтических дозах: эфедрина гидрохлорид 5% -1-2 мл, кордиамин 2-4 мл, кофеин натрия бензоат 10% -2-4 мл вм, bemegrid 10-20 мл в. венно только при отравлении 0 - степени тяжести.**
- 4. Форсированный осмотический щелочной диурез**
- 5. Никотинамид 1% -20-100 мл вв, капельно**
- 6. Цитомак, цитохром С по 4-8 мл 0,25% р-ра в/в**
- 7. Гемосорбция, продолженный гемодиализ или их комбинация.**

ОТРАВЛЕНИЕ ЭТАНОЛОМ

Летальная доза 96% этанола = 4-12 г/кг массы тела

Летальная концентрация в крови = 5-6%

Патогенез: этанол сначала окисляется в цитоплазме клеток, преимущественно печени, к ацетальдегида с помощью 3-х ферментных систем :

алкогольдегидрогеназной (80%), каталазной (2%) и микросомальной этанолокислительной (МЕОС - 10-20%).

На втором этапе в митохондриях с помощью фермента альдегиддегидрогеназы (АльДГ). ацетальдегид окисляется к ацетату, который сразу же переходит в свою биологически активную форму, - ацетил-КоА и метаболизуется в цикле Кребса к CO₂ и H₂O.



Средняя скорость окисления этанола в человеческом организме представляет 0,1 г/кг/часами

Если скорость и количество принятого этанола превышают ферментативную возможность его метаболизма, в организме накапливается в чрезмерной концентрации ацетальдегид, который и обусловливает патогенез отравления.

Ацетальдегид вызывает глубокий наркотический эффект в результате нарушения метаболизма нейронов, функции медиаторных систем, утилизации клетками кислорода, развитие метаболического ацидоза и, как следствие - гипоксическое поражение ЦНС со всеми негативными последствиями.

Смерть при отравлении этанолом в большинстве случаев наступает на фоне глубокого наркотического состояния от паралича дыхательного и двигательного центров.

КЛИНИКА

Первая стадия (эйфории) – наступает после приема 20-50 мл этанола и концентрация последнего в крови 0,5-1,0 г/л (0,5-1,0‰)

Вторая стадия (опьянение) – возникает после приёма 50-100 мл спирта, а концентрация яда в крови 1,0-2,0 г/л (1,0-2,0‰)

Третья стадия (наркотическая) – возникает после употребления 100-200 мл алкоголя и концентрация его в крови составляет 2,0-3,0 г/л (2,0-3,0‰)

Четвертая стадия (коматозная или асфиксическая) – возникает после приёма 200-400 мл этанола и концентрация его в крови превышает 3,0 г/л (3,0-5,0‰)

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

1. Терапия при отравлении первой и второй стадиях:

Если прошло не больше 2-х часов с момента приема последней дозы - промывания желудка 1-2% раствором натрия гидрокарбоната (пищевой соды) в общем количестве 6-8 л. Лучше пользоваться зондовым методом. При беззондовом методе промывания следует учитывать возможность аспирации желудочного содержимого.

Глюкоза 500 мл 20% раствора с 24 ЕД инсулина, потом 500-1000 мл 5% раствора глюкозы с витаминами С, В1, В6 по 500мг каждого в.венно.

Форсированный диурез с использованием осмо- и салуретиков (маннитол в дозе 1 г/кг массы тела, лазикс 80 мг), эуфилина (10 мл 2,4% раствора), в.в, медленно.

Контроль за температурой тела и поддержанием теплового режима

2. Терапия при отравлении, которое отвечает третьей и четвертой стадиям тяжести, :

- Освобождение и поддержание свободной проходимости верхних дыхательных путей. При нарушении спонтанного дыхания - интубация трахеи и перевод больного на ИВЛ
- Введение постоянного назогастрального зонда и промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия
- Стабилизация и поддержание гемодинамики кардиотоническими и вазоактивными веществами, инфузионными растворами по уровню центрального венозного давления
- Инфузионная терапия в.в капельно растворами глюкозы, натрия гидрокарбоната, рефортана, сбалансированными солевыми растворами в общем количестве, которое равняется суточному диурезу + патологические потери жидкости (рвота, понос, чрезмерное пототделение, и тому подобное)

- Метод осмотического форсированного щелочного диуреза с применением маннитола (1,0 г/кг), лазикса (40-80 мг) и эуфилина (5-10 мл 2,4% раствора) на фоне в.в инфузии перечисленных в предыдущем пункте растворов (до достижения рН мочи 7,5-8,0).
- При возможности перitoneальный или гемодиализ, особенно в коматозной стадии (гемодиализ в 4-11, а перitoneальный диализ в 2,5 разы более эффективен естественной элиминации)
- Профилактика пневмонии и гипотермии
- Растворы глюкозы при лечении этого отравления могут быть с большей эффективностью заменены растворами фруктозы в эквивалентных концентрациях и дозах. В этом случае не вводится инсулин.

ВНИМАНИЕ !!!

Если проведена интенсивная терапия в течение нескольких часов не дает эффект, следует исключить прогрессирующую обструкцию ГМ !

ОТРАВЛЕНИЕ МЕТАНОЛОМ

Летальная доза = 100-150 мл (100 мг% в крови)

Амавроз может наступить от 5-15 мл метанола

Патогенез: метанол метаболизируется АДГ печени к формальдегида и муравьинной кислоты (летальный синтез) в 5-7 раз медленнее, чем этанол. Эти продукты метаболизма вызывают токсическое поражение нейронов ГМ, ганглиозных клеток сетчатки глаз и зрительных нервов, что заканчивается их дегенерацией, полной атрофией и необратимой потерей зрения. Накопление муравьинной кислоты вызывает тяжёлый декомпенсированный метаболический ацидоз, который усиливается недоокисленными продуктами нарушенного клеточного метаболизма (лактат, пируват и тому подобное)

Смерть, как правило, наступает от паралича дыхательного и сосудо-двигательного центров

Клиника: скорость развития симптомов прямо пропорциональна количеству яда - головная боль, тошнота, рвота, боль в эпигастрии. Может быть период относительного улучшения состояния, которое через 6-10 часов в тяжёлых случаях заканчивается коматозным состоянием. Постепенно нарушается зрение - от нечеткости видения и симптома "бабочки перед глазами" к полной слепоте. Коматозное состояние сопровождается дыхательной, сердечно-сосудистой и почечной недостаточностями.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

1. Если больной в сознании, можно вызывать блевание (раздражение корня языка или задней стенки глотки) или промыть желудок беззондовым методом 2-3% раствором гидрокарбоната натрия. Лучше это сделать (а при нарушении сознания - обязательно) с помощью зонда. В конце промывания в желудок ввести энтеросорбент (активированный уголь, полисорб, силард, энтеросгель, СКН, СУГС) и солевое слабительное.

2. Физиологическим антидотом метанола является этанол, потому что он связывает ферменты оксидазы и алкогольдегидрогеназу и этим задерживает образование токсичных продуктов биотрансформации метанола (формальдегидов и муравьиной кислоты).

- Если больной в сознании, то этанол можно дать внутрь насыщающую дозу 1,0 мл/кг 96% спирта или другие алкогольные напитки в эквивалентных количествах. В дальнейшем дают алкоголь по 0,15-0,20 мл/кг/год в расчете на 96 % спирт.
- Если больной в коматозном состоянии или не может принимать алкоголь внутрь по другим причинам, то назначают 10% раствор этанола на глюкозе в насыщающей дозе 10 мл/кг вв. Поддерживающая доза в дальнейшем составляет 1,5-2,0 мл/кг/год 10% раствора. Вышеуказанными дозами создаются концентрации этанола в крови 1,0-2,0 г/л. Длительность применения антидота 4-5 дней или до исчезновения клинических проявлений отравления.

- 3. Антагонисты алкогольдегидрогеназы (АДГ) - пиразол или 4-метилпиразол в дозах согласно инструкции.**
- 4. Лейковорин 1,0 мг/кг (максимальная доза 50 мг) вместе с фоллиевой кислотой 1,0 мг/кг вм каждые 4 часа (всего 6 доз) или берлитион в.в в суточной дозе 600 мг на протяжении 3 суток для ускорения метаболизма муравьиной кислоты.**
- 5. Метод осмотического форсированного щелочного диуреза**
- 6. При приеме больше 30 мл метанола показаны экстракорпоральные методы детоксикации в комбинации с антидотной терапией этиловым алкоголем.**
- 7. Коррекция кислотно-щелочного равновесия и водно-электролитного баланса по общим правилам.**
- 8. Симптоматическая посиндромная терапия.**

Гемодиализ в 60 раз ускоряет выведение метанола по сравнению с естественной элиминацией
Показания к ургентному гемодиализу:

- 1. Прием > 30 мл метанола.**
- 2. Концентрация метанола в крови 50-100 мг %**
- 3. Тяжелый ацидоз ($\text{рН} < 7,2$, $\text{SB} < 20 \text{ ммоль/л}$)**
- 4. Расстройства зрения**

Перitoneальный диализ ускоряет выведение метанола в 5-10 раз и рекомендуется в случаях, когда отсутствуют условия для проведения гемодиализа или есть противопоказания к нему (геморрагический синдром)

При расстройствах зрения - ретробульбарная новокаиновая блокада с преднизолоном, $\text{CaCl}_2 10\% - 10 \text{ мл в/в, } 200 \text{ мл } 40\% \text{ раствора глюкозы с } 20 \text{ ЕД инсулина в/в}$

ОТРАВЛЕНИЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛОМ (ЭГ)

Летальная доза = ≈100 мл, что отвечает 2-3 г щавелевой кислоты

Патогенез: ЭГ под действием АДГ гепатоцитов сначала превращается на гликольальдегид, потом на глиоксиловую кислоту, а конечно - на щавелевую кислоту. Последняя быстро реагирует с ионами Са и образует оксалат Са, который кристаллизующийся и откладывается в канальцах почек, вызывая их механическую обтурацию. Вместе с глиоксиловой кислотой они приводят к острому канальцевого некрозу, результатом которого является развитие ОПН. Кроме этого, ЭГ и его метаболиты будут поражать капиллярное русло многих органов (мозга, миокарда, печени), которое ведет к нарушениям микроциркуляции в них.

Клиника: состоит из симптомов поражения ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистой систем и почек. Боль в животе, рвота, нейропсихические расстройства, судорожный синдром, коматозное состояние, прогрессирующая брадикардия, гипотония, снижение диуреза вплоть до анурии.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

1. Вызывать рвоту (если больной в сознании) или проводить промывание желудка сусpenзией активированного угля в первые 1-2 часа после приема яда. Манипуляции заканчивают введением в желудок энтеросорбентов и солевых слабительных, которые не содержат солей магния (Na_2SO_4 , карлсбадская соль)
2. В качестве антидота рекомендуется этиловый спирт в дозах и по методике, как при отравлении метанолом.

3. Тиамин и пиридоксин в дозах по 100 мг каждого в.в один раз на сутки.
4. До развития олигурии назначают осмотический щелочной форсированный диурез с использованием больших доз лазикса (до 1 г на сутки) и заместительной инфузионной терапии щелочными кристаллоидными растворами.
5. При концентрации этиленгликоля в крови выше 50 мг% показан гемодиализ до исчезновения клинических симптомов интоксикации.
6. Коррекция гипокальциемии в.в введениями 30-40 мл 10% раствора кальция хлорида. При необходимости дозу можно повторить или назначить инфузию 1% раствора кальция хлорида или глюконата в суточной дозе 300-400 мл.
7. Симптоматическая терапия - антиконвульсантная, противоотёчная, поддержание газообмена и показателей гемодинамики, ВЭО и КЩС.

ОТРАВЛЕНИЕ КОРРОЗИОННЫМИ ЯДАМИ

Коррозионные яды получили название от англ. corrosives
- разъедающие, прижигающие вещества.

К ним относятся:

1. Кислоты:

органические - уксусная (уксусная эссенция), щавелевая
неорганические - серная (аккумуляторная жидкость),
азотная, соляная

2. Щелочи - раствор аммиака, каустическая сода, поташ,
гашеная известь

Патофизиологические изменения при отравлении этими
веществами преимущественно похожи, с некоторыми
особенностями у каждого:

1. Химический ожог начальных отделов ЖКТ - ротовой
полости, глотки, пищевода, желудка и реже тонкого
кишечника с развитием ожогового шока (ожог этих
отделов = 30% поверхности тела) - коагуляционный от
кислот и колликвационный от щелочей

- 2. Резорбтивное действие - гемолиз, изменения КОС (метаболический ацидоз или алкалоз), гемоглобинурийный нефрозо-нефрит, ОПН, дистрофичные изменения некрозы печени, ОППН, гемическая гипоксия,**
- 3. Ранние осложнения - кровотечения из ЖКТ, перфорация пищевода, желудка, реактивный перитонит, панкреонекроз, ДВС-синдром**

В клинической картине различают 5 основных синдромов:

- 1. Ожоговый - следы ожогов кожи вокруг рта, слизистых рта и глотки, при ФГДС - пищевода и желудка**
- 2. Болевой - боль при глотании, вдоль пищевода, в эпигастрии, тошнота, редко рвота**
- 3. Геморрагический - пищеводно-желудочные кровотечения в связи с ожогами и ДВС-синдромом**
- 4. Дыхательной недостаточности - в результате отека и стеноза гортани, подсвязного пространства, позже - пневмонии**
- 5. Гемолитический - в результате действия яда на мембранные эритроцитов и резких изменений КОС**

Стадии ожоговой болезни :

1. Ожогового шока - до 1,5 суток
2. Токсемии - до 4-и времени
3. Инфекционного осложнения и поздних
4. кровотечений - до 2-х недель
5. Рубцевание - до 2-3-х месяцев
6. Выздоровления

Степени гемолиза :

1. Легкая - содержание свободного гемоглобина в крови = до 5 г/л (500 мг%)
2. Средней тяжести - содержание свободного гемоглобина в крови = до 10 г/л (1 г%)
3. Тяжелая - содержание свободного Нв > 10 г/л (> 1 г%)

ОСОБЕННОСТИ ОТРАВЛЕНИЯ КОРОЗИОННЫМИ ЯДАМИ

Органическими кислотами - достаточно глубокое проникновение в ткани, ожег больше похожий на колликвационный, значительная резорбтивное и гемолитическое действие

Щавелевая кислота - связывается в крови с ионами Са, образовывая нерастворимые соединения оксалатов, вызывает гипокальциемию и судороги, будет поражать почки

Неорганическими кислотами - вызывают коагуляционный некроз тканей, ожег поверхностный, слабо проникают в кровь и редко приводят к гемолизу, дают поздние кровотечения из ЖКТ при отторжении некротических струпьев, чаще вызывают рубцовые структуры

Щелочами - вызывают глубокие колликвационные ожоги, часто приводят к перфорации пищевода или желудка, быстро проникают в тонкий кишечник и будут поражать его, в то время, как желудок страдает меньше (нейтрализация желудочной НСІ)

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Зондовое (только !!!) промывания желудка ледяной водой объеме 10-12 л с добавлением паленой магнезии, яично-белковой смеси (белок 4-5 яиц) или мыльным раствором (25 г мыла) при отравлении кислотой или 2% раствором молочной или уксусной кислоты при отравлении щелочью. Через 12 часов после отравления промывание желудка - не показано.

Внимания !!! Примеси крови в промывной жидкости не есть противопоказанием к промыванию желудка

2. Анальгетики (промедол, омнопон, трамал, но-пен, нубаин) и спазмолитики (бускопан, но-шпа, платифиллин, галидор) в терапевтических дозах в.венно или в.м 3-4 раза на сутки.
3. Внутрь - маалокс, альмагель, фосфалюгель или сукральфат (1 г каждые 6 часов)

4. Внутрь по 20 мл микстуры (200 мл 10% эмульсии подсолнечного или облепихового масла 2 г левомицетина 2 г аnestезина) каждый час на протяжении 7-20 дней.
5. Противошоковая терапия кристаллоидными и коллоидными (рефортан, рефортан плюс, стабизол, реополиглюкин, желатиноль) растворами под контролем центрального венозного давления, почасового диуреза к стабилизации показателей центральной гемодинамики.
6. Локальная гипотермия желудка
7. Профилактика и лечение гемолиза : натрию гидрокарбонат 1000-1500 мл/время в.в, капельное до слабощелочной реакции мочи (по лакмусовой бумаге), концентрированные растворы глюкозы, маннитол 2 г/кг лазикс 40 мг в.в каждые 2 часа.
8. При тяжелом гемолизе - операция заменного переливания крови в объеме одного ОЦК.

- 9. Гастроцепин 10 мг 3 раза в сут. в.в.**
- 10. Фраксипарин 0,3 мл 1-2 раза в сут. или гепарин 2,5-5 тис. од. 4 раза в сут. подкожно под контролем коагулограммы и времени свертывания крови по Ли-Уайту.**
- 11. Гемодиализ с включением в контур гемосорбционной колонки.**
- 12. При острой дыхательной недостаточности – перевод на ИВЛ, при необходимости – трахеостомия.**
- 13. ГКГ – преднизолон 1 мг/кг на протяжении 7-10 дней, а затем по 15-20 мг на протяжении 2 мес. (профилактика рубцевания)**

Внимание !!!

При отравлении уксусной кислотой категорически запрещено промывать желудок содой (гидрокарбонатом натрия)(опасность острого расширения желудка, его разрыва и усиления кровотечения)

ОТРАВЛЕНИЕ СО (угарным газом)

Источник - выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, продукты неполного сгорания органического топлива, как составная часть естественного газа.

Токсичная концентрация СО => 0,02 мг/л, а в соотношении 1: 1000 с воздухом переводит 50% Нв в карбоксигемоглобин (НвСО)

Патогенез: СО переводит Нв в НвСО, который не способен транспортировать О2 и СО2. Кроме этого блокирует фермент цитохром-С-оксидазу, двухвалентное железо и нарушает тканевое дыхание, а также соединяется с миоглобином и повреждает миокард.

Таким образом, развиваются гемическая и тканевая гипоксии.

Родство СО из Нв в 250 раз больше, чем из О2

Клиника: различают 3 степени отравления

Легкая - содержание НвСО в крови к 30%. Головная боль, головокружение, тахикардия, тахипноэ, тошнота, рвота, шаткая поступь

Средняя - содержание НвСО в крови 30-50%.0

Кратковременная потеря сознания, психо-моторное возбуждения, галлюцинации, гипертензия, сжимающая головная боль, значительная тахикардия, повторная рвота, амнезия

Тяжелая - содержание НвСО в крови > 50%.0 Стойкое коматозное состояние, патологические рефлексы, нарушение дыхания, неустойчивая гемодинамика, гипертерmia, на ЭКГ - гипоксия миокарда, розовая или карминово-красная расцветка кожи лица и верхней половины туловища

При концентрации НвСО 60% и > наступает смерть

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

- 1. Вынести потерпевшего из атмосферы, которая содержит СО и этим самым прекратить дальнейшее поступление газа в организм.**
- 2. Ингаляция 100% кислорода с помощью плотной лицевой маски при самостоятельном дыхании или через эндотрахеальную трубку после интубации трахеи и перевода потерпевшего на ИВЛ (при нарушении дыхания или его отсутствия) к снижению уровня НвСО в крови к 10%, а это, как правило, бывает не меньше чем через 1,5-2 год, дальше ингаляция 40% кислородно-воздушной смеси на протяжении 10-12 часов**
- 3. При концентрациях НвСО в крови выше 25-30% и неврологических нарушениях рекомендуется ГБО при давлении 2-3 ата на протяжении 1,5 часа 4 раза на сутки (убыстряет диссоциацию НвСО в 10-15 раз).**

4. Антидот - ацизол 6% раствор 1,0 мл в/м, в тяжелых случаях - повторно через 1 час в такой же дозе
5. Профилактика и лечение отека-набухания головного мозга (диуретики, глицерол по 25,0 4-6 раз на сутки внутрь, глюкокортикоиды).
6. Терапия гистотоксической гипоксии - цитомак, цитохром С по 4-8 мл 0,25% раствора в.венно капельно. В тяжёлых случаях дозу увеличивают до 12-20 мл.
7. Фраксипарин 0,6 мл п/к 1 раз в сутки, или гепарин по 5000 ЕД п/к каждые 4 часа
8. Сульфат магния 25% 10-20 мл в/в; инстенон 2-4 мл в/в в 200 мл физ.раствора 2-3 раза в сутки; актовегин в средней суточной дозе до 800 мг в/в или в/м на протяжении 5-7 суток или до полного клинического выздоровления.
9. Заменное или обменное переливание крови в объеме не менее половины ОЦК.

ОТРАВЛЕНИЕ ФОС

Токсичность зависит от "летального синтеза", в результате которого ФОС превращаются на параоксоны, которые имеют выраженное токсичное действие.

Патогенез: Параоксоны имеют антихолинестеразную действие, которое приводит к накоплению в организме эндогенного АХ и **перевозбуждение М- и Н-холинореактивных структур**

М-холинореактивный синдром: миоз, слезотечение, слюнотечение, нарушение зрения, гиперперистальтика кишечника (пронос), ларингоспазм, бронхоспазм, бронхорея, проливной пот, артериальная гипотензия, брадикардия, недержание мочи
Н-холинореактивный синдром: мышечные спазмы, судороги, фасцикуляции, мышечная слабость, параличи (в том числе дыхательной мускулатуры), артериальная гипотензия, нарушение сознания, коматозное состояние

КЛИНИКА

Различают 3 клинических стадии:

Возбуждение - головокружение, головная боль, снижение остроты зрения, тошнота, рвота, боль в животе, тенезмы, умеренный миоз, гипергидроз, гиперсаливация, гипертензия

Гиперкинезов и судорог - психомоторное возбуждение, сопор, миофибриляции, миоз, отсутствие фотореакций, тонические судороги, из рта и носа пена

Паралича - арефлексия, миоз, гипергидроз, бронхоспазм, общий паралич скелетной мускулатуры (в том числе дыхательной), артериальная гипотензия, обтурационный синдром в легких, тяжелая комбинированная гипоксия

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

- 1. Госпитализация потерпевших в отделение реанимации .**
- 2. Промывание желудка (каждые 4-6 часа, на протяжении сутки) 5% р-ом натрия гидрокарбоната с активированным углем, введением энтеросорбентов и солевых слабительных. Категорически запрещено введение жиров, молока, масла.**
- 3. При отравлении контактным путем – снять грязную одежду, пораженные участки протереть 10-15% р-ом нашатырного спирта, а потом вымыть все тело теплой водой с мылом и натрием гидрокарбонатом на протяжении 15 мин.**
- 4. При попадании ФОС в глаза – промывание 1-2% р-ом натрия гидрокарбоната с последующим закапыванием р-ми новокаина и 1% атропина.**

5. Атропинизация до исчезновения симптомов мускариновидного действия ФОС. Первичная доза атропина сульфата при легкой форме 1-2 мг вм или в.венно; при средней – 2-4 мг вв, при тяжёлой – 5-10 мг вв. Повторные дозы и интервалы их введения зависят от клиники.


6. Реактиваторы холинэстеразы в первые 72 часа отравления:

- Дипироксим по 150 – 300 мг (1-2 мл 15% р-ра) в.м или в.в, но не больше чем 1,0 г в сутки;
- Изонитрозин по 800-1200 мг (2-3 мл 40% р-ра) в.м или в.венно, но не больше чем 4,0 г в сутки.


ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ

По патогенезу и токсичности грибы делятся на:

1. Гастро-энтеротропного действия – не настоящие серые и кирпично-красные опята
2. Нейро-вегетотропного действия – мухомор
3. Гепато-нефротропного действия – бледная поганка



Жёлтая



Зеленая



Белая

ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ ГАСТРО-ЭНТЕРОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ

Патогенез: токсины, химические соединения с кетоновыми группами, ангидриды кислот или гевелевая кислота, которые резко раздражают слизистые ЖКТ как слабительные

Клиника: тошнота, рвота, боль в животе, болезненные тенезмы, тяжелая диарея. Нарушается ВЭБ и КЩР, нарушение гемодинамики (понижение АД, тахикардия, нарушение микроциркуляции, ацидоз, проявление дегидратационного шока). Гельвелевая кислота может вызвать гемолиз и ОПН

ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ НЕИРО-ВЕГЕТОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ

Атропиновый синдром

тигровая поганка и яд “пантерного мухомора”, как мусцимол, иботеновая кислота и “грибной атропин”, которые возбуждают холинореактивные системы головного мозга.

Клиника: легкий гастроэнтерит, психо-моторное возбуждение, помутнённое сознание, зрительные галлюцинации, сухость слизистых, а в тяжелых случаях – судороги и кома.

Симптомы 12-24 часа., а летальность = 2%

Холинэргический синдром

Клиника: инкубационный период = 2-3 часа., после чего возникают гиперсаливация, тошнота, рвота, обильный пот (“потово-делительный синдром”), бронхорея, бронхиолоспазм, сужение зрачков, спазм аккомодации, близорукость, брадикардия, артериальная гипотензия, спастическая боль в животе, диарея, а в тяжелых случаях – коллапс, отек легких и гипоксическое состояние.

Через 8-12 часов. симптомы постепенно исчезают.

Летальность = 4%

ОТРАВЛЕНИЕ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ

Аманитотоксины в 20 раз токсичнее от фалотоксинов

**Смертельная доза β-аманитина = 0,1 мг/кг
– для ребенка = 1/3, а для взрослого = 1 гриб**

Летальность = 60-70%, а у детей = 90%.

Только за 1 год в Украине умирает > 100 людей.

Клиника: 4 стадии:

- 1. Латентная – 6-12 часов., симптоматики нет**
- 2. Желудочно-кишечная – 2-3 сутки, слабость, боль в животе, диарея с примесью крови, дегидратация, нарушение гемодинамики, метаболический ацидоз, галюцинации**
- 3. Паренхиматозная (ОППН) – после короткой стабилизации состояния увеличивается печень, нарастает желтуха**
- 4. Конечная – через 1-2 недели выздоровление или смерть**

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Грибы гастро-энтеротропного действия:

- 1. Промывание желудка, энтеросорбенты**
- 2. Солевые слабительные, очистительные клизмы.**
- 3. Инфузионная дезинтоксикационная терапия (10-15 мл/кг массы тела) р-ми глюкозы, Рингера-Локка и другими сбалансированными растворами под контролем солевыми показателей гемодинамики (АД, ЦВД)**
- 4. Спазмолитическая терапия (бускопан, но-шпа форте, платифилин).**
- 5. Гастроцепин 10 мг 3 раза в сутки в.м.**
- 6. Ситуационная терапия**

Грибы нейро-вегетотропного действия: При атропиновом синдроме

Промывание желудка, энтеросорбенты

Солевые слабительные, очистные клизмы.

1. На фоне инфузионной терапии введение антидотов атропина (прозерин 0,05% - по 1 мл в/в или п/к. до исчезновения симптомов отравления)
2. Симптоматическая терапия

При холинергическом синдроме

Промывание желудка, энтеросорбенты

Солевые слабительные, очистительные клизмы.

1. На фоне инфузионной терапии – атропина сульфат 0,1% по 1-2 мл до исчезновения симптомов
2. Симптоматическая терапия

Грибы гепато-нефротропного действия:

1. Промывание желудка, энтеросорбенты
Солевые слабительные, очистительные клизмы.
2. Введение антидота – бензилпеницилин натриевая соль 250 мг/кг/с в/в первые 3-х сутки. С 3 по 10 день - в среднесуточной дозе.
3. Ранние повторные сеансы плазмофереза, при нарастании явлений ППН и с целью детоксикации – перitoneальный диализ, гемодиализ, ультрафильтрация
4. Гепатопротекторы: берлитион 600-900 мг, хофитол 5-10 мл 2-3 раза, силибене по 100 мл 3 раза, эсенциале 10-20 мл, орнищетил 1 г/кг, реамберин 400-800 мл, легалон 200-250 мг, лактулоза 45-60 мл, глутаргин 5-10 мл/сутки.

5. Гидрокортизон 1 г/с вв или другие глюкокортикоиды в эквивалентных дозах.
6. Ингибиторы протеолетических ферментов (контрикал, трасилол, гордокс, антагозан, пантрипин).
7. Интрапортальная инфузионная терапия (альбумин, глюкоза, гепабене, гепастерил, глутаргин), артерио-портального шунтирования, малопоточной трансмембранный оксигенации крови вены porte.
8. Липоевая кислота по 100-20 мг/с в/в или липамид 500-800 мг/сут.
9. Антагонисты белков, которые переносят яды – хлорамфеникол 4 г/сут. внутрь

ОТРАВЛЕНИЯ ХЛОРИВАНИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ

Чаще всего встречаются отравления органическими растворителями – дихлорэтаном (ДХЭ - $C_2H_4Cl_2$) и четырёххлористым углеродом (ЧХУ - CCl_4)

Патогенез: это лёгкие жирорастворимые вещества, поэтому могут поступать в организм через ЖКТ, лёгкие и неповреждённые кожные покровы. Метаболизм с участием цитохрома Р-450 по типу “летального синтеза” с образованием свободных радикалов (CCl_3^+ , Cl^-), хлорэтанола, соляной и монохлоруксусной кислот. Последние денатурируют клеточные белки, блокируют ферменты метаболического цикла, разрушают клеточные мембранны, активируя реакции ПОЛ.

Летальная доза = 20 – 40 мл

**Летальность = 30-55%, а при развитии
экзотоксического шока = 90%**

Клиника: 5 синдромов:

- 1. Психоневрологический** – головокружение, опьянение, ейфория, возбуждение, судороги, галлюцинации, нарушение сознания аж до комы (токсическая энцефалопатия)
- 2. Расстройство внешнего дыхания** – гиперсаливация, гипербронхорея, аспирация желудочного содержимого с развитием аспирационно-обтурационного синдрома
- 3. Дисфункции С-С-С** – тахикардия, гипотензия, снижение ОЦК, повышенная проницаемость сосудов, циркуляторная гипоксия
- 4. Почекно-печёночный** – увеличение и болезненность печени, снижение её функциональной способности, желтуха, снижение суточного диуреза аж до анурии, нарастание уремической интоксикации, расстройства КОС и ВЭБ
- 5. Уреато-эозинофильный** –

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

- 1. Зондовое промывание желудка 8-10 л теплой воды каждые 2 часа.**
- 2. Провокационная диарея с использованием масляных слабительных – вазелиновое, глицериновое или парафиново масло 150-200 мл в зонд, энтеросорбенты (смекта, силард, полисорб 9-12 г/сут.).**
- 3. Гемосорбция в первые 3 часа после отравления объёмом 2,5-3 ОЦК, лимфодренаж.**
- 4. Гемодиализ в первые 6 часов после отравления продолжительностью 18-20 часов. Лучшее комбинировать гемодиализ с гемосорбцией в одной манипуляции.**
- 5. Заменное переливание крови в объёме не менее 0,5 ОЦК.**
- 6. Форсированный осмотический щелочной диурез.**
- 7. Витамин “E” 10% - 2 мл в.м 6 раз в д.**
- 8. Унитиол 5% - 5 мл 4 раза в день в.венно.**

9. Ацетилцистеин 5% р-р сначала 100 мл, а потом каждые последующие 3 часа – по 50 мл в.венно до 500 мг/кг в первый день и до 300 мг/кг в второй день.
10. Тетацин кальция 10% - 40-60 мл на 500 мл 5% глюкозы в.венно, капельно.
11. Натрия гидрокарбонат 4% - 1,5-2 л/день в.венно, капельно.
12. Лечение экзотоксического шока (инфузии рефортана, рефортана плюс в дозе 20 мл/кг , стабизола, перфторана, сорбилиакта, реосорбилиакта, кристалloidных растворов).
13. Преднизолон 12-15 мг/кг/д. в.венно.
14. Фраксипарин 0,3 мл подкожно 1 раз в день или другие НМГ в околопупочный участок живота .
15. Ингибиторы протеаз (контрикал 50 000 Од. в.венно, кап. 3-4 раза в д.).

16. Гепатопротекторы:

- **Берлитион (а-липоевая кислота) – 600 мг (2 ампулы) в 250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, вводить в.венно, кап. в дозе 600-900 мг в д.**
- **Глутаргин 500-1000 мл в сут., кап. При развитии коматозного состояния – 1000-1500 мл в сут. до улучшения состояния.**
- **Эссенциале 5-10 мл 4 раза в д. в.венно на аутокрови.**
- **Силибен 100 мл 2-3 раза в д. в.венно, кап.**
- **Орницептил 1г/кг/д, в.венно, кап. при развитии печеночной комы.**
- **Гептрапал 1-2 флакона в д. в.м или в.в на протяжении 2-3 нед., потом поддерживающая терапия по 2-4 таблетки в день внутрь.**
- **Глутаргин – 40% - 5-10 мл на 400 мл 5% р-ра глюкозы в/в 1-2 раза/д.**
- **Гепадиф – 1-2 фл. на 200 мл 5% глюкозы в/в или 6 капс.**

17. При ингаляционном отравлении – раннее введение лазолвана по 4 мл 3 раза в д. в.венно, медленно или кап. на р-рах Рингера, глюкозы, натрия хлорида. Дополнительно назначают по 2-3 мл лазолвана ингаляционно 4 раза в. д.
18. После стабилизации состояния пациента для лечения токсической энцефалопатии инстенон 2-4 мл в.венно, кап. на 200 мл 5% р-ра глюкозы или изотоническом р-ре натрия хлорида 2-3 раза в д. 5-7 дней или до полного клинического выздоровления.
19. Актовегин в средней сут. дозе до 800 мг в.венно или в.м.
20. Реканализация пупочной вены и катетеризация воротной вены для проведения медикации, интрапортальной инфузационной терапии (альбумин, глюкоза, гепабене, гепастерил, глутаргин), артерио-портального шунтирования, малопоточной трансмембранный оксигенации крови воротной вены.

ОТРАВЛЕНИЕ МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗОВАТЕЛЯМИ (НвСН)

К этой группе относятся в-ва, имеющие в своей молекуле нитро- или аминогруппы: анилин, бензол, толуол, толуидин, нитраты, нитриты, нитроглицерин,

сульфаниламиды

Патогенез: Нв преобразовывается в НвСН (метНв), который утрачивает свойство транспортировать О₂

вследствии чего развивается гемическая гипоксия

Летальная доза = 1г или к-во НвСН > 60%

Клиника: а) **легкая степень – НвСН = 15-20%** – цианоз кожи и слизистых, головная боль, одышка, оглушение

б) **средняя степень – НвСН = 20-40%** - сильная головная боль, цианоз с шоколадным оттенком, сопорозное состояние

в) **тяжёлая степень – НвСН > 40%** - резко выраженный цианоз, одышка, гипотензия, рвота, судороги, кома

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

- 1. Зондовое промывание желудка теплой водой с добавлением поваренной соли, в конце манипуляции вводят в желудок 150 мл вазелинового масла, активированный уголь или другие энтеросорбенты. При перкутанном отравлении надо обмыть пораженную область водой, 2-3% р-ром уксусной кислоты, разведенным столовым уксусом или р-ром 1:1000 калия перманганата.**
- 2. Ранняя и постоянная Оксигенотерапия, при необходимости - ИВЛ.**
- 3. Метиленовый синий 1% - в/в кап. на 5% р-ре глюкозы в дозе 0,1-0,15 мл/кг, при необходимости – повторно, до исчезновения цианоза (суммарная сут. доза может достигать 5-7 мг/кг). Вместо этого препарата можно давать Хромосмон 20-30 мл/д.**

- 4. Аскорбиновая кислота 5% в сут. дозе 1 - 1,5 г.**
- 5. Гипербарическая оксигенация в режиме 1-1,5 ата по 60 мин. 2 раза в д.**
- 6. Осмотический щелочной форсированный диурез, гемодиализ в первые 6 ч. после отравления, перitoneальный диализ.**
- 7. Обменное переливание крови (не менее 50% ОЦК) при метгемоглобинемии больше чем 30%.**
- 8. Инстенон 2-4 мл в.венно, кап. на 200 мл 5% р-ра глюкозы или изотоничном р-ре натрия хлорида 2-3 раза в д. на протяж. 5-7 нед. или до полного клинического выздоровления.**
- 9. Актовегин в средней сут. дозе до 800 мг в.венно .**
- 10. Симптоматическая терапия.**

ОТРАВЛЕНИЕ ОПИАТАМИ

Кодеин, морфин, опий, кодтерпин, омнопон, промедол, героин, пентазоцин (фортрал, лексир) и т. д

Летальная доза = > 200 мг

Патогенез: действуют на ЦНС через опиоидные рецепторы, вызывая угнетение таламических центров болевой чувствительности, нарушают связь подкорки з корою ГМ, возбуждают центры блуждающего нерва и рвотный, тормозят сосудисто-двигательный и дыхательный центры ствола ГМ. При длительном использовании вызывают явления привыкания (наркоманию).

Клиника: сонливость, гиперемия кожи, шум в ушах, постепенная потеря сознания, миоз, редкое, поверхностное дыхание, дыхание Чейн-Стокса, брадикардия, гипотензия, рвота, спазмы в животе, отёк лёгких.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

- 1. При коматозном состоянии проверить проходимость верхних дыхальных путей, оценить эффективность самостоятельного дыхания и степень гипоксии. При необходимости – интубация трахеи, ИВЛ, туалет трахео-бронхиального дерева, адреномиметическая поддержка кровообращения.**
- 2. Повторные промывания желудка при любых путях попадания опиоидов в организм (у пациентов без сознания как и всегда после предыдущей интубации трахеи) р-ром калия перманганата 1:1000 або 0,2% р-ром танина. В конце промывания в желудок вводят 50 мл КМnO₄, энтеросорбенты и солевые слабительные.**

3. Налоксона гидрохлорид (нарканти, интренон) в дозе 0,8-2,0 мг в.венно. При неэффективности дозу можно увеличить до 10,0мг. Продолжительность действия этих препаратов составляет 1-2 часа, что значительно меньше чем морфина,поэтому возникает необходимость в повторных введениях налоксона или продолжительной в.венной его инфузии на 5% р-ре глюкозы с рассчёта 0,8 мг препарата на час.

Налтрексон – препарат, подобный к налоксону, но его продолжительность действия 24-48 часов.Его назначают по 50,0 мг в сутки внутрь (через зонд). Чаще используется для лечения пристрастия к опиатам.

- 4. Форсированный диурез, перitoneальный диализ**
- 5. Ситуационная терапия.**

ОТРАВЛЕНИЕ КЛОФЕЛИНОМ

Клофелин (клонидин, гемитон, катапресан) относится к центральным пресинаптическим α_2 -адреностимуляторам, снижает АД и используется для лечения гипертонии. в офтальмологии (1% р-р). Значительно потенцирует наркотический эффект алкоголя. Используется с криминогенной целью для перевода человека в безсознательное состояние (особенно 1% р-р, который не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета)

Клиника: артериальная гипотензия, брадикардия, аритмии, коллаптоидное состояние, сухость слизистых, потливость, головная боль, нарушение сознания вплоть до комы, адинамия, ретроградная амнезия, расстройства ЖКТ.


1. Постоянный кардиомониторинг сердечного ритма и проводимости! (опасность фатальных аритмий !!!)
2. Итроп – 0,5 мг (1 мл) или атропина сульфат по 0,5-1,0 мл в.венно, повторно под контролем ЧСС.
3. Алупент 0,05% - 1-2 мл в.венно, кап. на изотоническом р-ре натрия хлорида, под контролем частоты сердечных сокращений, повторно, длительно, до нормализации ритма и проводимости или настраивания трансвенозной временной электрокардиостимуляции.
4. Метоклопрамид (церукал, реглан) – в.венно болюсно в дозе 0,5 мг/кг массы тела, затем 0,25 мг/кг в.венно капельно в 400 мл 5% р-ра глюкозы с скоростью 2 мл/мин. Средняя сут. доза – 18-20 мг.
5. При тяжелых отравлениях очень осторожно !!! α-адреноблокаторы (фентоламин) и налоксон под постоянным контролем АД и сердечного ритма.
6. Гемосорбция, ультрафильтрация.

УКУСЫ ЗМЕЙ

На территории Украины встречаются степная и лесная гадюки, укусы которых ядовитые.

Патогенез: при укусе змеи в рану попадает яд - виперотоксин, который состоит – ферменты (фосфолипаза, протеаза, гиалуронидаза), белки, полипептиды, гемолизини, цитотоксины, коагулянты.

Клиника:



а) местные симптомы – боль, отек, кровоизлияния, венозные тромбозы, пузыри с геморрагическим содержимым, некроз, явления лимфангоита и лимфаденита. Отек выражен – в конечности может депонироваться 2-3 л жидкости;

б) общие симптомы (особенно, когда яд попадает в кровь) – головокружение, слабость, тошнота, потливость, одышка, гипотония, обморок, коллапс, судороги, гемолиз, ДВС-синдром


В клинической картине большое значение имеет наслаждение психо-эмоционального стресса, вплоть до шокового проявления

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ



1. Иммобилизация конечности (шина, лонгета), потому что при движениях яд быстрее распространяется по лимфатическим путям.
2. Не позднее, чем 10 мин. Отсосать яд из раны ртом.
3. Нельзя делать дополнительных разрезов в месте укуса, припекать ранку, вводить любые лекарства, накладывать жгут (кроме укуса кобры)
4. Обработать ранку спиртом или настойкой йода и наложить свободную чистую повязку.
5. Дать больному теплое питье и транспортировать его в больницу в лежачем положении.

6. Введение специфической противозмеинной сыворотки (“анти-гюрза”) по Безредко: сначала 1 мл розведенной 1:10, потом 1 мл нерозведенной, а потом всю дозу – при лёгкой форме 10-20 мл, при средней 30-40 мл и при тяжёлой 70-80 мл п/к в межлопаточную область или в/м. Только при очень тяжелой интоксикации сыворотку можно вводить медленно в/в (10 мл = 500 АО)
7. ГКС – гидрокортизон 250-500 мг или преднизолон в эквивалентных дозах
8. Гепарин по 5 тыс. ед. каждые 6 час. под контролем времени свертывания или НМГ под контролем АЧТЧ (в 2 раз больше нормы)
9. Профилактика столбняка (анатоксин)
10. Антибиотикопрофилактика
11. Ситуационная симптоматическая терапия



УКУСЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

К ядовитым насекомым относятся пчёлы, шершни, осы и шмели.

В США количество смертей от укусов насекомых в 3 раза больше, чем от укусов змей.

Жалящий аппарат насекомых находится в хвостовом отделе.

В состав яда входят: апитоксин, меллитин, фосфолипазы, гиалуронидазы, кинины, гистамин, апамин, АХ и др. БАВ.

1 укус насекомых чаще вызывает аллергическую реакцию, 5 укусов – токсическую, а > 100 – смертельную.

Патогенез: при одиночных укусах развивается типичная анафилактическая реакция немедленного типа вследствии взаимодействия антиген-антитело с освобождением эндогенных цитокининов, общетоксические явления не выражены.

При множественных укусах яд проявляет нейротоксическое действие, выступая как Н-холинолитик(гангиоблокирующий, центральный седативный и миоплегический эффекты. Смерть может наступить в результате острых расстройств циркуляции, коматозного состояния и параличей.

Кроме этого, яд насекомых имеет прямое цитолитическое действие на нейроны.

Клиника: при лёгких формах клиника полностью отвечает аллергической реакции от легкой степени выраженности до анафилактического шока. Особенно опасны укусы насекомых в область ВДП,(механическая асфиксия).

Общетоксические проявления характеризуются тахикардией, снижением ОПСС и артериальной гипотензией, одышкой, нарушением сознания, мышечной слабостью, параличами, а при укусах пчёл ещё внутрисосудистым гемолизом.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ




- 1. Пинцетом или ногтями удалить стилет (жало) с места укуса.**
- 2. Место укуса обработать спиртом, перекисью водорода и приложить холод.**

3. При укусах слизистых ВДП срочно ввести ГКС и быть готовым к восстановлению проходимости ВДП (интубация трахеи, коникотомия,)
4. Все мероприятия как при анафилактическом шоке (адреналин, β_2 -стимуляторы, ГКС, инфузионная терапия, дофамин, добутрекс, и т.д.)

УКУСЫ ПАУКОВ

К ядовитым паукам относятся кара-курт, скорпион, фаланга и тарантул. Места их проживания – в основном Середняя Азия, но они встречаются в южных областях Украины и в Крыму

Яд кара-курта в 15 раз сильнее яда кобры, но смертельные укусы реже, потому что доза меньше



Фаланга

Тарантул

Кара-курт

Пауки производят яд – токсоальбумины.

Скорпион

Патогенез: яд относится к нейротоксинам и вызывает изменения мембранных потенциалов, натриевых каналов, межнейрональных синапсов за счёт освобождения медиаторов (АХ, НА, допамина и т.д.). Это ведёт к нарушениям функции ЦНС и ВНС

Клиника: местные изменения – боль, отек, лимфангоит.

Общие изменения – интоксикационный синдром с преобладающим поражением ЦНС - мышечные боли, парестезии, мышечная слабость в конечностях и напряжение мышц живота, нарушение сознания, галлюцинации, гипертермия.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

1. Место укуса обрабатывают антисептиками (спирт)
2. Имобилизация, холод, нейролептики, аналгетики
3. Кальция хлорид (глюконат) и магния сульфат в/в
4. При укусе любым пауком – специфическая антикарактуртовая сыворотка 30-70 мл п/к, а в тяжёлых случаях – в/в по Безредко. Перед этим – ГКС.
5. Ситуационная симптоматическая терапия