

ГОУ СПО «ЭМК»

ОСТРЫЕ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Подготовила
преподаватель педиатрии
Ососкова Е.Н.

Острое расстройство пищеварения - острое функциональное расстройство пищеварения, проявляется диареей без значительного нарушения общего состояния.

Этиология

- Нарушение режима кормления, перекорм, прорезывание зубов, перегревание, несоблюдение водного режима.
- Интеркурентные заболевания: грипп, отит, сепсис, пневмония.
- *Неблагоприятный преморбидный фон или предрасполагающие факторы:*
 - недоношенность;
 - рахит;
 - экссудативно-катаральный диатез;
 - гипотрофия.



- общее состояние мало изменяется.
- Острое начало, стул учащенный - 7 раз в сутки в виде рубленного яйца, со слизью, метеоризм, урчание в кишечнике, однократная рвота или срыгивания, температура нормальная, бледность, снижение аппетита, беспокойство, прибавление массы тела заметно замедляется. Во рту - молочница.
- При копрологии кала - единичные лейкоциты, нейтральный жир в большом количестве, жирные кислоты. В моче, крови - норма. Продолжительность болезни 6-7 дней.





ПРОГНОЗ

благоприятный, но у больного гипотрофией может быть прогрессирование гипотрофии. При неправильном лечении, или отсутствии его может осложниться присоединением кишечной инфекции.





ЛЕЧЕНИЕ

- Оральная регидратация регидроном 50 мл/кг на первые 6 часов, энтеродезом 10-20 мл/кг на 6 часов, цитроглюкосоланом, рисовым отваром, компотом из сухофруктов (обязательно с курагой - источник K^+), отваром шиповника, кипяченой водой, подслащенным чаем, 5% раствором глюкозы. Жидкость должна иметь комнатную температуру. Питие давать не большими порциями в количестве около 150мл/кг в сутки. Параллельно с оральной регидратацией дозированное кормление грудных - к груди на 5-8 мин, искусственные - молочнокислыми смесями - кефиром, белковым молоком Количество питания увеличивается постепенно, к 6-7 дню доводят до нормы.



МЕДИКАМЕНТОЗНО

- ферменты - пепсин, панкреатин, 1% раствор хлористоводородной кислоты по 1 чайной ложки 2-3 раза в день перед едой; витамины - аскорбиновую кислоту, никотиновую, тиамин, БАВ.
При беспокойстве - согревающий компресс, или грелка на живот, при метеоризме укропную воду, газоотводную трубку.



ПРОФИЛАКТИКА

- правильная организация питания;
- пропаганда грудного вскармливания, и его правильное проведение;
- своевременная дача полноценного прикорма;
- детям, находящимся на искусственном вскармливании - смеси, изготовленные на молочной кухне или адаптированные молочные смеси;
- гигиенический уход, избегать перегревания, закаливания;
- санитарная просветительная работа о грудном вскармливании, правильная организация режима дня и ухода за ребёнком.







