

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Острые воспалительные заболевания

Выполнила студентка
Найда Мария Сергеевна
специальное (дефектологическое)
образование,
очная форма обучения
Преподаватель: Демяшина
В.В.

Острый ларингит

Острый ларингит- острое воспаление слизистой оболочки гортани.

- Обычно сочетается с заболеваниями дыхательных путей.
- Развитию заболевания способствует вдыхание холодного воздуха через рот, употребление холодной воды при перегревании тела во время игры; перенапряжение голоса.

Симптомы

- Охриплость
- Сухой кашель
- Небольшой объём температуры
- Першение
- Жжение
- Чувство инородного тела в горле

Лечение

- Нельзя кричать и громко говорить
- Обильное тёплое питьё
- Содовые или масляные ингаляции
- Препараты, успокаивающие кашель и отхаркивающие

Истинный круп (дифтерия гортани)

Истинный круп развивается в результате распространения воспалительного процесса из носа или глотки, но может быть и первичным заболеванием.

- В течение времени захватывает всю слизистую оболочку гортани.

Симптоматика

- Первым признаком истинного крупа является изменение голоса в виде охриплости или афонии и характерный лающий кашель.
- Одновременно быстро проявляются признаки нарастающего стеноза, сопровождающегося резко выраженной одышкой.
- В тяжёлых случаях, если не оказана своевременная помощь, может наступить удушье.
- Выражается повышением температуры тела до субфебрильных или фебрильных цифр, проявлением воспалительного характера изменений крови, общей слабостью, плохим аппетитом и сном.

Лечение

При подозрении на дифтерию необходима:

- немедленное введение противодифтерийной сыворотки
- проведение бактериологического исследования
- изоляция и госпитализация больного в инфекционную больницу.

При своевременном лечении прогноз благоприятный.

Ложный круп

(подскладочный ларингит)

Ложный круп- разновидность острого катарального ларингита, развивающегося в подголосовой полости.

- Наблюдается у детей обычно в возрасте 2-5 лет, что связано с анатомическим строением детской гортани- узостью её просвета и рыхлой клетчаткой подскладочного пространства.
- Начало заболевания, как правило, связано с острым воспалением слизистой оболочки носа или глотки.
- Ложный круп чаще бывает у детей, склонных к ларингоспазмам, страдающих диатезом.

Симптоматика

- Начинается обычно внезапно, среди ночи, приступом лающего кашля.
- Дыхание становится свистящим, резко затруднённым, выражена инспираторная одышка.
- Ногти и видимые слизистые оболочки становятся цианозными.

Лечение

- Главной задачей лечения ребенка с ложным крупом является предупреждение и купирование приступов стеноза гортани, снятие воспаления и отечности подскладочной области.
- Необходимо обеспечить доступ свежего воздуха и обильное щелочное питье, отменить прием раздражающей горло пищи, по возможности давать больному ложным крупом лекарства в виде сиропов, применять смягчающие горло таблетки для рассасывания, аэрозоли и ингаляции.
- Ухудшение при тяжёлом стенозе; необходима трахеотомия.