



Выполнили: Есикова Диана

Отек Квинке

Отек Квинке

или так называемая «гигантская крапивница», это разновидность аллергической реакции, которая приводит к отечности кожи, слизистых оболочек и подкожной клетчатки. Отек Квинке не зависит от возраста, хотя наиболее часто проявляется у взрослых людей. Особенностью заболевания является быстрое и внезапное появление отека и такое же быстрое его исчезновение после применения соответствующего лечения. Исчезнуть отек Квинке может буквально за несколько минут либо часов.




Есть два основных типа отека Квинке:

- * Наследственный ангионевротический отек (НАО) - редкое генетическое заболевание
- * Приобретенный ангионевротический отек (ПАО)

Отек Квинке развивается в течение довольно короткого промежутка времени - от нескольких минут до нескольких часов. В большинстве случаев он протекает в мягкой форме, но иногда поражает горло и язык, перекрывая дыхательные пути - в этом случае состояние может быть опасным для жизни.

ЭТИОЛОГИЯ

- * Под влиянием биологически активных веществ, выделяющихся при аллергической реакции в предварительно сенсibilизированном организме, происходит повышение проницаемости микрососудов и развивается отек тканей. Причиной его может быть воздействие специфических пищевых, лекарственных аллергенов (продукты питания, цветы, животные) и неспецифических раздражителей (охлаждение, психические и физические травмы, интоксикация, инъекция). Часто возникает у лиц с пониженной функцией щитовидной железы. Особое значение в патогенезе отводится наследственности, повышенной возбудимости вегетативной нервной системы, очагам хронической инфекции, заболеваниям ЖКТ.
- * В основе лежит повышение тонуса парасимпатической системы, проявляющееся местным расширением капилляров и артериол с последующим увеличением их проницаемости.



Что может вызвать отек?

- 80 % случаев **отека Квинке** развивается после приема лекарств. Отек могут вызвать антибиотики, различные витамины (особенно группы В), йодированные препараты, аспирин, пенициллин и т.д.
- Часто причиной выброса гистамина являются пищевые продукты или же различные пищевые добавки – консерванты, красители, эмульгаторы и т.д. Причем эти добавки могут оказаться даже в той еде, которую мы изначально не можем заподозрить: салаты, маринады, колбасы, сыры.
- Иногда аллергическая реакция и последующий отек могут быть спровоцированы пылью цветущих растений в период цветения или же укусом насекомого.
- Довольно часто отек Квинке вызывают косметические средства: лаки, краски, тушь, стиральный порошок. Виновником отека Квинке бывает также домашняя и производственная пыль.



СИМПТОМЫ

- * Внезапное появление красноватой припухлости на коже, особенно часто в области глаз и губ, но иногда - на руках, ногах и в горле.
- * Жжение, боль и воспаление в пораженных областях; иногда зуд.
- * сыпь на руках, ногах, лице и гениталиях.
- * Но самым опасным является отек Квинке в области носоглотки и дыхательных путей. Сначала появляется охриплость, затрудненное дыхание, лающий кашель. Человека охватывает беспокойство, тревога, лицо приобретает синюшный оттенок, потом бледнеет. Развитие отека на языке и гортани может привести к асфиксии, дыхание становится затрудненным, развивается афония, язык начинает синеть. Если не оказать своевременную помощь, то такой больной может просто задохнуться - погибнуть от отека гортани и перекрытия доступа воздуха в легкие.



Рис. Изменение лица при гигантской крапивнице (отек Квинке, справа); слева лицо той же девушки до заболевания.

A top-down view of various medical supplies on a grey, textured surface. On the left, a white plastic pill bottle is tipped over, with several red and white capsules spilling out. In the center, a white oval pill is visible. To the right, a brown glass medicine bottle with a white cap and a partially visible label stands upright. A red rectangular object, possibly a piece of paper or a small cloth, lies near the center. A silver metal tool, possibly a pill splitter, is positioned at the top right. The word "ЛЕЧЕНИЕ" is overlaid in the center in a white, sans-serif font.

ЛЕЧЕНИЕ

Первая помощь при Отеке Квинке

1. Первое, что необходимо сделать **при первых признаках отека Квинке** – вызвать врача, даже если состояние пациента удовлетворительное
2. Прекратить взаимодействие больного с аллергеном (извлечь жало насекомого, отменить лекарство, прекратить есть или пить)
3. Успокоить больного, снять эмоциональную нагрузку
4. Обеспечить доступ свежего воздуха: снять галстук и пояс, расстегнуть застежку у ворота, открыть форточку
5. Положить холодный компресс на пораженную область для уменьшения интенсивности зуда и отека
6. Если причина – укус насекомого или же было введено лекарство, вызывавшее аллергическую реакцию, то выше места контакта необходимо обязательно наложить жгут (если укус или инъекция производились в ногу или руку). Если же укус был в другие части тела, то следует приложить холодный компресс.
7. Чтобы вывести как можно больше аллергена из организма следует дать больному выпить большое количество жидкости комнатной температуры.
8. С этой же целью дать больному сорбент. Подойдет: несколько толченных таблеток активированного угля или энтеросгель.
9. Дать больному антигистаминный препарат, если таковой есть в наличии.
10. Закапать в нос сосудосуживающие капли (например, нафтизин).

КРАПИВНИЦА

Прекращение
поступления
аллергена

ОТЕК КВИНКЕ

Димедрол 1% - 2 мл внутривенно

**Преднизолон внутривенно
90-150 мг**

При распространении отека на гортань и глотку: **адреналин**
внутривенно 0,3 мл 0,1% раствора в 20 мл 0,9% раствора
натрия хлорида

Оксигенотерапия
Готовность к экстренному восстановлению проходимости ВДП
(интубация трахеи, коникотомия)

Госпитализация
(при генерализованной форме крапивницы и отеке Квинке)

Спасибо за внимание!!!

