



ПАТОГЕННЫЕ ПСЕВДОМОНАДЫ

Выполнили: Басс А. , Каримова А.

ПАТОГЕННЫЕ ПСЕВДОМАНАДЫ

❖ Семейство: *Pseudomonadaceae*.

Род: *Pseudomonas*

ВИДЫ:

Ps. Mallei-

Ps. pseudomallei,

Ps. fluorescens.

МИКРОСКОПИЯ

- ❖ Грам -отрицательные организмы-прямые или слабо изогнутые палочки с полярно расположенными жгутиками
- ❖ Не образующие спор и растущие в аэробных условиях.
- ❖ Размер – 1.5-4 мкм



ВОЗБУДИТЕЛЬ САПА

Сап – *Ps. mallei*

- ❖ преимущественно хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся образованием специфических сапных узелков во внутренних органах и на слизистых и кожных покровах, при распаде которых образуются язвы.
- ❖ Восприимчивые животные: в первую очередь, однокопытные животные (лошади, ослы, мулы), могут болеть верблюды, кошачьи (львы, пантеры, тигры, леопарды), болеет и человек.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

◆ пораженные органы, лимфоузлы, отделяемое язв

МИКРОСКОПИЯ

- полиморфные палочки прямые или слегка изогнутые, длиной до 5 мкм;
- грамотрицательные;
- спор не образуют;
- методы окраски: простой метод (метиленовая синь), по Романовскому-Гимзе
- капсул не образуют;
- неподвижные.



КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

- посев на питательные среды: среды с глицерином МПА, МПБ, картофель;
- особенности выделения чистой культуры:
 - аэробы;
 - оптимальная температура 37°C
 - срок культивирования 18-20 часов

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- на жидких средах: равномерное помутнение среды, образование пристеночного кольца и пленки;
- на плотных средах: слизистый серовато-белый налет, который приобретает коричневый цвет на глицериновом картофеле – вначале мелкие полупрозрачные с желтоватым оттенком колонии, затем они сливаются, образуя медообразный налет.

БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- расщепляют многие углеводы с образованием кислоты;
- индола не образуют, желатин разжижают.

БИОПРОБА

заражают 2-3 золотистых хомячков или самца морской свинки,
вводя материал подкожно, развивается орхит – феномер Штрауса

ВОЗБУДИТЕЛЬ МЕЛИОИДОЗА

Мелиоидоз - острая инфекционная болезнь, протекающая в виде тяжелого сепсиса с образованием множественных абсцессов в различных органах или в виде относительно доброкачественных легочных форм.

Возбудитель - *Pseudomonas pseudomallei*

МИКРОСКОПИЯ

- ❖ Грамотрицательная
- ❖ биполярно окрашивающаяся палочка
- ❖ длиной 2-6 мкм и шириной 0,5-1 мкм.
- ❖ имеет жгутики, подвижен, хорошо растет на питательных средах.
- ❖ Спор и капсул не образует

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Хемоорганогетеротроф, аэроб, оксидазоположительен, растёт на простых питательных средах. На МПА с 5 % глицерина вырастает в виде колоний R-, S- и M-типа. Колонии серовато-белые, пигментов не образует. На жидких средах рост в виде помутнения и образования складчатой плёнки. Разлагает глюкозу, маннит, мальтозу с кислотообразованием, вызывает гидролиз желатина, крахмала, образует индол, продуцирует аргининдегидролазу, способна утилизировать рибозу, адонитол, эритрол^[2].

БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- ❖ Разлагает глюкозу, маннит, мальтозу с кислотообразованием
- ❖ вызывает гидролиз желатина, крахмала
- ❖ образует индол, продуцирует аргининдегидролазу, способна утилизировать рибозу, адонитол, эритрол