

Патология органов речи

A black and white close-up photograph of a young girl with blonde hair, smiling broadly. She has dark eyes and a joyful expression. The background is dark and out of focus.



Аномалии развития и заболевания носа

Различают врожденные и приобретенные заболевания носа.

Врожденные:

- сужение и зарастание полости носа
- гнусавость

Приобретенные:

- травмы носа и его придаточных пазух
- гематому носовой перегородки
- инородные тела носа
- острый насморк
- хронический насморк
- озену
- полипы носа
- гнусавость
- ринолалию


Сужение и зарастание полости носа.

- врожденная узость носовых ходов в одной или в обеих половинах носовой полости
- атрезия(полная, неполная, односторонняя, двусторонняя)
- инспираторное (вдыхательное) присасывание крыльев носа

Повреждение носа. В результате повреждения носовых костей может возникнуть деформация носа в виде смещения его в сторону. При повреждении носовой перегородки часто образуется подслизистое кровоизлияние, или гематома, которая впоследствии превращается в абсцесс.



Инородные тела носа. Приводят к закупорке одной, а иногда обеих половин носовой полости и нередко вызывают гнойное воспаление слизистой оболочки носа. Чаще инородные тела застревают в начальном отделе нижнего носового хода и легко удаляются врачом под контролем зрения.



Острый насморк. Может наблюдаться как самостоятельное заболевание или как одно из проявлений общего инфекционного заболевания (грипп, корь, скарлатина).

Признаки острого насморка:

□ощущение сухости и жжения в носу и в носоглотке

□ чихание

□небольшое повышение температуры.

Последствия:

✓ изменение тембра голоса

✓ гнусавость

✓ нарушение обоняния

Хронический насморк возникает при:

- частом повторении острого насморка
- частом и длительном вдыхании холодного и горячего воздуха
- примеси к вдыхаемому воздуху различных раздражающих частиц в виде пыли, дыма, газов

Озена – особое хроническое заболевание, сопровождающееся:

- резкой атрофией слизистой оболочки носа и нижележащих дыхательных путей
- атрофией костного скелета раковин
- увеличением носовых ходов

Полипы носа – это доброкачественные новообразования в полости носа, возникающие из-за воспаления придаточных пазух. Полипы в носовой полости имеют гладкую поверхность и студенистую консистенцию. При отсутствии лечения полипы могут достигать огромных размеров и заполнять всю полость носоглотки.

Симптомы полипов :

- заложенность носа с обильным отделяемым
- головная боль
- утомляемость
- отсутствие обоняния



Гнусавость — патологическое изменение
тембра голоса и искаженное произношение
звуков речи, обусловленное нарушением
нормального участия носовой полости в
процессах голосо- и речеобразования.

Различают гнусавость:

- открытую
- закрытую

Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата.

Причины возникновения:

- расщепление твердого и мягкого неба
- травмы ротовой и носовой полости
- паралич мягкого неба



Заболевания полости рта

Врожденные патологии полости рта:

- дефекты губ и неба
- дефекты языка
- дефекты челюстей и зубов

**Влияют на функцию голосо- и
речеобразования**

Дефекты губ и нёба. Частыми аномалиями развития губ и нёба являются щелевые дефекты верхней губы и нёба, возникающие вследствие задержки слияния эмбриональных зачатков, образующих эти части полости рта. Различают:

□ одностороннюю расщелину, которая располагается обычно на линии, соответствующей промежутку между клыком и боковым резцом, чаще с левой стороны.

□ двустороннюю, которая расположена чаще всего симметрично и разделяет верхнюю губу на три части – **2** боковые и одну среднюю.



Дефекты языка.

К аномалиям развития языка относится:


Гаглоссия - полное отсутствие языка

Микроглоссия - недоразвитие языка, когда размеры его оказываются чрезмерно малыми

Макроглоссия - ненормально большой язык , когда в результате мышечной гипертрофии язык увеличен настолько, что не помещается во рту и выступает наружу между зубами.

Дефекты челюстей и зубов. Чаще проявляются в виде аномалий прикуса, которые имеют различные варианты:

- **Прогнатия** – верхняя челюсть и верхняя зубная дуга сильно выдвинуты вперёд, нижние передние зубы расположены далеко позади верхних.
- **Прогенция** характеризуется значительным развитием нижней челюсти. Передние зубы нижней челюсти расположены впереди зубов верхней челюсти.
- **Открытый прикус** характеризуется наличием свободного промежутка между зубами верхней и нижней челюстей при сомкнутом их положении.





Заболевания глотки

Приобретенные заболевания глотки:

- рубцовые деформации глотки
- инородные тела глотки
- ангина
- хронический тонзиллит
- гипертрофия носоглоточной миндалины
- гипертрофия небных миндалин
- фиброма носоглотки
- паралич мягкого неба

Рубцовые деформации глотки. При некоторых тяжелых инфекционных заболеваниях (скарлатина, дифтерия) наблюдаются глубокие поражения слизистой оболочки глотки с омертвлением отдельных ее участков и последующим развитием рубцовой ткани. Последствия:

- носовое дыхание отсутствует или резко затрудняется
- возникают гнусавость
- дефекты произношения, связанные с нарушением функции небной занавески.



Инородные тела глотки.

Причины: во время глотания недостаточно прожеванной пищи в глотку могут попадать и застревать в ней инородные тела.

Последствия: на слизистой оболочке остаются царапины и ссадины, которые могут вызывать ощущение инородного тела и беспокоить больного.

АНГИНА (острый тонзиллит) - острое общее инфекционное заболевание с преимущественным поражением небных миндалин.

Различают:

- язычную ангину
- горланную ангину
- ретроназальную ангину

Возможны два пути передачи инфекции:

- воздушно-капельный
- алиментарный.

Хронический тонзиллит. Хроническое воспаление миндалин, или хронический тонзиллит развивается обычно в результате повторных ангин и является довольно частым заболеванием.

Субъективные ощущения при хроническом тонзиллите вне периода:

- «неловкость» в зеве
- легкая болезненность при глотании
- иногда запах изо рта
- длительное незначительное повышение температуры по вечерам (**37,2—37,5°**).

Гипертрофия носоглоточной миндалины (аденоидные разращения). Носоглоточная миндалина при нормальном ее развитии не препятствует дыханию через нос и не вызывает никаких расстройств. Обычно к **10—12** годам она значительно уменьшается, а затем почти полностью рассасывается и у взрослых в большинстве случаев не обнаруживается.


Часто под влиянием повторных воспалительных процессов носоглоточная миндалина разрастается до значительных размеров. Такая гипертрофия носоглоточной миндалины получила название аденоидов, или *аденоидных разращений*



После удаления аденоидов полезно назначать дыхательную гимнастику по


Б.С. Преображенскому и А. Н. Стрельниковой.

**Дыхательная гимнастика
(по Б.С. Преображенскому)**




*Дыхательная гимнастика по
А. Н. Стрельниковой*


Упражнение "ладошки" (разминочное)



Упражнение "*погончики*"



Упражнение "насос" ("накачивание шины")



Гипертрофия небных миндалин.


Небные миндалины у детей часто увеличиваются (гипертрофируются), достигая иногда таких размеров, что почти соприкасаются друг с другом и закрывают вход в глотку . С увеличением миндалин

- голос становится сдавленным и гнусавым
- появляется затруднение глотания и дыхания
- ночью ребенок храпит и часто просыпается



Фиброма носоглотки

- представляет собой опухоль, состоящую из плотной соединительной ткани и большого количества кровеносных сосудов
- развивается почти исключительно у мальчиков начиная с **8—13** лет и кончая переходом к возмужалости.
- характеризуется быстрым ростом. Начальные признаки
- ✓ одностороннее закладывание носа (через несколько месяцев носовое дыхание полностью выключается)
- ✓ заболевания ушей (катар евстахиевой трубы, воспаление среднего уха).



Паралич мягкого неба.

Чаще всего такой паралич возникает при дифтерии

- полный паралич (мягкое небо в этих случаях не поднимается)
- неполный паралич, или парез (поднимается недостаточно) Паралич и парез бывают односторонними (одна половина мягкого неба поднимается нормально, а другая остается неподвижной или же подвижность ее ослаблена).

Последствия:

- ✓ мягкое небо не выполняет своей функции
- ✓ гнусавость
- ✓ расстройство глотания в виде попадания жидкой пищи в нос.

Список используемой литературы:

- «Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи» Л.В. Нейман, М.Р.Богомильский – Владос, **2003**
- «Болезни уха, горла и носа» В.Т.Пальчун – Атлас, **1991**
- «Медицинская энциклопедия» В.И.Покровский – Советская энциклопедия, **1992**
- Московская служба спасения. Форум для родителей [электронный ресурс]**/http://www.0911.ru/**
- Медицинская библиотека, полнотекстовые книги: нарушения формирования устной и письменной речи у детей. Возможности их медикаментозной коррекции. Методическое пособие для врачей [электронный ресурс]**/http://www.encephabol.ru/**
- Сестринское дело в оториноларингологии. Собрание лекций [электронный ресурс]**/http:// www.lekmed.ru/**
- Свободная энциклопедия [электронный ресурс]**/http:// www.wikipedia.ru/**



Спасибо за внимание!