

**Запорожский государственный
медицинский университет**

**Первая доврачебная
помощь при острых
хирургических и
терапевтических
заболеваниях.**

Лектор: Черковская Ольга Степановна



Ургентное состояние (от лат. *urgens*, неотложный) — это состояние, которое представляет угрозу для жизни больного/пострадавшего и требует проведения неотложных (в пределах минут-часов, а не дней) лечебных и эвакуационных мероприятий.

Основные требования

- 1. Готовность к оказанию неотложной медицинской помощи в должном объёме.**
- 2. Одновременность проведения диагностических и лечебных мероприятий.**
- 3. Ориентация в первую очередь на клиническую ситуацию**
- 4. Помнить о собственной безопасности**

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

- При парентеральном введении лекарственных препаратов (пенициллин, сульфаниламиды, сыворотки, вакцины, белковые препараты, рентгенконтрастные вещества)
- При проведении аллергопроб с пылью или пищевыми аллергенами
- При укусах насекомых

Клиническая картина анафилактического шока

- **Развивается через несколько секунд, минут после контакта с аллергеном**
- **Угнетение сознания**
- **Падение АД**
- **Судороги**
- **Непроизвольное мочеиспускание**
- **Начинается с появления чувства жара, гиперемии кожи, чувства страха смерти**
- **Боли за грудиной,**
- **Удушье**
- **Иногда отек гортани по типу отека Квинке, кожный зуд, высыпания, ринорея, сухой надсадный кашель**

Помощь при анафилактическом шоке

- Прекратить воздействие аллергена
- 0,5мл 0,1% р-ра адреналина п/к в месте введения аллергена и 1мл 0,1% р-ра адреналина в/в капельно, если АД остается низким введение адреналина повторить через 10-15мин
- Кортикостероиды (преднизолон 75-150мг и более, дексаметазон 4-20мг, гидрокортизон 150-300мг в/в)
- Антигистаминные (супрастин 2-4мл 2%р-ра или димедрол 5мл 1% р-ра)


Стенокардия – острая преходящая недостаточность коронарного кровообращения (ишемия миокарда).

Проявляется:

- приступом давящей или сжимающей боли за грудиной
- часто эта боль иррадирует (отдает) в левое плечо, руку, левую половину шеи.
- беспокоит страх, бледность кожи, потливость.

Инфаркт миокарда – остро наступившая стойкая и длительная ишемия миокарда, которая приводит к некрозу его части. В основе патогенеза инфаркта миокарда лежит острый тромбоз ветви коронарной артерии которая как правило поражена атеросклеротическим процессом и частично стенозирована.

Бронхиальная астма




**Основное
проявление
бронхиальной
астмы - приступ
удушья со
слышимыми на
расстоянии сухими
хрипами.**

Анафилактический шок



**Это угрожающее
жизни острое
проявление
аллергической
реакции**

The image features a close-up of several thin, dark green stems of cherry blossoms. The stems are covered with numerous small, light pink flowers and buds. The flowers have five petals and prominent yellow stamens. The background is dark and out of focus, creating a bokeh effect with soft, blurred pink and red spots. The overall lighting is soft, highlighting the delicate texture of the petals and the vibrant color of the blossoms.

**Благодарю за
внимание**