



ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЮ ВЫПОЛНИЛ

УЧЕНИК 10 КЛАССА

ТУРКИЯ ГУРАМ



РАЗРЕШЕНО ЛИ ДАВАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА?

1. Разрешено

2. Разрешено, в случае крайней необходимости

3. Запрещено



[Следующий вопрос](#)

ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕМся КРОВОТЕЧЕНИЕМ, ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НАЧИНАЮТ:

1. С наложения импровизированной шины

**2. С наложения жгута выше раны на месте
перелома.**

3. С наложения давящей повязки.




Следующий вопрос

НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕН КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ?

1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года.

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года.

3. Время не ограничено.



[Следующий вопрос](#)

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА, ПОПАВШЕГО В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПОСТРАДАВШЕГО?

1. Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз.

2. Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот.

3. Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота кулаком в направлении внутрь и кверху.



Следующий вопрос


КАКОВЫ ПРИЗНАКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ КРУПНОЙ АРТЕРИИ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЕЕ РАНЕНИИ?

1. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения.

2. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.

3. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см.

Артериальное кровотечение.



Следующий вопрос

КАКОВА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ (ПОКРАСНЕНИЕ И ОТЕК КОЖИ, ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕСТЕ ОЖОГА ПУЗЫРЕЙ, НАПОЛНЕННЫХ ЖИДКОСТЬЮ, СИЛЬНАЯ БОЛЬ)?

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки.

2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой.

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить пострадавшего водой.



Следующий вопрос

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

