

Департамент здравоохранения города Москвы  
ГБОУ СПО  
Медицинский колледж №4

# Послеоперационный период. Рвота.

Выполнила: Тямина Ирина  
301 группа

# Определение послеоперационного периода. Фазы.

- Послеоперационный период- это лечение больного начинается с момента окончания операции и продолжается до восстановления его трудоспособности.
- Условно подразделяется на 3 фазы:
- I фаза- ранняя( длится 3-5 дней)
- II фаза- ближайшие 2-3 недели ( до выписки больного из стационара)
- III фаза – отдаленная, до восстановления трудоспособности.

# Определение рвоты.

- ▣ Рвота - это сложный рефлекторный акт, приводящий к извержению содержимого желудка ( иногда вместе с содержимым кишечника) через рот.



# Причины рвоты.

- Наркоз.
- Плохая послеоперационная подготовка.
- Инфекции
- После масочного эфирного наркоза( в данный момент его не используют).



# Лечение рвоты.



## □ Медикаментозная терапия:

- 1) Но-шпа
- 2) Атропин
- 3) Реглан
- 4) Церукал
- 5) Этаперазин
- 6) Тагиста
- 7) Гранисетрон
- 8) Трописетрон



# Профилактика рвоты.

- Для профилактики рвоты у больного стоит держать голову ровно, либо чуть ниже уровня тела. Голову лучше повернуть набок, чтобы пациент не захлебнулся. Обязательно стоит подставить судно для рвотной массы.
- Если больной самостоятельно не может, то стоит очистить его ротовую полость от остатков рвотных масс. Промыть желудок теплой водой .  
Наилучшим вариантом очистки организма является регулярное отсасывание содержимого желудка с помощью тонкого зонда через нос с фиксацией на лице над верхней губой . Также содержимое желудка можно отсасывать шприцем Жане.

- Для предупреждения рвоты в послеоперационный период необходимо принимать лекарственные препараты. Для каждого пациента препарат и курс лечения подбирается индивидуально в зависимости от сложности операции и индивидуальных особенностей организма.